

전문의약품

■**원료약품 및 분량** : 1정 중
【유요성분】 클레리트로마이신(KP) 250mg, 500mg (약가)
【참가제-타르색소】 식약처인정타르색소(황색203호 알루미늄에릭소)
【가미 첨가제】 미결정 셀룰로오스, 비닐라캇 S-1, 소르비탄올레이트, 스테아로산, 스테아르산나그네솔, 오파드 라이노라센(03842015), 전호화천본, 카르나우바인, 글로이데시아산화수소, 크로스카르멜로오스나트륨, 덩크, 포비돈, 폴리펄렌글리콜

- 성상** : 황색의 정방형 필름코팅정
- 효능·효과**
- 유요효능**

황색포도상구균, 폐렴연쇄구균, 스트렙토코쿠스 피오케나스(그룹 A-비대형황색), 리스테리아 모노사이토제나스, 스트렙토코쿠스 아그락티에그럼, 대, 스트렙토코쿠스 비리덴스, 인플루엔자균, 파라인플루엔자균, 오크살라 카리칼리스, 레기오넬라 뉴모필라, 보데텔라 백알레, 공직감필로아테, 헬리코박터 피로리, 임균, 동물 파스텔렐라증 병원균, 폐렴 미코플라스마, 클라미디아 트라코마티스, 클로스트리듐 퍼프린젠스, 키파도카스 나이거, 프로피오니박테리움 아크네, 박테로이데스 헬라니제나스, 미코박테리움 아비움, 미코박테리움 인트라셀룰라

 - 하기도감염증 : 기관지염, 폐렴 등
 - 상기도감염증 : 인두염, 부비동염 등
 - 피부 및 피부조직 감염증
 - 미코박테를 아비움, 미코박테를 인트라셀룰라에 기인한 미코박테리아 감염증
 - 십이지장궤양 환자의 헬리코박터 파일로리 박멸

- 용량·용량**
 - 성인 : 클레리트로마이신으로서 보통 1회 250mg(약가) 1일 2회 투여하며, 중증 감염증의 경우에는 1회 500mg(약가) 1일 2회 투여한다. 투여기간은 보통 7~14일이다. 크레아티닌창소율이 30mL/min이하인 신부전 환자의 경우에는 용량을 절반으로 줄여야 한다. 즉 1일 1회 250mg(약가), 중증 감염증의 경우에는 1회 250mg(약가) 1일 2회 투여한다. 이런 환자에게는 14일 이상 투여하지 않는다.
 - 미코박테리아 감염증 : 이 약으로서 1회 500mg(약가), 1일 2회 투여한다. 이 경우 여부암물, 클로피자민, 리팜핀과 같은 다른 항미코박테리아제와 병용투여 하여야 한다.
 - 십이지장궤양 환자의 헬리코박터 파일로리 박멸 : 14일간 이 약으로서 500mg(약가) 1일 3회와 오메프라졸 40mg 1일 1회 병용투여하고, 연속하여 14일간 오메프라졸 40mg 1일 1회 투여한다. 즉, 클레리트로마이신은 1회 500mg(약가) 1일 3회 14일(7~14일)투여하고, 오메프라졸을 1일 1회 40mg을 28일(7~28일)투여한다.
 - 12세 이상의 소아는 성인과 동일, 12세 미만 소아는 클레리스로마이신 간조시럽을 사용한다.

- 사용상의 주의사항**
 - 1. 다음 환자에는 투여하지 말 것**
 - 1) 이 약의 참가제에 과민반응이 있는 환자
2) 클레리트로마이신, 에리트로마이신 또는 마크로라이드계 항생물질에 과민반응의 병력이 있는 환자
3) 테르페닌, 시사프린, 피오지, 아스테미졸, 돔페리돈을 투여 받고 있는 환자(클레리트로마이신 및노는) 에리트로마이신과 병용투여 시 QT 연장 및 심부정맥(심실성 빈맥, 심실세동, Torsades de pointes 포함)이 나타나고 이는 클레리트로마이신 및 에리트로마이신에 의해 이들 약물의 감다시나 보상에 받기 때문인 것으로 의국의 시판 후 조사결과 보고되었다. 치명적인 사례도 보고되었다(참조)
4) QT 연장 또는 심실성 심부정맥(Torsades de pointes 포함)의 병력이 있는 환자
5) 중증 간장애 환자
6) 맥각알칼로이드 및 그 유도제(아르고메딘, 디하이드로에르가타민 등)를 투여 받고 있는 환자(맥각 독성이 나타날 수 있다.)
7) 임부 및 수유부
8) 중추신경계 감염환자
9) 미줄라스틴, 베르티카를 투여 받고 있는 환자
10) 로바스타틴 또는 심바스타틴을 투여 받고 있는 환자
‘상호작용’ 참조)
11) 티카그렐로(cagrelor)를 투여받고 있는 환자

- 2. 다음 환자에는 신중하 투여할 것**
 - 1) 간장애 환자(주로 간을 통해 배설된다.) 2) 중등도에서 중증의 신부전 환자(혈중농도가 상승할 수 있음)
3) 삼진한 환자(QT 연장, 심실성 심부정맥(Torsades de pointes 포함)을 일으킬 수 있음.)
4) 고령자
5) 다른 항생물질(마크로라이드계, 린코마이신, 클린다마이신, 클로라페니콜 등을) 투여 받고 있는 환자(교차내성에 주의한다.)
6) 프로프록페틴, 카베콜린, 페르콜린, 에바스티ن, 디크로리무스, 플러로딘, 할로판트린을 투여 받고 있는 환자
7) 약물에 대한 알레르기가 있는 환자에 투여 시(특히 이 약의 성분과 유사한 구조를 가진 약물 투여 시)에는 신중하게 투여한다.

- 3. 이상반응**
 - 1) 속, 아나필락시스양 증상 : 드물게 속, 아나필락시스양 증상(호흡곤란, 경련, 발작 등을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상반응이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.)
2) 과민반응 : 때때로 발진, 두드레, 가려움, 두드러기, 경증의 피부발적, 맥관부종, 관절부종, 악열발진 등이 나타날 수 있다.
3) 소화기계 : 때때로 복부팽만감, 구역, 구토, 소화불량, 복통/복간, 가쓰상, 설사, 구강내 미란, 상복부통증(드물게 경련형태), 구갈, 일과성 치아변색, 드물게 헤장염, 아밀라제 증가, 미각이상, 식욕부진, 변비, 설석성 등의 위장관 장애가 나타날때는 보고가 있다. 위약상대대염, 출혈성 대장염 등 혈변을 동반한 대장염이 나타날 수 있으므로, 복통, 빈번한 설사가 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
4) 호흡기계 : 발열, 기침, 호흡곤란, 복통, X선 이상, 호산구 증가 등을 동반하는 호산구성 폐렴은 간질성폐렴 등이 성립 수 있으므로 이와 같은 증상이 발생하면 투여를 중지하고 코르티코이드의 투여 등 적절한 처치를 실시한다. 만성 기관지염 및 급성 상악동염의 급성악화로 판별되었다.
5) 혈액계 : 때때로 호산구 증가, 혈소판 감소, 범혈구 감소, 융혈성 빈혈, 백혈구 감소, 루프림증 등등 이 나타나기도 하므로 정기적으로 검사하여 충분히 관찰을 하고, 이상반응이 나타나면 투여를 중지하고는, 적절한 처치를 한다.
6) 중추신경계 : 어지러움, 우울, 미각소실, 후각상실, 불안, 드물게 불면, 악몽, 이명, 착란, 지남력장애, 환각, 정신병, 이인증, 경련(간질과대상, 간대상근경련증, 의식소실발작 등), 떨림, 마비감 등 일과성 중추신경계 이상반응이 나타났다는 보고가 있으나 이 약과의 관련여부는 밝혀지지 않았다. 행동변화, 조동행동등이 나타났으나 약물투여를 중단하면 소실되다. 여러 가지 이상반응이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상반응이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
7) 피부 : 스티븐스-존슨증후군, 독성표피괴사증후 등이 발진되기도 하므로 잘 관찰하고 이상반응이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 부신피질호르몬제 투여 등 적절한 처치를 실시한다. 알레르기성 자반병이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상반응이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
시판 후 경험 중 ‘호산구증가와 전신성 증상을 동반한 약물 발진(DRESS : drug rash with eosinophila and systemic symptoms)이 나타났다.
8) 간장애 : 다른 마크로라이드계 항생물질과 마찬가지로 드물게 혈변을 동반하거나 또는 동반하지 않는 간세포성 또는 담즙출혈성 장애, 간효소치의 증가를 포함한 간기능 장애가 나타났다는 보고가 있다. 이러한 간기능장애는 종종일 시적으로, 대체로 가역적이다. 몇몇 경우, 사망(Letal outcome)을 동반한 간부전이 보고된 바 있는데, 이는 대체로 중증의 기저질환 및/또는 병용투여된 약제와 관련이 있었다. 전격성간염, AST, ALT, γ-GTP, LDH, ALP 상승, 총 빌리루민 증가 등을 동반한 간기능장애, 황달, 간부전이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 식욕부진, 황달, 전신장애, 노, 가려움증 등, 또는 복부안통 등, 같은 간염의 증상과 징후가 나타날 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
9) 신장 : 드물게 혈청크레아티닌 상승이 일어났다는 보고가 있으나, 이 약과의 관련 여부는 밝혀지지 않았다. 드물게 혈액기능에 많은 대 BUN이 상승한다는 보고가 있다. 간질성 신염, 신부전, 헤장염 등이 보고되었다. 근육통, 무력감, CPK 상승, 혈중 및 요중 미오글로빈 상승을 특징으로 하는 횡문근융해증이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 실시하고 이상반응이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하는 등 횡문근융해증에 의한 급성 신부전이 나타날 수 있으므로 주의한다. 췌노 등의 증상이나 혈청크레아티닌치 상승 등 신기능 저하가 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
10) 군교대중 : 드물게 설염, 구내염, 구강칸디다증에 나타났다는 보고가 있다.
11) 순환기계 : 다른 마크로라이드계와 같이 QT연장, 심실성빈맥, Torsades de pointes 가 드물게 보고되었다.
12) 기타 : 드물게 편두통, 두통, 미각소실, 가역적인 경각성일, 이상감각증, 관절통, 근육통, 후각장애가 나타났다는 보고가 있다.
이명, 경각장애(신경성)가 발생하였으므로 투여를 중단하면 간소할 수 있으므로 투여 예정기간 동안 일일 ‘lg 이상 투여 시 다시 나타날 수 있다. 경구저혈당약을 또는 인슐린을 투여 받는 환자에서서 드물게 저혈당증이 나타났다는 보고가 있다.
시판 후 경험 중 횡문근융해증이 보고되었음. 일부 횡문근융해증의 보고서, 클레리트로마이신은 스티렌계, 페브레페린 또는 알로푸리놀과 병용투여 되었었다.
13)

슈클래리정

클키신과 병용투여시, 특히 고령자와 일부 신부전환자에게 클키신 독성이 나타났다는 시판 후 보고가 있었다. 이들 환자 중 일부에서는 사망사례도 보고되었다.
14) 면역기능이 저하된 환자에서 특정 검사에서 심각하게 비정상적인 수준(상한 또는 하한치)의 검사치를 보석하였을 때 1일 약 1,000mg을 투여한 환자의 약 2~3%에서 AST 및 ALT가 심각하게 비정상적인 수준으로 상승하고 백혈구와 혈소판수가 비정상적으로 낮았다. 또한 더 적은 수의 환자에서 BUN이 상승하였다.
15) 클레리트로마이신과 관련이 있을 수 있다고 판단되는 이상반응을 전신조직부종과 다음과 같은 빈도분류에 따라 아래 표로 나타내었다: 매우 흔하(≥ 1/10), 흔하(≥ 1/100 ~ < 1/10), 드물게(≥ 1/1,000 ~ 1/100), 그리고 not known(시판후조사에서 나타난 이상반응으로 데이터로부터 추정할 수 없음). 각 칸에서 이상반응은 중대함이 평가가능한 경우 중대함이 큰 순서부터 기재하였다.

	클레리트로마이신에 대해 보고된 이상반응			
전신조직분류	매우 흔하 ≥ 1/10	흔하 ≥ 1/100 ~ < 1/10	드물게 ≥ 1/1,000 ~ 1/100	not known* (데이터로부터 추정할 수 없음)
감염 및 기생충침범	연조직염, 간다증, 위장염, 감염, 질감염	위장성대장염, 단독, 알은은조직염, 홍색출진		
혈액 및 림프계	백혈구감소증, 중추구간감소증, 혈소판 감소, 호산구증가	무구핵구증, 지혈성빈증		
면역계 장애	아나필락시스양 반응, 과민성	아나필락시스반응, 혈관부종		
대사 및 영양 장애		식욕부진, 식욕감소	지혈당증	
정신 장애	불면증	불안, 신경과잉*, 소리지름*	정신병성 장애, 환각, 환청, 지남력장애, 환각, 비정상적인 꿈(abnormal dream), 조증	
신경계 장애	마직이상, 두통,	의식상실*, 운동이상성*, 비정상성 한기증, 졸음*, 진전	경련, 미각소실, 이상각성, 후각상실	
귀 및 미로 장애		전정성 한기증, 전정장애, 이명	난청	
심 장애		심장정지*, 심방세동*, 심전도이상(연장, 주기외수축*, 심계항진)	Torsade de pointes, 심실성빈맥	
혈관 장애	혈관확장		출혈	
호흡기, 흉부 및 종격 장애		천식*, 비출혈*, 폐색전증*		
위장관 장애	설사, 구토, 소화불량, 구역, 복통	식도염*, 위식도역류병*, 위염, 직장염증*, 구내염, 설염, 복부팽만*, 변비, 구갈, 트림, 고창	급성해장염, 허 변색, 치아 변색	
간기능 장애	간염증*, 간염, 알콜성 이디노트랜스퍼라제 상승, 아스파티이트 아미노트랜스퍼라제 상승, 감마-글루타미드 트랜스퍼라제 상승*		간부전, 간세포성 황달	
피부 및 피하조직 장애	발진, 다형증	수포성 피부염*, 가려움, 두드러기, 반구진성 발진*		
근골격 및 결합조직 장애		근육연축*, 근육과 경직*, 근육통*	횡문근융해*, 근육병증	
신경 및 비신경 장애		혈청크레아티닌 상승*, 혈중요소증*	신부전, 신경염	
일반적 장애 및 투여부위장애	위장적 장애	주사부위염증*	주사부위통증*, 주사부위염증*	
검사수치이상		양분비교로물린비 이상*, 혈중 알칼리성 포스파티아제 상승*, 혈중 락트산탈수소효소 상승*	국제표준화비율(INR) 증가, 프로트롬빈시간 연장, 노 색 이상	
* 이 항의 이상반응들은 불명확한 크기의 집단으로부터 자발적으로 보고된 것이므로, 그 빈도를 신뢰할 수 있도록 확립 하거나, 이상반응과 약효노출과의 인과관계를 확립하는 것이 항상 가능한 것은 아니다. 환자노출(exposure)은 클레리트로마이신에 대해 10일 patient treatment days를 초과할 때로 보고되었다. 주사제형에 대해서만 보고된 이상반응. *자발적장애에 대해서만 보고된 이상반응. *간조시럽제형에 대해서만 보고된 이상반응				

- 일반적 주의**
 - 1) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현을 방지하기 위하여 감수성을 확인하고 치료 상 필요한 최소 기간만 투여하는 것이 바람직하다. 2) 다른 항생물질과 같이 비감수성 세균 또는 군에 의한 감염이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
3) 이 약에 대해서 알레르기반응이 일어난다는 경우에는 투여를 중지한다.
4) 심각한 알레르기반응에는 에피네프린, 항히스타민제, 코르티코이드가 필요할 수 있다.
5) 마크로라이드계를 포함한 거의 모든 항생물질을 경증에서 중증에 이르는 범위의 위약상대대염을 일으킨다는 보고가 있다. Clostridium difficile ~ 관련 설사(CDAD)는 이 약을 포함한 거의 모든 항생제의 사용에서 보고되었다. 중증설사사태부터 치명적인 대장염에 걸쳐 나타날다. 이 약을 포함하여 항생제를 투여 환자들은 지속적인 설사가 나타나거나 환자에 대한 진단이 중요하다. 항생물질 투여에 대한 잠재적중독이 변화를 일으켜 클로스트리듐의 과잉번식을 일으킬 수 있다. 연구에 의하면 클로스트리듐 다이파셀에 의해 생성되는 독소가 항생물질관련 대장염의 주 원인으로 알려졌다. 위약상대대염으로 진단이 내려지면 치료를 시작해야한다. 경미한 위약상대대염은 투약중지에 의해 회복될 수 있다. 중등증 또는 중증의 경우에는 수액, 전해질, 단백질 보충 등의 처치를 하고 Clostridium difficile에 대해 임상적으로 효과있는 항생물질로 치료한다. Clostridium difficile ~ 관련 설사(CDAD)는 항생제의 사용에 의해 생가 나타나는 모든 환자에 대해 고려되어야 한다. Clostridium difficile ~ 관련 설사(CDAD)는 항생제 투여 후 2개월 이상 지난 이후에도 보고되었으므로, 주의 깊은 환자 약력 관리가 요구된다.
6) 마이크로박테를 아비움 복합감염(MAC) 치료를 위해 이 약을 투여 받는 HIV 양성 환자에 대한 일부 연구결과 500mg 1일 2회 이상 고농도를 투여 받는 환자의 경우 성공률이 낮은 결과가 관찰되었다. 이 연구결과에 대한 해석은 되어있지 않으나, 이 약을 MAC의 치료 또는 예방으로 사용하는 경우에는 적정 용량인 500mg 1일 2회 투여량을 초과하지 않도록 한다.
7) 간기능부전을 동반하거나 또는 나타날 환자의 경우 투여는 용량을 줄이고 투여 간격을 연장하는 것이 적절하다.
8) 다른 약과의 병용에 대한 주의사항에 대한 정보는 각 약물의 사용설명서를 참고하도록 한다.
9) 반복 투여 및 장기연용으로 인해 내성균이 과잉증식 할 수 있다. 만일 군교대중이 발생하면 이 약의 투여를 중지하고 적절한 대체요법을 실시한다.
10) 소수의 환자에서서 헬리코박터 피로리더 균이 내성을 나타낸다는 보고가 있다.
11) 1일 1g(약가) 또는 1g(약가) 이상을 장기간 복용하면 이명 또는 청각둔화가 나타날 수 있으나 투여를 중지하면 회복될 수 있다.
12) 인과관계가 성립되지는 않았으나 일부에서 치아변색이 발생하였으며, 일반관조 치과적 치료로 회복될 수 있다.
13) 이이코박티리아 균을 복합감염(MAC) 예방 및 치료를 위해 이 약을 투여 받는 HIV 양성 환자에서 내성이 나타났다는 보고가 있다.
14) AIDS 및 다른 면역기능 저하된 환자는 마이코박테리아 감염증에 대해 정기나 이 약을 투여 받으며 기존 HIV나 병발질환으로 인해 이상반응과 이 약과의 관련성을 구분하기 어렵다.
15) 클레리트로마이신을 투여 받는 환자들에서 중증 군무력증의 위험가 보고되었다.
16) QT 연장의 위험이 있으므로, QT 연장 및 torsades de pointes의 소인이 증가되는 것과 관련된 의학적 상태에는 환자에게 이 약을 사용할 시에는 주의를 기울여야 한다.
17) 최근 상가된 Streptococcus pneumoniae의 마크로라이드계 약에 대한 저항을 고려하여, 이 약을 지역사회획득폐렴(community-acquired pneumonia)의 치료에 처방 시 감수성 검사를 수행하는 것이 중요하다. 원내획득폐렴(hospital-acquired pneumonia)의 경우, 이 약을 적절한 추가적인 항생제와 병용하여 사용하여야 한다.
18) 경증 또는 중등도의 피부 및 연조직 감염은 대개 Staphylococcus aureus와 Streptococcus pyogenes

에 의해 일어나며, 이들은 마크로라이드계에 내성이 있을 수 있으므로, 감수성 검사를 수행하는 것이 중요하다.
19) 중증의 급성 과민반응(예, 아나필락시스, 스티븐스-존슨 증후군, 독성표피괴사증후, DRESS, Henoch-Schönlein 자반증, 급성 전신성 발진성 농포증(AGEP) 등)이 일어날 경우, 이 약의 투여를 즉시 중단하고 적절한 치료를 빠르게 실시하여야 한다.
20) 이 약이 온전 또는 기저조직 농력이 미치는 영향에 대한 자료는 없다. 약물투여와 함께 전정성, 비정상성 한기증, 착란 및 지남력장애가 발생할 가능성이 있으므로, 환자가 온전 또는 기저조직화기 전 이를 감안하도록 해야한다.
21) 마크로라이드계 항생물질을 인한 심혈관 질환의 위험성을 조사한 역학 연구는 다양한 결과를 나타내었다. 일부 관찰 연구에서는 드물게 클레리트로마이신을 포함한 마크로라이드계와 관련된 부정맥, 심근 경색 및 심혈관계 사망의 단기적 위험성이 확인되었다. 이러한 결과는 클레리트로마이신을 처방할 때의 치료 효과와 더불어 균형적으로 고려되어야 한다.

- 5. 상호 작용**
 - 1) 기타 내독성이 있는 약물, 특히 아미노글리코사이드와는 병용투여하지 않는다.
2) 테오필린 또는 카르바마제핀과 병용 투여하는 경우에는 이들 약물의 혈청농도가 증가한다는 보고가 있으므로 고용량의 테오필린을 투여하거나 테오필린 기저 농도가 상위 치료농도범위인 경우 테오필린의 혈중 농도 모니터링을 고려하여 하며 카르바마제핀과 병용투여 시 혈중농도 모니터링을 고려할 수 있다. 테오필린의 혈중 6.5mg/kg 또는 12mg/kg과 12시간마다 이 약 250mg 또는 500mg을 병용투여한 임상시험에서 테오필린의 항정상태 C_{max}, C_{min}과 혈중곡선하면적(AUC)이 약 20% 증가했다.
3) ① 시토콜롬 P450계로 대사되는 약물(아미린, 맥각알칼로이드, 트리아졸람, 미다졸람, 로바스타틴, 심바스타틴, 아도바스타틴, 디소피라미드, 페니토인, 시아클로포리틴, 헥소바르탈, 알펜타닐, 프로프록페틴, 발로레이트, 메칠프래드니솔론, 실데나필, 빈볼라스틴, 알프로라람, 아스테미졸, 카르바마제핀, 실로스타졸, 시사프린*, 오메프라졸, 피오지, 퀴니딘, 리파무틴, 디크로리무스, 테르페닌, 돔페리돈과 병용 투여하는 경우에는 다른 마크로라이드계 항생물질과 같이 이들 약물의 혈청농도를 상승시킬 수 있다.
② 에파비라펜, 비버리핀, 리팜핀, 리파무틴 및 리파네티딘과 같은 시토콜롬 P450 대사계의 강력한 유도제들은 클레리트로마이신의 대사를 촉진하여 클레리트로마이신의 혈청 농도를 낮추는 반면, 미생물학적으로 활성이 있는 대체제인 14-OH-clarithromycin의 혈청 농도를 상승시킨다. 클레리트로마이신과 14-OH-clarithromycin의 미생물학적 활성은 다른 군에 대해 다르게 나타나므로, 위의 효소 유도제들과 클레리트로마이신을 병용 투여하면 의도한 치료효과를 나타내지 못할 수 있다.
③ CYP3A의 우도제에 되는 약물들(예, 리팜핀, 페니토인, 카르바마제핀, 페노바르탈, St. John's wort)이 이 약의 대사를 유도할 수도 있다. 이는 이 약의 치료농도범위내의 농도(sub-therapeutic level)로 이어져 약효감소가 일어날 수 있다. 또한, 이 약의 CYP3A 억제작용에 기인하여 CYP3A 유도제의 혈청농도가 증가할 수 있으므로 모니터링하는 것이 필요할 수도 있다(투여된 CYP3A 유도제에 관련된 허가사항도 참고하도록 한다.).
4) CYP3A 효소와 연관된 약물상호작용이 아미노 및 에리트로마이신 성분 및노는) 클레리트로마이신 성분에서도 보고되었다. 클레리트로마이신은 CYP3A를 저해하는 것으로 알려져 있으며, CYP3A로 주로 대사되는 약물들의 병용투여는 약물농도의 상승과 연관되어 병용 투여한 약물의 치료효과와 이상반응의 증가 및 연장을 일으킬 수 있다. 클레리트로마이신은 CYP3A 효소의 기질로 알려진 약들 (예 : 카르바마제핀)을 가지고/또는 이 효소에 의해 주로 대사되는 다른 약물을 투여 받을 때는 환자의 병용 투여 주의가 사용되어야 한다. 가능한 경우 용량 조절이 고려될 수 있으며, 클레리트로마이신을 투여 받고 있는 환자들은 CYP3A에 의해 주로 대사되는 약물의 혈청 농도를 주의 깊게 모니터링 하여야 한다.
① 테르페나딘과 병용투여하는 경우에는 드물게 QT 연장, 심실성 부정맥(Torsades de pointes 포함), 심장지(사망 포함), 심실성 빈맥, 심실세동 등의 심혈관계 이상반응이 나타났다는 보고가 있으므로 병용투여하지 않는다. 아스테미졸과 다른 마크로라이드계 항생물질을 병용투여하는 경우에도 유사한 결과가 나타났다는 보고가 있다.
② 시사프린과도 병용투여하는 경우에는 시사프린도 농도가 증가하였다는 보고가 있다. 이와 인 QT 경과와 심실성 빈맥, 심실세동 및 Torsades de pointes를 포함한 부정맥으로 될 수 있다. 유사한 효과가 피오짓과 병용투여 시 나타났다는 보고가 있으므로 병용투여하지 않는다.
③ 이 약과 로바스타틴 또는 심바스타틴과의 병용투여는 금기이다. 다른 마크로라이드계 약물과 같이, 이 약도 HMG-CoA reductase inhibitor의 농도를 증가시키는 것으로 보고되었다. 이 약물과 병용투여하는 환자들에게서 드물지만 횡문근융해증이 보고되었다. 환자들은 근육경색의 징후와 증상 등을 모니터링 해야 한다. 이 약과 아트로바스타틴 또는 로수바스타틴을 병용투여 하는 환자들에게서도 또한 횡문근융해증이 드물게 보고되었다. 클레리트로마이신과 병용할 때, 아트로바스타틴 또는 로수바스타틴의 가장 가능한 최저 용량을 투약해야 한다. 스타틴 용량의 조절이나 CYP3A 대사에 영향이 없는 스타틴(예, 플루바스타틴 또는 프라바스타틴)의 사용을 고려하여 한다.
④ 미다졸람과 클레리트로마이신정제(500mg 1일 2회 투여)를 병용투여 했을 때, 미다졸람 AUC 는 정맥 투여 후 27배, 경구 투여 후 7배 증가되었다. 미다졸람과 클레리트로마이신을 경구로 병용투여해서는 안된다. 미다졸람과 클레리트로마이신을 정맥으로 병용투여 했을 때, 용량 조절을 위하여 환자를 면밀히 모니터링 하여야 한다. 트리아졸람과 알프로라람을 포함한, CYP3A로 대사되는 다른 벤조디아제핀류와도 같은 주의사항이 적용된다. CYP3A에 의해 대사되지 않는 벤조디아제핀류들 (테마제람, 니트라제람, 로라제람), 클레리트로마이신과의 상호작용은 임상적으로 중요하지 않다. 의국의 시판 후 조사에서 이 약과 테마자람 병용투여 시 졸음, 착란과 같은 중추신경계 영향이 보고되었다. 중추신경계의 약리학적 활성이 증가된 환자는 이 약으로 요양된다.
⑤ 퀴니딘 또는 디소피라미드와 병용투여하는 경우, Torsades de Pointes가 발생했다는 시판 후 보고가 있었다. 이들 약물의 혈중농도와 QT 연장에 대해 심전도를 모니터링한다. 시판 후 조사에서 디소피라미드와 병용투여 하는 경우 저혈당증이 발생했다는 보고가 있었다. 따라서 투여 중 혈당을 모니터링 하여야 한다.
⑥ 에르리나딘 또는 디하이드로에르리나딘과 병용투여하는 경우 사지 및 중추신경계를 포함한 조직의 혈관경직 및 허혈과 같은 증상을 특징으로 하는 급성 에르도 독성이 보고되었다. 클레리트로마이신과 이 약물과의 병용투여는 금기이다.
⑦ 실데나필, 타달라필, 비테나필; 이들 각각의 포스포디에스테라제 저해제들은 적어도 일부부 CYP3A에 의해 대사되며, CYP3A는 병용투여 된 클레리트로마이신에 의해 저해된다. 위 약물들과 클레리트로마이신의 병용투여는 포스포디에스테라제 저해제들의 상승을 야기할 것이다. 클레리트로마이신과 위 약물들을 병용투여하는 경우, 위 약물들의 용량 감소를 고려하여야 한다.
5) 다국적인 유출운반자(efflux transporter)인 P-glycoprotein(Pgp)의 기질로 여겨진다. 클레리트로마이신은 Pgp를 저해하는 것으로 알려져있다. 클레리트로마이신과 다국적인 병용 투여했을 때, 클레리트로마이신에 의한 Pgp의 저해는 다국신 수치의 상승을 야기한다. 다국신의 혈청농도를 상승시킨다는 보고가 있으므로 다국신과 병용투여를 하는 경우에는 다국신의 혈청농도를 모니터링한다. 일부 환자에서는 치명적인 수 있는 부정맥을 포함한 다국신 독성과 일치하는 임상증상이 나타진다.
6) HIV 감염 성 환자에게 이 약과 지도부전을 경구로 병용투여하는 경우에는 지도부전의 흡수를 방해하여 지도부전 농도 향상상태를 저하시킨다. 이 약은 동시 투여한 경구 지도부전의 흡수를 방해하는 것으로 나타났으며 이 약과 지도부전의 투여 간격을 두면 이 상호작용을 대부분 피할 수 있다. 이 약과 지도부전 또는 디데옥시이노신을 병용투여한 소아 HIV 환자에서는 이러한 상호작용이 관찰되지 않았다. 성인 HIV 환자에게는 디다노시딘 약동학에 대해 통계적으로 유의한 영향은 없었다.
7) 판소파라졸과 병용투여하는 경우에는 혈청 농도가 경하게 상승한다는 보고가 한 건이 있었으나, 용량 조절 없이 다른 결과를 뒷받침할만한 자료는 없다.
간강한 성인에 대해 8시간마다 클레리트로마이신 500mg과 1일 1회 오메프라졸 40mg을 병용투여 하였을 때 항정상태 오메프라졸의 C_{max},AUC₀₋₂₄와 T_{1/2} 각각 30%, 88%, 34% 증가했다. 평균 24시간 내 위장 pH가 오메프라졸 단독투여 시는 5.20이 이 약과 병용 투여했을 때는 5.70이었다.
8) 리팜핀 또는 리팜핀과 병용투여하는 경우 클레리트로마이신 농도가 감소된다. 클레리트로마이신은 리파부틴의 혈청 및 조직 내 농도를 증가시켜 독성을 증가시킬 수 있고, 포도막염의 위험성 증가를 초래하였다.
9) 리토나비르와 병용투여하는 경우에는 클레리트로마이신의 대사를 현저히 방해한다는 약물동력학 연구보고가 있다. 클레리트로마이신의 치료영역이 넓기 때문에 신기능이 정상인 환자에 대해서는 용량감소가 필요하지 않으나 신부전 환자는 다음과 같이 용량조절이 필요하다. 즉 크레아티닌창소율이 30~60mL/min인 환자는 용량을 50% 줄여서 사용하고, 크레아티닌창소율이 30mL/min 이하인 환자는 75% 줄여서 사용한다. 리토나비르와 병용투여 시 클레리트로마이신의 용량이 1g/일을 초과하지 않는다. 인디나비르와 병용투여 시에는 대사상호작용이 나타난다는 보고가 있다. 그러나 신기능이 정상인 환자에 대해서는 용량조절이 필요하지 않다. 신부전 환자에서 리토나비르를 다는 HIV 프로테아제 억제제(아타나비르, 시쿠나비르 포함)에 대한 약동학 강화제(pharmacokinetic enhancer)로서 사용할 경우, 유사한 용량조절을 고려하여야 한다.
10) 디크로리무스와 병용투여하는 경우에는 디크로리무스의 혈청농도를 증가시켜서 독성을 증가시킬 수 있다.
11) 아목시살린 및노는) 오메프라졸과 병용투여하는 경우에는 각 약물에 대한 사용상의 주의사항, 약물상호작용 등을 참고한다.
12) 크레아티닌창소율이 25mL/min 이하인 환자에게 구연산나트륨 비스무스염과 병용하는 것은 바람직하지 않다. 급성포도막염의 병력이 있는 환자에서는 구연산나트륨 비스무스와 병용하지 않는다. 구연산나트륨비스무스염과 병용투여 시 혈중 라니티딘의 농도는 57% 상승, 혈중 비스무스 최저 농도는 48% 상승했으며 14-하이드록시-클레리트로마이신의 농도는 31% 증가했으며 이는 임상적 의미가 없다.
13) 클레리트로마이신과 이트라코나졸은 CYP3A의 기질이며로서 또한 저해제이며, 양방향 약물 상호작용을 일으킨다. 클레리트로마이신은 이트라코나졸의 혈청 농도를 증가시키며, 이트라나졸은 클레리트로마이신의 혈청 농도를 증가시킨다. 이트라코나졸과 클레리트로마이신을 병용 투여받는 환자는 약물학적 활성의 증가 또는 연장의 인술에 대해 주의 깊게 모니터링 되어야 한다.
14) 경구용 혈당강화제에: 설폰닐우리아제 약물) 그리고/또는 인슐린과 병용 투여 하는 경우에는 현저하게 저혈당이 나타날 수 있다. 테라글리나이드, 피오글리타존, 레페글리나이드, 로지글리타존과 병용시, 클레리트로마이신을 의해 CYP3A 효소가 저해될 수 있으며, 저혈당을 일으킬 수 있다. 혈당을 주의깊게 모니터링 하도록 한다.
15) 플리디핀과 병용 투여하는 경우에는 약물배합이 지연되어 약물효과가

상승될 수 있으므로 주의한다.
16) 베르티립, 미줄라스틴, 에바스티인과 병용 투여하는 경우에는 심실운동, 특히 Torsades de pointes 장애의 위험이 있다.
17) 가비콜린, 페르콜리드와 병용 투여하는 경우에는 과다투여 시 작용이 증가하고 혈청농도가 증가할 수 있다.
18) 플러터딘과 병용 투여하는 경우 플러터딘을 신진대사가 느린 환자에게 과다투여 시 플러터딘의 혈청농도가 상승할 수 있다. 플러터딘의 주요 대사 경로는 시토콜롬 P450의 2D6 isoloform(CYP2D6)이나, CYP2D6가 결여된 집단에서는 CYP3A로 대체되는 것으로 확인되었다. 이러한 집단에서 CYP3A를 저해하면, 플러터딘 혈청농도의 증대만 상승이 야기되었다. CYP2D6에 대해 약한 대사능을 가진 집단(CYP2D6 poor metabolizer)에게 클레리트로마이신과 같은 CYP3A 저해제를 병용하는 경우, 플러터딘의 용량 감소가 요구된다.
19) 할로판트린과 병용 투여하는 경우에는 심실운동, 특히 Torsades de pointes 장애의 위험이 있으므로 기능하면 QT 검사를 미리 실시하거나 심전도를 모니터링 감독한다.
20) INR(국제제정화비율)의 변화 : 이 약을 포함한 항생물질을 항응고제와 동시에 투여 받은 병용환자의 항응고 효과가 혈청의 증가가 보고되었다. 간접성혈전해고에 혈중응 과정을 동반한, 환자의 연령과 일반적인 상태는 위험소인이 된다. 이 약과 와파린을 병용투여 했을 때, 심각한 출혈의 위험이 있고, INR과 프로트롬빈 시간의 현저한 증가가 있었다. 이 약과 경구용 항응고제를 병용투여할 때는 INR과 프로트롬빈 시간을 자주 모니터링해야 한다. 필요한 경우 경구용 항응고제의 용량을 적절히 조절한다. 항생물질의 일부 종류들, 특히 플루오퀴놀론, 마크로라이드, 사이클린, 코르티코스테로이드 및 세팔로스포린의 경우는 더 심하다.
21) 갑상선질환(파티피딘, 연선패라피딘 등)와 병용 시 주의한다. 클레리트로마이신과 배라피필을 병용하는 환자에서서 저혈당, 사맥성 부정맥 및 유산증 (lactic acidosis)이 관찰되었다.
22) 건강한 지원자에 대해 프로코나졸 200mg 1일 1회와 클레리트로마이신 500mg 1일 2회 병용 투여했을 때 이 약의 평균 항정상태 C_{max}와 AUC가 각각 33%, 18% 증가했으나 14-OH-클레리트로마이신의 농도는 현저한 영향을 받지 않았다. 클레리트로마이신의 용량조절은 요구되지 않는다.
23) 클키신과 병용투여 시, 특히 고령자와 일부 신부전환자에서 클키신 독성이 보고되었으며 일부에서는 사망사례도 보고되었다. 클키신은 CYP3A 및 유출운반자(efflux transporter)인 P-glycoprotein(Pgp)의 기질이다. 클레리트로마이신과 다른 마크로라이드계 항생물질들은 CYP3A 및 Pgp를 억제하여 클키신에 대한 노출이 증가될 수 있으므로 병용투여시 클키신 독성의 임상증상에 대하여 모니터링해야 한다. 클키신은 Pgp 또는 강력한 CYP3A4 저해제를 복용하는 신 장에 또는 간 장애 환자에서 금기이므로, 이런 환자에서 클키신과 이 약을 병용투여해서는 안 된다.
24) 클레리트로마이신과 이타나비르리는 CYP3A의 기질이며로서 또한 저해제이며, 양방향 (bi-directional) 약물상호작용에 대한 것들이 존재한다. 클레리트로마이신(500mg 1일 2회)과 이타나비르(400mg 1일 1회)를 병용투여하면, 클레리트로마이신의 수치는 2배 증가하며 14-OH-클레리트로마이신은 70% 감소하고, 아타나비르의 AUC는 28% 증가한다. 클레리트로마이신의 넓은 치료범위(therapeutic window)로 인하여, 정상적인 신기능을 가진 환자에서 클레리트로마이신의 용량 감소는 요구되지 않는다. 온전한 신기능(creatinine clearance 30~60 mL/min)을 가진 환자의 경우, 클레리트로마이신의 용량은 50% 까지 감소되어야 한다. 크레아티닌 클리어런스(creatinine clearance)가 30 mL/min 미만인 환자의 경우, 클레리트로마이신의 용량은 적절한 용량(클레리트로마이신 500mg 1일 2회)과 시쿠나비르(연질판슬 1,200mg 1일 3회)를 병용투여 한 결과, 시쿠나비르의 항정상태의 AUC 와 C_{max}수치는 단독 투여 시 보다 177% 및 187% 상승하였다. 클레리트로마이신의 AUC 와 C_{max}수치는 단독 투여 시 보다 약 40% 상승하였다. 시험에 사용된 용량/제형 에서 두 약물의 용량조절은 요구되지 않는다. 시쿠나비르 연질 판슬을 이용한 약물상호작용 시험의 결과는 경질 판슬 제형을 사용했을 때의 결과를 대표하지 않는다. 시쿠나비르를 단독 투여하여 수행한 약물 상호작용 시험의 결과는, 시쿠 나비르/리토나비르를 투여했을 때의 효과를 대표하지 않는다. 시쿠나비르와 병용하여 투여했을 때에는, 리토나비르의 클레리트로마이신에 대한 잠재적인 영향에 대한 고려를 하여야 한다.
26) 클레리트로마이신 노출은 에르트리라이에 의해 감소되나도, 할상대제인 14-OH-클레리트로마이신의 농도는 증가되었다. 14-OH-클레리트로마이신은 Mycobacterium avium complex (14)에 대해 감소된 활성을 가지므로, 이 병원에에 대한 총 활성이 변경될 수도 있다. 따라서, MAC의 치료에 있어서 이 약의 대체제를 고려하여야 한다.

- 6. 임부 및 수유부에 대한 투여**
 - 1) 임부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로, 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 투여하지 않는다.
2) 이 약은 모유 중으로 분비되므로 수유부에는 투여하지 않으며 부득이 투여하는 경우에는 수유를 중지한다. 영아가 시사프린으로 치료 중이고 수유를 하고 있다면 약물상호작용이 있을 수 있으므로 수유자에게 이 약을 투여하지 않는다.

- 7. 소아에 대한 투여**
 - 1) 이 약 정제에 대한 12세 미만 소아에 대한 연구가 되어있지 않다.
2) 이 약 건조시럽에 대한 6개월 미만의 영아에 대한 연구가 되어있지 않다. 폐렴의 경우 이 약 건조시럽에 대한 3년 이하의 소아에 대한 연구는 없다.
3) 이 약의 20개월 미만 MAC 환자에 대한 연구결과는 없다.
4) MAC 성립 직후 및 성장기 동물에 대한 이 약의 내약성은 성장 동물의 내약성과 유사하였다. 어린 동물은 급성 과량투여 시 보다 경미한 정도의 불내약성을 나타내고, 적혈구, 혈소판, 백혈구의 경미한 감소를 나타낸다. 그러나 간, 신장, 흉선 및 생식기관에 대한 독성은 덜 민감하였다.
5) 3세 환자에 대해 발프로에이트 및 페노바르비탈과 병용투여 하였을 때 이들 약물의 농도가 증가하여 과도한 진정작용이 관찰되었다. 원인과 효과에 대한 상관관계가 성립되지는 않았지만, 발프로에이트 및 페노바르비탈 농도에 대한 모니터링을 고려해야한다.
- </