

콘센비타프리미엄정

일반의약품

분류번호

319
(7타의 비타민제)

콘드로이틴은 연골의 구성요소로서 관절의 연골에 직접 영양을 공급하고, 스트레스를 흡수시켜주는 유액이 연골에 머물도록 해서 탄력을 늘리는 중요한 기능을 합니다.

활성비타민 B₁, B₂를 포함한 비타민 B군은 피로 회복에 도움을 주고, 신경통·근육통·관절통 개선에 효과적입니다.

원료약품의 분량 (1정 중)

콘드로이틴설페이트나트륨(KP).....	600mg
γ-오리자놀(KP).....	5mg
콜린타르타르산염(USP).....	20mg
이노시톨(KP).....	20mg
푸르셀타민(KP)(활성비타민B ₁).....	60mg
리보플라빈부티레이트(KP)(활성비타민B ₂).....	6mg
니코틴아미드(KP)(비타민B ₃).....	60mg
판토텐산칼슘(KP)(비타민B ₅).....	15mg
피리독신염산염(KP)(비타민B ₆).....	25mg
시아노코발라민1000배산(KP)(비타민B ₁₂).....	20mg
(시아노코발라민으로서 20μg)	

성상

갈색의 장방형 필름코팅정

ID·CP



효능·효과

- 다음경우의 비타민 B₁, B₂, B₆의 보급
 - 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통 (요통, 어깨결림 등)
 - 각기, 눈의 피로

용법·용량

12세 이상 어린이 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 식후 복용합니다.

사용상의 주의사항

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후
복용하시기 바랍니다.

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - (1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - (2) 만 3개월 미만의 젖먹이
 - (3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - (2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 구역, 구토, 묽은 변, 설사, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부팽만감
 - (2) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
 - (3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
 - (4) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
 - (5) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - (6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

※ 콘센비타-1141230

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- (2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

6. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- (2) 직사광선을 피하고 뭉 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관하십시오.
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위 45정, 90정

*이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결
기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

*이 설명서는 2014년 12월 30일자로 작성되었으며
이 후로 변경된 내용은 홈페이지(www.ildong.com)
에서 확인할 수 있습니다.

제조사: (주)마더스제약

경상북도 경산시 진량읍 공단6로 24길 18

제조의회사 : 일동제약주식회사

본사 서울특별시 서초구 바우뫼로 27길 2

공장 경기도 안성시 공단1로 25 www.ildong.com

소비자상담실 : (전화)080-022-1010(수신자부담)

※콘센비타-1141230