

갑갑한 코막힘을 Cool 하게

노즈쿨점비액

【성분·함량】 (100ml 중)

나파졸린염산염(USP)	50mg
클로르페니라민말레산염(USP)	250mg
글리시리진산이칼륨(KP)	300mg
첨가제(보존제): 파라옥시벤조산프로필(NF)	10mg
첨가제(보존제): 파라옥시벤조산메틸(NF)	90mg

【성 상】

일정량씩 분무되는 용기에 든 특이한 방향성이 있는 무색 투명한 액제

【효능·효과】



코감기(급성비염(코염)), 알레르기성 비염(코염) 또는 부비동염에 의한 다음 증상의 완화 : 코막힘, 콧물, 재채기, 머리무거움

【용법·용량】

성인 및 7세 이상의 소아 : 1회 1-2번씩 비강(코안)내에 분무합니다(뿌립니다).

3시간 이상의 투여간격을 두며 1일 6회를 넘지 않도록 합니다.

「노즈쿨점비액의 사용설명서」



- ① 사용하기 전에 코를 먼저 깨끗하게 퓼니다.
- ② 약을 잘 흔들어 섞이게 한 뒤, 파란색 안전핀을 제거하고 투명한 뚜껑을 엽니다.
- ③ 양 손가락 사이로 노즐이 들어가게 잡고 엄지로 약통 아랫부분을 지지한 뒤, 허공에 2~3회 시험 분무를 합니다.
- ④ 머리를 살짝 숙이고 한쪽 코를 막은 상태로 노즐의 1/2~1/3을 넣고 코 중앙에서 바깥쪽을 향해 빠르게 분무해 주면서, 숨을 들이마셔야 합니다.
- ⑤ 들이마시고 바로 숨을 내쉬지 않고 조금 참았다가 입으로 숨을 내뿔으면 됩니다.
- ⑥ 반대쪽 비강(코안)도 동일하게 반복합니다.
- ⑦ 사용 후 노즐을 깨끗한 휴지나 수건으로 닦고 안전핀을 재설치한 후 뚜껑을 닫아서 보관합니다.

「노즈쿨점비액 사용 시 주의사항」

- ① 구멍을 바늘로 뚫거나 절단하지 마십시오.
- ② 오랫동안 사용하지 않다가 재사용하는 경우에는 반드시 시험분무를 한 후에 사용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 마십시오.

- 1) 만 7세 미만의 유아
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 3) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 4) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자는 신중히 투여하십시오.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 2) 지금까지 약(비염(코염)용 분무제 포함)에 의해 알레르기증상(예 : 발열, 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 부종, 자극감, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 고혈압, 심장질환, 당뇨병, 갑상선질환, 녹내장 환자
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 5) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 6) 다음과 같은 기침이 있는 사람 : 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열 · 발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 사용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 : 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 부종(부기), 자극감, 가려움
- 2) 3일간 사용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

4. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지켜 주십시오
- 2) 이 약은 과도하게 사용하면 오히려 코막힘을 일으킬 수 있으므로 과도하게 사용하지 마십시오.
- 3) 이 약은 비염(코염)용 분무제로만 사용하고, 눈과 귀에는 사용하지 마십시오.
- 4) 오염을 방지하기 위해 가능한 공동으로 사용하지 마십시오.
- 5) 7일 이상 계속 사용하지 마십시오.
- 6) 사용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작에 주의하십시오.
- 7) 사용 시에는 음주하지 마십시오.
- 8) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 사용하십시오.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관 하십시오
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관 하십시오
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 3년

【포장단위】 18ml

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회고시 '소비자 분쟁 해결 기준' 에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.

■ 제품문의 (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

제조외곽자 :  신일제약(주)

본사 : 서울시 동대문구 사가정로 272

공장 : 충북 충주시 양성면 북상골길 28

제조사 : 성광제약(주)

충남 천안시 서북구 백석공단 1로 47

