

의약품은 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

카디나정

CADINA^{Tab.}

(칼리디노게나제)

전문의약품
분류번호:219

순환기계 장애 치료제

[원료약품 및 분량] 1정 중

유효성분 : 칼리디노게나제(JP)50 I.U.

첨가제(타르색소) : 적색3호, 적색40호

동물유래성분 : 무수유당(소, 우유)

기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 콜로이드성이산화규소, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프로멜로오스프탈레이트

[성 상] 적색의 원형 장용성 필름코팅정

[효능·효과]

1. 다음 질환에 의한 말초순환장애 : 고혈압, 메니에르증후군, 폐색성혈전혈관염(버거병)
2. 갱년기장애, 망맥락막의 순환장애에 의한 여러 증상의 개선

[용법·용량]

1일 30~150 I.U.를 3회 분할하여 경구 투여한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 뇌출혈 직후 등의 출혈 환자
 - 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 부작용
 - 1) 과민증 : 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
 - 2) 순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있다.
 - 3) 소화기계 : 때때로 위부불쾌감, 구역, 구토, 식욕부진, 상복부통, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다.
 - 4) 기타 : 때때로 열감, 드물게 두통, 두중, 졸음, 권태감 등이 나타날 수 있다.
3. 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 24개월

[포장단위] 30정/병, 300정/병

- ※ 의약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여 주시기 바랍니다.
- ※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)을 참조하세요.
- ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.pharvis.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223)
- ※ 소비자상담실 : 02)579-6262

본 의약품은 우수 의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

작성일자 : CDNT 2020.01.03 (I-200103)

제조의뢰자
PHARVIS (주) 한국파비스제약
KOREA
경기도 안산시 단원구 신안로 88번길 127

제조사



메디카코리아

경기도 안산시 단원구 새마을로 111