

※ 의약품 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

근육경련 및 혈액순환 개선제

마그셀 연질캡슐

분류번호:315 **KGMP**
일반의약품 **적격업체제품**

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

산화마그네슘(KP) 250mg

(마그네슘으로서 150.8mg)

토코페롤아세테이트(KP) 500mg

(비타민 E로서 500 IU)

셀레늄함유건조호모(KPC) 20mg

(셀레늄으로서 10.8μg)

첨가제(타르색소) : 황색 5호, 청색 1호, 적색40호

첨가제(동물유래) : 속신산젤라틴, 젤라틴(기원동물 : 소, 사용부위 : 가죽)

[성상] 회백색 또는 미황색의 점조성 내용물이 든 적갈색의 연질캡슐제

[효능·효과]

○ 다음경우의 비타민 E의 보급

- 노년기

· 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)

○ 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

[용법·용량] 12세 이상 및 성인 1일 2회 1회 1캡슐

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자 2) 만 12개월 미만의 젖먹이 3) 심한 증상의 신부전 환자
- 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 3) 심장·순환기계기능 장애 환자 4) 신장장애 환자 5) 저단백혈증 환자
- 6) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.
- 7) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 체장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서 소지하십시오.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우

- ① 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(종혈되어 붉어짐) ② 붉은 반점, 설사, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하
- ③ 피부염, 딸·호흡 시 악취, 탈모, 조급증, 구토

2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.

3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.

4) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 유헤성심부전, 부종(부기)등의 증상이 나타날 수 있습니다.

5) 항알도스테로제, 트리암테네과 병용(함께복용(사용))투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.

6) 우발적으로 과량복용한 경우 7) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다. 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관하십시오.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 120캡슐, 360캡슐

[판매처] (주) 대웅생명과학/ 서울시 강동구 강동대로 189

[제조외국] 슈빌생명과학(주) / 경기도 화성시 양감면 두머리길 16

[제조자] (주)동구제약 / 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 18

※ 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품판매업자에게만 바꾸실 수 있습니다.

※ 이 첨부문서 작성일자(2013년 11월 10일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색'에서 확인할 수 있습니다.

☎ 소비자 상담실 (02)561-4011

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.