

골관절염 치료제

세레인캡슐.50mg

디아세레인



골관절염 치료제

전문 의약품
분류번호 03990

세레인캡슐.50mg

Cerhein Cap.50mg

■ 성분 · 함량

1캡슐 중 디아세레인(KPC) ... 50mg
첨가제(타르색소):황색5호, 황색 203호 / 첨가제(동물유래성분):유당수화물(소,우유)

■ 성상

황갈색의 내용물이 들어있는 상부 황색, 하부 연황색의 경질캡슐제

■ 효능 · 효과

골관절염(관절증, 퇴행성 관절질환)

■ 용법 · 용량

성인 : 디아세레인으로서 1일 50~100mg을 1~2회 분할하여 식후 경구투여 한다.증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 염증성 대장 질환 환자(궤양성 대장염, 크론병)
 - 2) 장폐색 증후군 환자
 - 3) 원인불명의 복통 환자
 - 4) 이 약 또는 이 약의 구성성분 및 Rhein계(안트라퀴논 배당체) 약물에 과민반응 환자
 - 5) 중증의 간부전 환자
 - 6) 15세 미만의 소아
 - 7) 이 약은 유당수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 소장, 결장 질환의 병력이 있는 환자(이 약은 안트라퀴논류이므로 투여하지 않거나 또는 신중히 투여한다.)
 - 2) 임부 및 수유부
 - 3) 고령자(용량 감소가 필요하다.)
 - 4) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 이상반응

- 1) 소화기계 : 설사, 묽은 변, 복통, 장기투여 시 위장장애(출혈, 궤양 및 천공), 드물게 직장 점막의 색소 침착이 나타날 수 있다.
- 2) 피부 : 가려움, 발진, 습진 등이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의 - 장기 연용할 경우 의사의 지시에 따른다.

5. 상호작용

- 1) 칼슘, 마그네슘, 알루미늄을 함유하는 제산제 및 소금은 이 약의 위장관 흡수를 저해하므로 가능하면 2시간 이상의 간격을 두고 투여한다.
- 2) 이뇨제와 병용투여시 이뇨작용이 약하게 증강될 수 있다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 동물실험에서 태자의 골형성 지연이 보고 되었다.
 - 2) 이 약이 인체 내에서 태자에 미치는 영향에 대한 자료는 없으나 모유 중으로 안트라퀴논은 유도체가 소량 이행되므로 임부 및 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

7. 과량투여시의 처치

- 1) 증상 : 과량투여 시 심한 설사가 나타날 수 있다.
- 2) 처치 : 필요시 전해질 공급 등의 대증요법을 실시한다.

■ 저장방법 · 사용기간

기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36 개월

■ 포장단위

자사기준 ■제조자 메디카코리아(주) - 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 96

연락처 (02)848-8487 / 소비자상담실 080-700-0052 / <http://www.koreaprime.co.kr>

본 의약품은 엄격한 품질관리하에 제조된(K.G.M.P)적격업체 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변형 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

개정일자: 2013.07



제조의회사 · 판매처

한국프라임제약

전라북도 완주군 봉동읍 완주산단9로 100