

ARB+CCB 복합 혈압강하제

메디로텐® 정

5/80밀리그램 5/160밀리그램 10/160밀리그램

(암로디핀베실산염 / 발사르탄)

MEDILOTEN Tab.

5/80mg 5/160mg 10/160mg

분류번호 : 214



저희 메디코코리아는 인간중심의 기업, 함께 나눌 줄 아는 기업이란 경영이념을 바탕으로 인류의 건강과 아름다운 삶을 위해 우수한 품질의 제약을 공급해드리고자 노력하고 있습니다. 저희가 생산하는 의약을 하나 하나에는 생명의 존엄성을 가장 귀한 가치로 여기는 메디코코리아 입작전들의 정성이 깃들어 있습니다.

【성분·함량】 1정 중

- 메디로텐정 5/80밀리그램 : 암로디핀베실산염(USP)(암로디핀으로서 5mg) 6.94mg
발사르탄(USP)..... 80mg
- 메디로텐정 5/160밀리그램 : 암로디핀베실산염(USP)(암로디핀으로서 5mg)..... 6.94mg
발사르탄(USP)..... 160mg
- 메디로텐정 10/160밀리그램 : 암로디핀베실산염(USP)(암로디핀으로서 10mg)..... 13.87mg
발사르탄(USP)..... 160mg

【성상】

- 메디로텐정 5/80밀리그램 : 어두운 황색의 원형 필름코팅정
- 메디로텐정 5/160밀리그램 : 어두운 황색의 장방형 필름코팅정
- 메디로텐정 10/160밀리그램 : 밝은 황색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

암로디핀 또는 발사르탄 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 본태성 고혈압

【용법·용량】

이 약의 권장용량은 1일 1회 1정으로, 식사와 관계없이 물과 함께 복용합니다. 가능하면 매일 같은 시간(예 : 아침)에 복용할 것이 권장됩니다.

이 약을 투여하기 전에 개개의 성분(암로디핀 또는 발사르탄)으로 용량을 조절할 것이 권장되나, 다음과 같이 개개의 성분에 대한 단독요법으로 혈압이 조절되지 않는 경우 이 약으로 바로 전환하는 것을 고려할 수 있습니다.

- 5/80밀리그램 : 암로디핀 5밀리그램 또는 발사르탄 80밀리그램 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 환자에 투여합니다.
- 5/160밀리그램 : 암로디핀 5밀리그램 또는 발사르탄 160밀리그램 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 환자에 투여합니다.
- 10/160밀리그램 : 암로디핀 10밀리그램 또는 발사르탄 160밀리그램 단독요법 또는 5/160밀리그램으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 환자에 투여합니다.

발사르탄과 암로디핀을 병용으로 복용하고 있는 환자인 경우, 복용의 편리함을 위하여 이 약(개개의 주성분 함량이 동일한 복합제)으로 전환할 수 있습니다.

- 신장에 환자 : 경증 및 중증도의 신장에 환자(creatinine clearance 10mL/min 이상)인 경우 용량조정이 필요치 않으나, 중증의 신장에 환자(creatinine clearance 10mL/min 미만) 및 투석환자는 이 약을 투여하지 않습니다. 중증도 신장에 환자인 경우, 칼륨 수치 및 크레아티닌에 대한 모니터링이 권장됩니다.
- 간장에 환자 : 경도 및 중증도 간장에 환자의 경우 발사르탄 1일 투여량은 80mg을 초과해서는 안 됩니다. 중증의 간장애, 담즙성 간경변, 담도 폐쇄 · 담즙 분비장애 환자에게 이 약을 투여하지 않습니다.
- 65세 이상의 고령자 : 용량 증감시 주의해야 합니다.
- 소아 : 만 18세 미만의 소아환자에 대한 안전성 · 유효성이 확립되어 있지 않아 이 약의 투여가 권장되지 않습니다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

임신 2, 3기인 임부에 레닌-안지오텐신 체계에 직접 작용하는 약물 투여시, 태아 및 신생아에게 손상 및 사망까지 유발할 수 있습니다. 따라서 만일 임신으로 확인될 경우 즉시 이 약의 투여를 중단해야 합니다. (7, 임부 및 수유부에 대한 투여 항 참조)

2. 다음 환자에게는 투여하지 마십시오.

- 이 약의 주성분 및 디하이드로피리딘계 유도체에 과민증이 있는 환자
- 임부
- 중증의 신장에환자(creatinine clearance 10mL/min 미만)(사용경험이 없음)
- 중증의 간장애, 담즙성 간경변, 담도폐쇄 · 담즙분비장애 환자
- 당뇨병이나 중증도~중증도의 신장애 환자(사구체여과율 < 60mL/min/1.73m²)에서 알리스키렌 함유제와의 병용

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 나트륨 및/또는 체액 부족 환자
위약 비교 임상시험에서 이 약을 투여 받은 단순 고혈압 환자 중 0.4%에서 과도한 저혈압이 관찰되었습니다. 안지오텐신 수용체 길항제 (ARB) 길항제를 복용하고 있는 레닌-안지오텐신 체계가 활성화된 환자(예, 고혈압의 이노제를 복용하고 있는 체액 및/또는 나트륨 부족 환자)에서, 중추성 저혈압이 발생할 수 있습니다. 이 약 투여 전 이러한 상태를 보장하거나 투여 시작 시 면밀한 의학적 관찰을 권장합니다. 이 약 복용 시 저혈압이 발생하면, 환자를 빈도이 높고 필요하면 생리식염수를 정맥 주사로 점적 주입합니다. 혈압이 안정된 후에 치료를 계속할 수 있습니다.
- 고칼륨혈증 환자
이 약과 칼륨보조제, 칼륨보존이노제, 칼륨을 함유한 식염 대용물 또는 칼륨 수치를 상승시킬 수 있는 다른 약물(예, 헤파린)과 병용 시에는 주의하여야 하며, 빈번히 칼륨 수치를 모니터링 해야 합니다.
- 신동맥협착 환자
이 약은 발사르탄에 의해 양측성 또는 편측성 신동맥 협착증이 있는 환자 또는 협착증이 일어난 단신증 환자에서 혈중 요소 및 혈청 크레아티닌(creatinine)을 증가시킬 수 있으므로 안전성 면에서 모니터링이 권장됩니다.
- 신장이상환자
최근 신장기능을 받은 환자에서 이 약의 안전한 사용을 입증할 수 있는 자료가 없습니다.
- 혈관부종
발사르탄을 투여받은 환자에서 기도폐쇄 및/또는 얼굴, 입술 및 혀의 부기를 일으키는 혈관부종(후두와 성문의 부기 포함)이 보고되었습니다. 이러한 환자 중 일부는 ACE저해제와 같은 다른 약물 투여로 인해 혈관부종이 유발된 경향이 있었습니다. 이 약 투여시 혈관부종이 나타나면 투여를 즉시 중단하여야 하며, 재투여해서는 안됩니다.
- 심부전 또는 심근경색 후 환자
임상적으로 암로디핀과 같은 칼슘채널 길항제를 중증의 울혈성 심부전환자(NYHA 분류 III 또는 IV 단계)에게 사용시 주의가 필요합니다. NYHA 분류 III 또는 IV 단계의 비허혈성 환인의 심부전 환자를 대상으로 한 위약-대조 시험(PRIASE-2)에서, 암로디핀은 위약에 비해 심부전의 약화를 명확히 감소시키는데 불구하고 폐부종의 증가와 관련이 있는 것으로 보고되었습니다. 신기능이 레닌-안지오텐신-알도스테론(renin-angiotensin-aldosterone) 체계의 활성에 의존하는 환자(예, 중증의 심부전)에게 안지오텐신-전환효소 저해제(ACE 저해제) 또는 안지오텐신 수용체 길항제의 투여는 소변감소증 및/또는 진행성 고질소혈증 및 (드물게) 급성 심부전 및 또는 사망과 관련이 있습니다. 심부전 또는 심근경색 발생 후 환자에 대한 평가에는 신기능 평가를 항상 포함해야 합니다.
- 급성심근경색환자
칼슘채널차단제(예, 암로디핀)의 투여를 시작하거나 용량을 증감할 환자(특히, 중증의 폐쇄성 관상동맥질환자)에서 협심증 또는 급성심근경색의 발현빈도, 유발기간 또는 중증도의 증가가 드물게 보고되었습니다.
- 대동맥판막 및 승모판역혈착증, 폐쇄성 비대실장근육병증 환자
다른 모든 혈관이상제와 마찬가지로, 대동맥 또는 승모판 막폐쇄증 또는 폐쇄성 비대실장근육병증 환자에서 암로디핀 투여시 특별한 주의가 필요합니다.
- 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)의 이중차단 :
발사르탄을 포함한 안지오텐신 수용체 차단제(ARB), ACE 저해제 또는 알리스키렌 등 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)에 영향을 미치는 다른 약제와의 병용은 권장되지 않습니다.

4. 이상반응

- 이 약에 대한 안전성은 5,175명의 환자가 참여하고 그 중 2,613명이 암로디핀과 발사르탄을 병용 투여 받은 5개의 대조임상시험으로부터 평가되었습니다.
이상반응은 발현빈도에 따라, 매우 흔하게(≥ 1/10), 흔하게(≥ 1/100, < 1/10), 흔하지 않게(≥ 1/1,000, < 1/100), 드물게(≥ 1/10,000, < 1/1,000), 단독보고를 포함하여 매우 드물게(< 1/10,000) 로 정리하였습니다. 같은 빈도 그룹에서는 이상반응의 중대함(Seriousness)이 감소하는 순서로 정리되었습니다.

〈표〉 발현된 이상반응

발현부위	발현빈도	발현증상	발현부위	발현빈도	발현증상
감염 (infections and infestations)	흔하게	비인두염, 인플루엔자	호흡기계, 흉부 및 종격동 이상	흔하지 않게	기침, 인두 및 후두 통증
면역계 이상	드물게	과민증	위장관 이상	흔하지 않게	설사, 구역, 복통, 변비, 구갈
눈의 이상	드물게	시각장애	피부 및 피하조직 이상	흔하지 않게	발진(rash), 홍반
청신계 이상	드물게	불안	드물게	드물게	다한증, 발진(exanthema), 가려움
신경계 이상	흔하게	두통	근골격계 및 결합조직 이상	흔하지 않게	관절부종, 요통, 관절염
	흔하지 않게	어지러움(dizziness), 졸음, 체위성 어지러움, 감각이상	결합조직 이상	드물게	근육연축, 무기력
귀 및 미로 이상	흔하지 않게	현기증(vertigo)	신장 및 방광이상	드물게	빈뇨증, 다뇨증
	드물게	귀울림	생식계 및 유방이상	드물게	발기부전
심장이상	흔하지 않게	빈맥, 가슴 두근거림	전신 이상 및 투여부위 반응	흔하게	부종, 혈요부종, 얼굴부종, 말초부종, 피곤, 홍조, 무력증, 안면홍조
	드물게	실신			
혈관이상	흔하지 않게	가림성 저혈압			
	드물게	저혈압			

2) 병용에 대한 추가정보

이중 맹검, 약물 또는 위약 대조 임상시험에서, 암로디핀 단독투여군(9%)에 비해 병용 투여군(5.8%)에서 말초 부종의 발생빈도가 통계적으로 낮게 나타났습니다.

3) 각 유효성분에 대한 추가 정보

바록 이 약을 투여한 임상시험 및 시판후 경험에서 관찰되지 않았더라도, 이전에 각각의 성분에 대하여 보고된 이상반응이 나타날 수 있습니다.

① 발사르탄
〈표2〉 발사르탄 단독투여시 발생한 이상작용반응

발현부위	발현빈도	발현증상	발현부위	발현빈도	발현증상
혈액 및 림프계	알려지지 않음	헤모글로빈 감소	혈관	알려지지 않음	혈관염
		헤마토크릿 감소	간 및 담도	알려지지 않음	간기능 수치(혈청 빌리루빈 포함) 상승
		호중구 감소	피부 및 피하조직	알려지지 않음	혈관부종
면역계	알려지지 않음	혈청병용 포화한 과민성	근골격계 및 연결조직	알려지지 않음	근육통
대사 및 영양	알려지지 않음	혈청 칼륨 증가	신장 및 비뇨기계	알려지지 않음	신부전 및 신손상
					혈청 크레아티닌 상승

약물과의 인과관계와 상관없이 임상시험 동안에 다음과 같은 증상이 보고되었습니다 : 불면, 식욕감퇴, 인두염, 비염, 부비동염, 상기도감염, 바이러스 감염

② 알로디핀

약물과의 인과관계와 상관없이 알로디핀 임상시험에서 보고된 이상반응은 〈표3〉과 같습니다.

〈표3〉 알로디핀 단독투여시 발생한 이상반응

발현부위	발현빈도	발현증상	발현부위	발현빈도	발현증상
눈의 이상	흔하지 않음	복시	간담도계이상	매우 드물게	간염, 황달
혈액 및 림프계 이상	매우 드물게	혈소판감소증, 백혈구 감소증	피부 및 피하조직 이상	흔하지 않음	탈모증, 자색반증, 피부 탈색, 광과민반응
면역계 이상	매우 드물게	알려지지 반응		매우 드물게	혈관부종, 두드러기, 다형홍반, 스티븐 존슨 증후군
대사 및 영양 이상	매우 드물게	고혈당			
정신계 이상	흔하지 않음	불면증, 감정변화	근골격 및 연조직 이상	흔하지 않음	근육통
신경계 이상	흔하지 않음	떨림, 감각저하, 미각이상	신장 및 방광 이상	흔하지 않음	배뇨장애, 아노증
	매우 드물게	말초 신경병, 과다근육긴장증	생식기 및 유행 이상	흔하지 않음	여성유방종
심장 이상	매우 드물게	부정맥, 서맥, 심방세동, 심실성 빈맥, 심근경색	전신 이상 및 투여부위	흔하지 않음	통증, 권태감, 가슴통증
혈관 이상	매우 드물게	혈관염	검사	흔하지 않음	체중감소, 체중 증가
호흡기, 흉부 및 종격기상	흔하지 않음	호흡곤란, 비염		매우 드물게	간호소 증가 (대부분 감금정제와 관련)
위장관 이상	흔하지 않음	구토, 소화불량			
	매우 드물게	해장염, 위염, 잇몸종식			

5. 일반적 주의

1) 운전 및 기계조작시 주의

운전 및 기계 사용에 미치는 영향에 대한 임상시험은 수행되지 않았습니다. 운전 및 기계 사용시 간헐적으로 어지러움 및 피로가 나타날 수 있음을 고려해야 합니다. 다른 항고혈압제와 마찬가지로 운전이나 기계류를 조작할 때는 특별한 주의 합니다.

6. 상호작용

1) 발사르탄

① 안지오텐신 수용체 차단제, ACE 저해제 또는 알리스키렌의 병용투여에 의한 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)의 이중차단에 이러한 약물의 단독요법과 비교시 저혈압, 실신, 고칼륨혈증 및 신기능의 변화(급성 신부전 포함) 위험을 증가시키는 것과 관련이 있습니다. 이 약과 RAAS에 작용하는 다른 약물을 병용투여하는 환자의 경우, 혈압, 신기능 및 전해질을 면밀히 모니터링해야 합니다. 당뇨병이나 중등증~중증의 신장에 환자(사구체여과율 < 60 mL/min/1.73m²)에게 이 약과 알리스키렌 함유제제를 병용투여하지 않습니다.

② 칼륨 : 칼륨 보조제, 칼륨보존 이뇨제, 칼륨을 함유한 식염수용 물 또는 칼륨 수치를 상승시킬 수 있는 다른 약물(예, 헤파린)과 병용 시에는 주의하여야 하며, 빈번히 칼륨 수치를 모니터링 해야 합니다.

③ 비스테로이드성 소염제(NSAIDs) : 안지오텐신 II 수용체 길항제가 NSAIDs(예, 항염증요법으로 아스피린, COX-2 저해제)와 동시에 투여되었을 때 항고혈압 효과와 감소할 수 있습니다. 특히, 노인환자, 혈액이 부족한 환자(이뇨제 투여환자 포함), 또는 신장기능이 저하되어 있는 환자의 경우 신장기능 약화의 위험성을 증가시킬 수 있습니다. 그러므로 NSAIDs를 투여하고 있는 환자에게 발사르탄 투여를 시작하거나 투여 방법을 변경할 때에는 신장기능의 모니터링이 권장됩니다.

④ 전달체(transporters) : 사람의 간 조직을 가지고 한 in vitro 연구 결과에서 발사르탄이 간 흡수 전달체 OATP1B1과 간 유출 전달체 MRP2의 기질임을 보여 주었습니다. 흡수 전달체 저해제(리파라신, 싸이클로스포린) 또는 유출 전달체 억제제(리토나비어)와의 병용투여는 발사르탄의 전신 노출을 증가시킬 수 있습니다.

⑤ 발사르탄 단독투여 시, 다음의 약물과 임상적으로 유의한 약물 상호작용이 관찰되지 않았습니다. : 시메티딘, 와파린, 푸로세미드, 다곡산, 아데닐산, 아미에라신, 히드록시메틸글루타미드, 알로디핀, 글리벡클로리드와 의 상호작용에 대한 임상시험이 있었습니다.

2) 알로디핀

① 심바스타틴 : 알로디핀 10mg과 심바스타틴 80mg의 다화용량 병용투여는 심바스타틴 단독투여시와 비교하여 심바스타틴의 노출을 77% 정도 증가시켰습니다. 알로디핀을 투여받는 환자에서 심바스타틴의 1일 최대 투여용량은 20mg입니다.

② CYP3A4 저해제 : 고정제에서 알로디핀 5mg과 딜티아젯 1일 180mg을 복합투여한 경우에 알로디핀의 전신노출이 57%까지 증가하였으나, 강력한 CYP3A4 저해제(예, 케토코나졸, 이트라코나졸, 리토나비어)의 경우 알로디핀의 혈중 농도를 딜티아젯 보다 더 많이 증가시킬 수 있으므로 알로디핀은 CYP3A4저해제와 병용투여시 주의하여 투여합니다.

③ CYP3A4 유도제 : 알로디핀에 대한 CYP3A4 유도제(예, 리람파신, 세틴트 존스 워트)의 영향에 대한 정보는 없으나 병용투여시 알로디핀의 혈중농도가 감소할 수 있으므로 병용투여시 주의합니다.

④ 기타 : 알로디핀 단독투여시, 타이디드제 이뇨제, 알파-차단제, 베타-차단제, 안지오텐신 전환 효소 저해제 (Angiotensin converting enzyme inhibitor), 작용시간이 긴 질산염제, 니트로글리세린 설하정, 디곡산, 와파린, 아트로바스타틴, 실레나닐, 알루미늄/마그네슘(제산제), 시메티딘, 비스테로이드성 소염제, 항생제, 경구 혈당강하제, 에탄올(알코올), 사이클로스포린과 병용시 안전하였습니다.

⑤ 지용주스 : 20명의 건강한 지원자에서 240mL의 자몽주스와 알로디핀 10mg의 단회 경구투여시 알로디핀의 약동학에 유의적인 영향이 없었습니다.

7. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 안지오텐신 II 길항제의 작용시기 때문에 태아에 대한 위험을 배제 할 수 없습니다. 안지오텐신 전환효소 저해제(레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)에 작용하는 특수한 약물군)를 임신 2기 및 3기에 복용한 임부에게서 발달중인 태자에 대한 손상과 사망이 보고된 바 있습니다. 그리고 임신 1기에 ACE 저해제의 사용은 태아 기형의 잠재적 위험성과 관련이 있습니다. 발사르탄을 우발적으로 복용한 임부에서 자연유산, 양수 과소증, 산생이 신기능이상인 보고된 바 있습니다. RAAS에 직접 작용하는 다른 약물과 같이, 이 약도 임신 중 또는 임신을 할 계획이 있는 경우에도 사용해서는 안 됩니다. 의사는 임신할 가능성이 있는 여성에게 RAAS에 작용하는 약물을 처방할 때 임신 중 이러한 약물의 잠재적 위험성에 대해 설명해주어야 합니다. 이 약 치료 중 임신이 확인되면, 가능한 빨리 이 약을 중단해야 합니다.

2) 사람에게 발사르탄 및/또는 알로디핀의 유증 분비 여부는 알려지지 않았으나, 쥐에서는 발사르탄이 유즙으로 분비되었습니다. 따라서 수유중인 여성이 이 약을 사용하는 것은 권장하지 않습니다.

3) 이 약 및 각각의 단일제에서 생식능에 대한 임상연구는 없었습니다. 이 약에 대한 생식능에 대한 비임상자료는 없지만, 발사르탄 및 알로디핀 각각의 성분으로 실시한 비임상시험에서 생식능에 대한 영향을 나타내지 않았습니다.

8. 소아에 대한 투여

이 약은 만18세 미만 환자에서의 안전성 및 유효성에 대한 자료가 충분치 않으므로, 투여를 권장하지 않습니다.

9. 고령자에 대한 투여

성인 및 고령자에서 유사한 용량을 사용하였을 때 이 약의 두 성분에 대하여 모두 우수한 내약성을 나타냈으므로 정상 용량을 권장합니다.

10. 임상검사치의 영향

1) 발사르탄/알로디핀을 투여 받은 고혈압 환자 중 검사수치가 기저치에서 명백하게 변한 환자는 매우 적었습니다. 알로디핀/발사르탄 병용군(5.5%)이 발사르탄 단독투여군(5.5%)에서는 위약투여군(4.5%) 보다 높은 혈중요소질소(BUN)를 나타냈습니다.

2) 발사르탄 투여시 때때로 간기능 검사치의 상승이 보고되었으나 이 약을 투여하는 본대상 고혈압 환자에 대해 특별한 임상검사치의 모니터링이 필요한 정도는 아닙니다.

11. 과량투여시의 처리

이 약을 과량 복용한 경험은 없습니다. 발사르탄 과량 투여 시 주요한 증상으로 어지러움을 동반한 저혈압이 나타날 수 있습니다. 알로디핀 과량 투여 시에는 말초혈관을 과도하게 확장시켜 반사성맥압을 일으킬 수 있습니다. 전신성 저혈압이 지속되어 사망에 이르는 쇼크까지도 일어날 사례가 보고된 바 있습니다.

이 약 과량투여로 인한 임상적으로 유의한 저혈압이 나타나면, 심기능 및 호흡 기능을 자주 모니터링하고, 시지를 높게 유지하며 체액의 순환 체액량 및 노 배출량을 유심히 관찰하는 등 능동적으로 심혈관 요법을 행해야 합니다. 혈관수축제 사용이 급기야 아니라면 혈관긴장도 및 혈압을 회복시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 정맥 글루콘산 칼슘은 칼슘 채널 차단을 회복시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 발사르탄과 알로디핀은 모두 혈액투석으로 제거되지는 않습니다. 이 약의 과량복용 직후에는 구토를 유도하거나 위세척을 하는 것을 고려할 수 있습니다. 건강한 지원자에서 알로디핀 복용 후 흡수~2시간 시점에서 활성단을 투여했을 때, 알로디핀 흡수를 유의적으로 감소시켰습니다.

12. 기타

랫트에서 실시한 배태자 독성 시험과 랫트와 마모셋에서 13주간 시험한 동물시험에서, 사람에서 의미 있을 것으로 생각되는 독성학적인 발견은 없었습니다. 13주간 랫트에서 경구투여한 결과, 알로디핀/발사르탄을 3/48mg/kg/day 이상 투여한 수컷에서 선취 염증이 관찰되었으나, 임컷 랫트에서는 관찰되지 않았습니다. 마모셋에서는 어떠한 증상에서도 이러한 결과와 관찰되지 않았으나, 고용량 투여 시 대장염이 관찰되었습니다(5/80mg/kg/day 이하에서는 어떠한 영향도 관찰된 바 없습니다.). 임상시험에서 이 약 투여 시 관찰된 위장관계 이상반응 발현빈도는 단독투여 시 관찰된 이상반응 발현빈도와 유사하였습니다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 28정

제조업체 : ㈜메디카코리아 경기도 화성시 향남읍 제곡공단4길 96

제 조 자 : 한국콜마(주) 세종특별자치시 진의면 산단길 245

저희 메디카코리아 제품은 KGMP에 적합하게 철저한 품질관리를 통해서 제조됩니다. 혹시 사용기간이 경과되었거나, 유통과정 중 변질·훼손된 제품은 구입 경로를 통하여 교환해 드립니다.

※ 식품의약품안전처 이의제적(<http://eazdrug.mfds.go.kr>) 의약품등 정보를 방문하시며 첨부문서 작성(개정일) 이후의 최신 제품정보를 확인하실 수 있습니다. 제품문의 및 상담은 본사 마케팅부(070-4018-8122) 또는 개발부 (070-4018-8013~5)로 문의바랍니다.

작성일자 : 2013. 08. 08
MK13080801