

Extorte Tab 5/80mg 5/160mg 10/160mg

비해 심부전의 역을 명확히 감소시키면서도 불구하고 폐부종의 증가와 관련이 있는 것으로 보고되었다.

신기능이 레닌-안지오텐신-알도스테론(renin-angiotensin-aldosterone) 체계의 활성에 의존하는 환자(예: 중증의 심부전)에게 안지오텐신-전환효소 저해제(ACE 저해제)는 안지오텐신 수용체 길항제의 무효에 소변감소증 및/또는 진행성 고칼슘혈증 등 (드물게) 급성 심부전 또는 사망과 관련이 있다. 심부전 또는 급진적

가) 급성심근경색현상
칼슘세포내지나(예, 암로디핀)의 투여를 시작하거나 용량을 증량한 환자(특히, 중증의 폐색성 관상동맥질환자)에서 협심증 또는 급성심근경색의 발현빈도, 유효기간 또는 중증도의 증가가 드물게 보고되었다.

다른 모든 혈관질환제와 마찬가지로, 대동맥 또는 심방으로 막혀있을
또는 폐쇄성 비대신성관맥병 환자에서 일로다핀 투여시 특별한
주의가 필요하다.

9) 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)의 이중차단 :
발사르탄을 포함한 안지오텐신 수용체 차단제(ACE), ACE 저해제
또는 안지오텐신 제 2 레닌-안지오텐신 수용체-알도스테론계(RAAS)에

영향을 미치는 다른 약제와의 반응은 관찰되지 않는다.

이상반응

1) 약에 대한 안전성은 5,175명의 환자가 참여하고 그 중 2,613명이 알로디핀과 발사르탄을 병용 투여 받은 5개의 대조임상시험으로 부터 평가되었다.

이상반응을 발현빈도에 따라, 매우 흔하게($\geq 1/10$), 흔하게($\geq 1/100$,

<1/10, 흔하지 않게> 1/1,000, <1/100, 드물게> 1/10,000,
<1/1,000, 단골로>를 포함하여 겨우 드물게(<1/10,000)로
정리하였다. 같은 빈도 그룹에서는 이상반응의 중대함(Seriousness)
이 감소하는 순서로 정리되었다.

〈표〉 발현된 이상반응

발전바위	발전반도	발전중상
감염 (infections and infestations)	흔하게	바인드류, 인공루엔자
면역계 이상	드물게	과민증
눈의 이상	드물게	시각장애

정신계 이상	드물게	불안
신경계 이상	흔하게	두통
	흔하지 않게	머지러움(dizziness), 졸음, 체위성 머지러움, 감각이상

귀 및 미로 이상	흔하지 않게	현기증(vertigo)
	드물게	귀울림
심장이상	흔하지 않게	반박, 가슴 두근거림
	드물게	실신

혈관이상	흔하지 않게	기립성 저혈압
	드물게	저혈압
호흡기계, 흉부 및 종격동 이상	흔하지 않음	기침, 인두 및 후두 통증

위장장애 이상	흔하지 않게	설사, 구역, 복통, 변비, 구갈
피부 및 피하조직 이상	흔하지 않게	발진(rash), 홍반
	드물게	다한증, 발진(exanthema), 가려움
근골격계 및 관절 이상	흔하지 않게	관절부종, 근육, 관절염

간헐적 단식	드물게	근육연축, 무기력
결함조직 이상	드물게	빈뇨증, 다뇨증
신장 및 방광이상	드물게	발기부전
생식계 및 유방이상	드물게	
저시 이상 및	흔하게	빈뇨, 항요빈뇨, 연교빈뇨

투여부위 반응	알초부종, 피곤, 졸조, 두력증, 안면부조
---------	-------------------------

2) 병용에 대한 추가정보
 이중 맹검, 약물 또는 위약 대조 임상시험에서, 알로피딘 단독투여군 (9%)에 비해 병용 투여군(5.8%)에서 알초 부종의 발생빈도가 통계적

오른 밑게 나타났다.

3) 각 유효성분에 대한 추가 정보
 비록 이 악을 부여한 임상시험 및 사전후경험에서 관찰되지 않았더라
 도, 이진에 각각의 성분에 대하여 보고된 이상반응이 나타날 수 있다.

① 발사르탄

〈표〉 발사르탄 단독투여시 발생하 이신악물반응

발현부위	발현빈도	발현증상
혈액 및 림프계	알려지지 않음	헤모글로빈 감소, 헤마토크릿 감소 호중구 감소, 혈소판 감소
면역계	알려지지 않음	혈청병을 포함한 과민성

[illegible]

이제야 필요합니까? 라고 되물어 보자면, 이는 사실인만큼 필요할 수 있다. 전신성 저혈압이 지속되어 사망에 이르는 소위까지도 알려진 사례가 보고된 바 있다.

이 약 개량투여로 인한 임상적으로 유익한 효과까지 나타나면, 심기능 및 호흡 기능을 자주 모니터링하고 시지해 놓게 유지하며 체액의 순환 체역량 및 호흡 효율을 유심히 관찰하는 등 병동등으로 심혈관 요법을 체계적으로 하고, 환자를 위한 교육, 간호, 영양, 그리고 심전도 및 심음

영어가 아니다. 일본으로부터 시골 마을에 참가가 되었다면 일본으로부터 한 걸음 떨어진 도시에는 데 도움이 될 수 있다. 장악 불문산 산악은 헬스 체력 지원을 회복시키는 데 도움이 될 수 있다. 발사터판과 일로디핀은 모두 혈액 순환으로 제거되는 않는다. 이 약의 과량 복용 직후에는 구토를 유도하거나 위내치를 하는 것을 고려할 수 있다. 긴장한 지면자에서 일로디핀 복용 후 추사-2시간 시점에서 활성탄을 투여했을 때, 일로디핀 흡수율 0%이었던 것으로 나타났다.

12. 기리
랫에서 실시한 해태자 독성 시험과 랫트와 마모셋에서 13주간 시험한 동물시험에서, 사람에서 의미있을 것으로 생각되는 독성학적인 발견은 없었다.
13. 기리 랫트에서 경구투여한 결, 알로다핀/발사르탄을 3/48mg/kg (인간에서 투여할 수 있는 최대의 결의 역치에 해당한다), 인산 리트레네

가/day 이하에 있는 것으로 나타났으며, 평균치는 0.04g/kg/day 이하로 나타났다. 미토콘드리아는 어떠한 용량에서도 이러한 결과가 관찰되지 않았으며, 고용량 투여 시 대장암에 관찰되었다(5/80mg/kg/day 이하에서는 어떠한 영향도 관찰된 바 없다). 임상시험에서 이 약 투여 시 간질원 위장관계 이상반응을 발현빈도는 단독투여 시 관찰된 이상반응 발현빈도와 유사하였다.

포장단위 자시포장단위
저장방법 및 사용기간 기밀공기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월
 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

본 제품에 대하여 자세한 정보를 원하시는 분은 소비자상담실 (☎031-377-7909)로 문의하시기 바랍니다.


한국휴텍스제약(주) 우송약국을소재한기업
 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 99 **KGMP** 보건산업진흥법
 제2조의4자: 한국휴텍스제약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 99