

# 유나잘탄® 정

5mg/160mg  
5mg/80mg



UNASARTAN Tabs.

(Amlodipine Besylate / Valsartan)

## 【원료약품 및 그 분량】1정 중

|             |                                            |        |
|-------------|--------------------------------------------|--------|
| 5mg/160mg : | 발사르탄(USP)                                  | 160mg  |
|             | 알로디핀베실산염(KP)                               | 6.94mg |
|             | (알로디핀으로서 5mg)                              |        |
|             | 참가제(등불유래성분) : 스테아르산마그네슘(기원동물:소·양, 사용부위:지방) |        |
| 5mg/80mg :  | 발사르탄(USP)                                  | 80mg   |
|             | 알로디핀베실산염(KP)                               | 6.94mg |
|             | (알로디핀으로서 5mg)                              |        |
|             | 참가제(등불유래성분) : 스테아르산마그네슘(기원동물:소·양, 사용부위:지방) |        |

【성 상】 5mg/160mg : 어두운 노란색의 정방형 필름코팅정  
5mg/80mg : 어두운 노란색의 원형 필름코팅정

## 【효능·효과】

알로디핀 또는 발사르탄 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 본태성 고혈압

## 【용법·용량】

이 약의 권장용량은 1일 1회 1정으로, 식사와 관계없이 물과 함께 복용한다. 기능하면 매일 같은 시간(예 : 아침)에 복용할 것이 권장된다.  
이 약을 투여하기 전에 개개의 성분(알로디핀 또는 발사르탄)으로 용량을 조절할 것이 권장되나, 다음과 같이 개개의 성분에 대한 단독요법으로 혈압이 조절되지 않는 경우 이 약으로 바로 전환하는 것을 고려할 수 있다.

- 5/80밀리그램 : 알로디핀 6밀리그램 또는 발사르탄 80밀리그램 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 환자에 투여한다.
- 5/160밀리그램 : 알로디핀 5밀리그램 또는 발사르탄 160밀리그램 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 환자에 투여한다.
- 10/160밀리그램 : 알로디핀 10밀리그램 또는 발사르탄 160밀리그램 단독요법 또는 5/160밀리그램으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 환자에 투여한다.

발사르탄과 칼륨트리아실산염 병용으로 복용하고 있는 환자인 경우, 복용의 편리함을 위하여 이 약(개개의 주성분 함량 이 동일한 복합제)으로 전환할 수 있다.

- 신장애 환자 : creatinine clearance 10mL/min 이하인 경우 용량조절이 필요치 않으나, 중증의 신장애 환자(creatinine clearance 10mL/min 미만) 및 무투박환자는 이 약을 투여하지 않는다. 중증도 신장애 환자인 경우, 칼륨 수치 및 크레아티닌에 대한 모니터링이 권장된다.
- 간장애 환자 : 간도 이 중증도 간장애 환자에 투여하는 경우 발사르탄 1정 투여량은 80mg을 초과해서는 안 된다. 중증의 간장애, 담즙성 간염, 담도폐쇄, 담즙 농비정지 환자에게 이 약을 투여하지 않는다.
- 6세 이상의 고령자 : 용량 증감이 주의해야 한다.
- 소아 : 만 18세 미만의 소아환자에 대한 안전성·유효성이 확립되어 있지 않아 이 약의 투여가 권장되지 않는다.

## 【사용상의 주의사항】

1. 임신 2, 3분기 임부에 레닌-안지오텐신 체계에 직접 작용하는 약을 투여시, 태아 및 신생아에게 손상 및 사망까지 유발할 수 있다. 따라서 단일 임신으로 확인된 경우 즉시 이 약의 투여를 중단해야 한다. (7. 임부 및 수유부에 대한 투여 항 참조)

- 다음 환자에게는 투여하지 말 것
  - 이 약의 주성분 및 디하이드로피리딘계 유도체에 과민증이 있는 환자
  - 임부
  - 중증의 신장애환자(creatinine clearance 10mL/min 미만)(사용경험이 없음)
  - 중증의 간장애, 담즙성 간염병, 담도폐쇄, 담즙농비정지 환자
  - 당뇨병이나 중증도~중증의 신장애 환자(시구제와 아울러 <60mL/min/1.73m<sup>2</sup>>에서 알리스키렌 함유제제와 병용)

- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
  - 위 배통 및/또는 체액 부족 환자
  - 이뇨제 및 인성기질에서 이 약을 투여 받은 단순 고혈압 환자 중 0.4%에서 과도한 저혈압이 관찰되었다. 안지오텐신 수용체 길항제 (ARB 길항제)를 복용하고 있는 레닌-안지오텐신 체계가 활성화된 환자(예 : 고혈압의 이노제를 복용하고 있는 경우 및/또는 나트륨 부종 환자)에서, 중추성 저혈압이 발생할 수 있다. 이 약 투여 전 이러한 상태는 보정하거나 투여 시작 시 면밀한 의학적 관찰을 권장한다. 이 약 복용 시 저혈압이 발생하면, 환자를 반드시 눕히고 필요한 생리식염수를 정맥 주사로 점적 주입한다. 혈압이 안정된 후에 치료를 계속할 수 있다.
  - 고알부민증 환자
    - 이 약과 알부민보조제, 칼륨보조이노제, 칼륨을 함유한 식염 대용을 드는 칼륨 수치를 상승시킬 수 있는 다른 약물(예, 해파린)과 병용 시에는 주의하여야 하며, 빈번히 칼륨 수치를 모니터링 해야 한다.
  - 신동맥혈척 환자
    - 이 약은 발사르탄에 의해 압축성 또는 편축성 신동맥 협착증이 있는 환자 또는 협착증이 알려진 단신축 환자에서 혈중 소아 및 혈청 크레아티닌(creatinine)을 증가시킬 수 있으므로 안전성 면에서 모니터링이 권장된다.

## 4) 신장악시환자

최근 신장악시를 받은 환자에서 이 약의 안전한 사용을 입증할 수 있는 자료가 없다.

## 5) 혈관부종

발사르탄을 투여받은 환자에서 기도폐쇄 및/또는 얼굴, 입술 및 혀의 부기를 일으키는 혈관부종(후두와 성문의 부기 포함)이 보고되었다. 이러한 환자 중 일부는 ACE저해제와 같은 다른 약물 투여로 인해 혈관부종이 유발된 경향이 있었다. 이 약 투여시 혈관부종이 나타나면 투여를 즉시 중단하여야 하며, 재투여해서는 안된다.

## 6) 심부전 또는 심근경색 후 환자

일반적으로 알로디핀과 같은 칼슘채널 길항제를 중증의 울혈성 심부전환자(NYHA 분류 III 또는 IV 단계)에게 사용시 주의가 필요하다. NYHA 분류 II 또는 IV 단계의 비허혈성 불안정 심부전 환자를 대상으로 한 위약 대조 시험(PROMISE-2)에서, 알로디핀은 위약에 비해 심부전의 악화를 명확히 감소시키지도 불구하고 폐부종의 증가와 관련이 있는 것으로 보고되었다.

신기반이 레닌-안지오텐신-알도스테론(renin-angiotensin-aldosterone) 체계의 활성에 의중하는 환자(예, 중증의 심부전)에게 안지오텐신-전환효소 저해제(ACE 저해제)또는 안지오텐신 수용체 길항제의 투여는 소변감소 증 및/또는 전정성 고혈압현상 및 (드물게) 급성 심부전 및/또는 사망과 관련이 있다. 심부전 또는 심근경색 발생 후 환자에 대한 평가에는 신기반 평가를 항상 포함해야 한다.

## 7) 급성심근경색환자

칼슘채널차단제(예,알로디핀)의 투여를 시작하거나 용량을 증량한 환자(특히, 중증의 폐쇄성 관상동맥질환자)에서 협심증 또는 급성심근경색의 발현빈도, 유효기간 또는 중증도의 증가가 드물게 보고 되었다.

8) 대동맥판막 및 승모판막협착증, 폐쇄성 비대성심근육병증 환자  
다른 모든 혈관질환자와 마찬가지로, 대동맥 또는 승모판 막폐쇄증 또는 폐쇄성 비대성심근육병증 환자에서 알로디핀 투여시 특별한 주의가 필요하다.

9) 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)의 이중차단 :

발사르탄을 포함한 안지오텐신 수용체 차단제(ARB), ACE 저해제 또는 알리스키렌 등 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)에 영향을 미치는 다른 약제와의 병용은 권장되지 않는다.

## 4. 이상반응

- 이 약에 대한 안전성은 5,175명의 환자가 참여하고 그 중 2,613명이 알로디핀과 발사르탄을 병용 투여 받은 5개의 대규모임상시험으로부터 평가되었다.  
이상반응은 발현빈도에 따라, 매우 흔하게(≥ 1/10), 흔하게(≥ 1/100, <1/10), 흔하지 않게(≥ 1/1,000, <1/100), 드물게(≥ 1/10,000, <1/1,000), 단독보고를 포함하여 매우 드물게(<1/10,000)로 정리하였다. 같은 빈도 그룹에서는 이상반응의 중대함(Seriousness)이 감소하는 순서로 정리되었다.  
(표1) 발현된 이상반응

| 발현부위                            | 발현빈도   | 발현증상                                    |
|---------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| 감염(intections and infestations) | 흔하게    | 비인두염, 인두부종                              |
| 면역계 이상                          | 드물게    | 과민증                                     |
| 눈의 이상                           | 드물게    | 시각장애                                    |
| 정신계 이상                          | 드물게    | 불안                                      |
| 신경계 이상                          | 흔하게    | 두통                                      |
|                                 | 흔하지 않게 | 어지러움(dizziness), 졸음, 체위성 어지러움, 감각이상     |
| 귀 및 미로 이상                       | 흔하지 않게 | 현기증(vertigo)                            |
|                                 | 드물게    | 귀울림                                     |
| 심장이상                            | 흔하지 않게 | 빈맥, 심부 두근거림                             |
|                                 | 드물게    | 심신                                      |
| 혈관이상                            | 흔하지 않게 | 기립성 저혈압                                 |
|                                 | 흔하게    | 저혈압                                     |
| 호흡기계, 흉부 및 종격막 이상               | 흔하지 않게 | 기침, 인두 및 후두 부종                          |
| 위장관 이상                          | 흔하지 않게 | 설사, 구역, 복통, 변비, 구갈                      |
| 피부 및 피하조직 이상                    | 흔하지 않게 | 발진(rash), 홍반                            |
|                                 | 드물게    | 다형성 발진(exanthema), 가려움                  |
| 근골격계 및 결합조직 이상                  | 흔하지 않게 | 관상골통, 요통, 관절염                           |
|                                 | 드물게    | 근육연축, 두기결                               |
| 신장 및 방광이상                       | 드물게    | 근육통, 다뇨증                                |
| 생식계 및 유행양이상                     | 드물게    | 발기부전                                    |
| 전신 이상 및 투여부위 반응                 | 흔하게    | 부종, 혈압부종, 얼굴부종, 말초부종, 피곤, 홍조, 무력증, 안면홍조 |

## 2) 병용에 대한 추가정보

이중 맵킨, 약을 드는 위약 대조 임상시험에서, 알로디핀 단독투여군(9%)에 비해 병용 투여군(5.8%)에서 말초 부종의 발생빈도가 통계적으로 낮게 나타났다.

## 3) 각 유효성분에 대한 추가 정보

비록 이 약을 투여한 임상시험 및 시판후경험에서 관찰되지 않았더라도, 이전에 각각의 성분에 대하여 보고된 이상반응이 나타날 수 있다.

## ① 발사르탄

(표2) 발사르탄 단독투여시 발생한 이상작용발생

| 발현부위     | 발현빈도    | 발현증상                                     |
|----------|---------|------------------------------------------|
| 혈액 및 림프계 | 알려지지 않음 | 헤모글로빈 감소<br>헤마토크릿 감소<br>홍구수 감소<br>혈소판 감소 |
| 면역계      | 알려지지 않음 | 혈청병을 포함한 과민성                             |
| 대사 및 영양  | 알려지지 않음 | 혈청 칼륨 증가                                 |

| 혈관<br>간 및 담도 | 알려지지 않음<br>알려지지 않음 | 혈관염<br>간을 주지<br>(혈청 빌리루빈 포함) 상승 |
|--------------|--------------------|---------------------------------|
| 피부 및 피부조직    | 알려지지 않음            | 혈관부종                            |
| 근골격계 및 연조직   | 알려지지 않음            | 근육통                             |
| 신장 및 비뇨기계    | 알려지지 않음            | 신부전 및 신손상<br>혈청 크레아티닌 상승        |

약물과의 연관관계와 상관없이 임상시험 동안에 다음과 같은 증상이 보고되었다: 불면, 성욕감퇴, 인두염, 비염, 부비염, 피부염, 삼기도염, 바이러스 감염  
 ② 알코디핀  
 약물과의 연관관계와 상관없이 알코디핀 임상시험에서 보고된 이상반응은 <표>과 같다.  
 <표> 알코디핀 단독투여시 발생한 이상반응

| 발현부위           | 발현빈도   | 발현증상                                |
|----------------|--------|-------------------------------------|
| 눈의 이상          | 흔하지 않게 | 발신                                  |
| 혈액 및 림프계 이상    | 매우 드물게 | 혈소판감소증, 백혈구 감소증                     |
| 면역계 이상         | 매우 드물게 | 알려지지 않음                             |
| 대사 및 영양 이상     | 매우 드물게 | 고혈당                                 |
| 정신계 이상         | 흔하지 않게 | 불면증, 감정변화                           |
| 신경계 이상         | 흔하지 않게 | 떨림, 감각저하, 미각이상                      |
|                | 매우 드물게 | 말초 신경병, 과다근육긴장증                     |
| 심장 이상          | 매우 드물게 | 부정맥, 사맥, 심방세동, 심실성 빈맥, 심근경색         |
| 혈관 이상          | 매우 드물게 | 혈관염                                 |
| 호흡기, 흉부 및 종격이상 | 흔하지 않게 | 흉통관련, 비염                            |
| 위장관 이상         | 흔하지 않게 | 구토, 소화불량                            |
|                | 매우 드물게 | 해장성 위염, 위염증식                        |
| 간담도계이상         | 매우 드물게 | 간염, 황달                              |
| 피부 및 피부조직 이상   | 흔하지 않게 | 탈모증, 자색반출, 피부 탈색, 광과민반응             |
|                | 매우 드물게 | 혈관부종, 두드러기, 다형홍반, 스티븐 존스 증후군        |
| 근골격 및 연조직 이상   | 흔하지 않게 | 근육통                                 |
| 신장 및 방광 이상     | 흔하지 않게 | 배뇨장애, 요도증                           |
| 생식기 및 유방 이상    | 흔하지 않게 | 여성유방종                               |
| 전신 이상 및 투여부위   | 흔하지 않게 | 통증, 관절염, 기술통증                       |
| 검사             | 흔하지 않게 | 체중감소, 체중 증가<br>간효소 증가(대부분 담즙정체와 관련) |

5. 일반적 주의  
 1) 운전 및 기계조작시 주의  
 운전 및 기계 사용에 미치는 영향에 대한 임상시험은 수행되지 않았다. 운전 및 기계 사용시 간헐적으로 어지러움 및 피로가 나타날 수 있음을 고려해야 한다. 다른 항고혈압제와 마찬가지로 운전이나 기계류를 조작할 때는 특별히 주의 한다.

6. 상호작용  
 1) 발사르탄

① 안지오텐신 수용체 차단제 ACE 저해제 또는 알리시카텐의 병용투여에 의한 리난-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)의 이중적 차단에 이러한 약물의 단독효과와 비교시 저혈압, 실신, 고칼륨혈증 및 신기능의 변화(크레아티닌 수치) 위험을 증가시키는 것과 관련이 있다. 이 약과 RAAS에 작용하는 다른 약물을 병용투여하는 환자에서, 포합, 혈압, 신기능 및 전해질을 면밀히 모니터링해야 한다. 당뇨병이나 중증증-중증의 신장에 (사구체여파율 <60 mL/min/1.73m<sup>2</sup>)에게 이 약과 알리시카텐 함유제제를 병용투여하지 않는다.

② 칼륨: 칼륨 보충제, 칼륨보존 이뇨제, 칼륨을 함유한 식염수용액 또는 칼륨 수치를 상승시킬 수 있는 다른 약물(예, 해파린)과 병용 시에는 주의하여야 하며, 빈번히 칼륨 수치를 모니터링 해야 한다.

③ 비아스테로이드 소염제(NSAIDs): 안지오텐신 II 수용체 길항제 NSAIDs(예, 항염증요법으로 아스피린, COX-2 저해제)와 동시에 투여되었을 때 항고혈압 효과가 감소할 수 있다. 특히, 노인환자, 체액이 부족한 환자 (치매, 신장기능 이상) 또는 신장기능이 저하되어 있는 환자의 경우 신장기능 악화의 위험성을 증가시킬 수 있다. 그러므로 NSAIDs 병용 투여에는 환자에게 발사르탄 투여를 시작하거나 투여 방법을 변경할 때에는 신장기능의 모니터링이 권장된다.

④ 전달체(transporters): 신장의 간 조직을 가지고 한 in vitro 연구 결과에서 발사르탄이 간 흡수 전달체 OATP1B1과 OATP1B3, 간 유출 전달체 MRP2의 기질을 보여 주었다. 흡수 전달체 저해제(리람피신, 페리톤 로소그린) 또는 유출 전달체 억제제(클로니다비어)의 병용투여는 발사르탄의 전신 노출을 증가시킬 수 있다.

⑤ 발사르탄 단독투여 시, 다음의 약물과 임상적으로 유의한 상호작용이 관찰되지 않았다: 시메티딘, 화파린, 푸로세미드, 디곡신, 이베나프론, 인도메타신, 히드로콜로티아지드, 알코디핀, 글리베헤나미드와의 상호작용에 대한 임상시험이 있었다.

2) 알코디핀  
 ① 임상시험: 알코디핀 10mg과 심바스타틴 40mg의 다회용량 병용투여는 심바스타틴 단독투여시와 비교하여 심바스타틴의 노출을 77%정도 증가시켰다. 알코디핀을 투여받는 환자에서 심바스타틴의 1일 최대 투여용량은 20mg이다.

② CYP3A4 저해제: 고정제에서 알코디핀 5mg과 딜티아제 1일 180mg을 복합투여한 경우에 알코디핀의 전신노출이 57%까지 증가되었다. 강력한 CYP3A4 저해제(예, 케토코나졸, 이트라코나졸, 리토나비어)의 경우 알코디핀의 혈중 농도를 딜티아제 보다 더 많이 증가시킬 수 있으므로 알코디핀을 CYP3A4저해제와 병용투여시 주의하여 투여한다.

③ CYP3A4 유도제: 알코디핀에 대한 CYP3A4 유도제(예, 리람피신, 세인트 존스 워트)의 영향에 대한 정보는 없

으나 병용투여시 알코디핀의 혈장농도가 감소될 수 있으므로 병용투여시 주의한다.  
 ④ 기타 알코디핀 단독투여시, 티아지드계 이뇨제, 알파-차단제, 베타-차단제, 안지오텐신 전환 효소 저해제(Angiotensin converting enzyme inhibitor), 작용시간이 긴 질산염제제, 니트로글리세린 혈장정, 디곡신, 화파린, 이토로바스타틴, 실데나필, 알루미늄/마그네슘(제산제), 시메티딘, 비스테로이드성 소염제, 항생제, 경구 혈당강화제, 에탄올(알코올), 사이클로스포린과 병용시 안전하였다.  
 ⑤ 자율주사: 20ml의 건강성 시험액에 240 mL의 자율주사와 알코디핀 10mg의 혼합 경우투여시 알코디핀의 약동학에 유의적인 영향이 없었다.

7. 임부 및 수유부에 대한 투여  
 1) 안지오텐신 길항제의 작용기 때문에 태아에 대한 위험을 배제 할 수 없다. 안지오텐신 전환효소 저해제(리난-안지오텐신-알도스테론 체계(RAAS)에 작용하는 특수한 약물군)를 임신 271 및 37에 복용한 임부에게서 발달중인 태아에 대한 손상과 사망이 보고된 바 있다. 그리고 임신 1기에 ACE 저해제의 사용은 태아 기형의 잠재적 위험성과 관련이 있다. 발사르탄을 우발적으로 복용한 임부에서 자전유산, 양수과소증, 신생아 신기능이상 등이 보고된 바 있다. RAAS에 직접 작용하는 다른 약물과 같이, 이 약도 임신 중 또는 임신을 할 계획이 있는 경우에 사용해서는 안 된다. 의사는 임신을 할 가능성이 있는 여성에게 RAAS에 작용하는 약물을 처방할 때에 임신 중 이러한 약물의 잠재적 위험성에 대해 설명하여야 한다. 이 약 치료 중 임신이 발생하면, 가능한 빨리 이 약을 중단해야 한다.

2) 신장에서 발사르탄 및/또는 알코디핀의 유증 분비 여부는 알려지지 않았으나, 쥐에서는 발사르탄이 유즙으로 분비되었다. 따라서 수유중인 여성이 이 약을 사용하는 것은 권장하지 않는다.

3) 이 약 및 각각의 단일제에서 생식능에 대한 임상연구는 없었다. 이 약에 대한 생식능에 대한 비밀상지로는 없지만, 발사르탄 및 알코디핀 각각의 성분으로 실시한 비밀상지시험에서 생식능에 대한 영향을 나타내지 않았다.

8. 소아에 대한 투여  
 이 약은 만18세 미만 환자에서의 안전성 및 유효성에 대한 자료가 충분치 않으므로, 투여를 권장하지 않는다.

9. 고정제에 대한 투여  
 성인과 고정제에서 유사한 용량을 사용하였을 때 이 약의 두 성분에 대하여 모두 우수한 내약성을 나타냈으므로 정상 용량을 권장한다.

10. 임상시험에서의 영향  
 1) 발사르탄/알코디핀을 투여 받은 고혈압 환자 중 검사수치에 기저치에서 명백하게 변화한 환자는 매우 적었다. 알코디핀/발사르탄 병용군(5.5%) 및 발사르탄 단독투여군(5.5%)에서는 위약투여군(4.5%) 보다 높은 혈당조소(SGLT)를 나타냈다.

2) 발사르탄 투여시 때때로 간기는 검사치의 상승에 보고되었으나 이 약을 투여하는 본태성 고혈압 환자에 대해 발현된 임상검사치의 모니터링이 필요한 정도는 아니다.

11. 과량투여시의 처치  
 이 약을 과량 복용한 경험은 없다. 발사르탄 과량 투여 시 주요한 증상으로 어지러움을 동반한 저혈압이 나타날 수 있다. 알코디핀 과량 투여 시에는 말초혈관을 과도하게 확장시켜 반사성반맥을 일으킬 수 있다. 전신성 저혈압이 지속되어 사망에 이르는 소크까지도 일어난 사례가 보고된 바 있다.

이 약 과량투여로 인한 임상적으로 유의한 저혈압이 나타나면, 심기능 및 호흡 기능을 자주 모니터링하고, 사지를 높게 유지하여 체액의 순환 재확장 및 뇌 배출량을 유실히 관찰하는 등 병동적으로 심혈관 요법을 행해야 한다. 혈관수축제 사용이 급가치 아니라면 혈관긴장도 및 혈압을 회복시키는 데 도움이 될 수 있다. 정맥 클로트린산 흡수는 칼륨 채널 차단을 회복시키는데 도움이 된다. 발사르탄과 알코디핀은 모두 혈액투석으로 제거되지는 않는다. 이 약의 과량복용 작용하는 구토를 유도하거나 위세척을 하는 것을 고려할 수 있다. 감시하여 지친지까지 알코디핀 복용 후 즉시 ~2시간 지점에서 활성탄을 투여했을 때, 알코디핀 흡수를 유익적으로 감소시켰다.

12. 기타  
 랫드에서 실시한 배태자 독성 시험과 랫드와 마우스에서 13주간 시험한 동물시험에서, 사람에서 의미있을 것으로 생각되는 독성학적인 발견은 없었다.

13주간 랫드에서 정구투여한 결과, 알코디핀/발사르탄을 3/48 mg/kg/day 이상 투여한 수컷에서 선우 염증이 관찰되었다. 알약 랫드에서는 관찰되지 않았다. 마우스에서 이러한 용량에서도 이러한 결과가 관찰되지 않았으나, 고정량 투여 시 대장염이 관찰되었다(5/80 mg/kg/day 이하에서는 어떠한 영향도 관찰되지 않았다). 임상시험에서 이 약 투여 시 관찰된 위장관계 이상반응 발현빈도는 단독투여 시 관찰된 이상반응 발현빈도와 유사하였다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(~30℃)보관

[포장단위] 자사포장단위

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

· 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처에서 교환해 드립니다.  
 · 제품에 대한 기타 자세한 사항과 이후 변경된 내용은 본사 의학정보부(02-516-6113)로 문의하시기 바랍니다.

TW1136-30823  
 최종개정일자: 2013년 9월 4일

제조회사/판매인

 **한국유나이티드제약 (주)**  
 세종특별자치시 진동면 노정공단길 25-23

제조자

**주식회사 비씨월드제약**

경기도 여주군 가남면 여주남로 872-23