

디푸코졸캡슐

(플루코나졸)



【원료약품명】 1캡슐 중		
플루코나졸	(EP)	50.0mg
유당수화물	(KP)	유당불내(권강한 소의 우유)

【성상】 백색 분말이 충전된 상부 담정성 하부 백색의 캡슐제

【효능·효과】

- 급성 또는 재발성 질칸디다증
- 면역기능이 정상인 환자 및 면역기능저하 환자의 구강 인두, 식도, 비침습성 기관지 폐렴염과 칸디다노증, 피부점막 및 만성외측성 구강칸디다증(의치로 인한 구강내 통증) 등을 포함한 점막 칸디다증
- 칸디다혈증, 파종성 칸디다증 및 그 외의 다른 침습성 칸디다감염증(백막, 심내막, 폐, 비뇨기계 등)을 포함한 전신 칸디다증
- 면역기능이 정상인 환자 및 면역기능저하 환자(에이즈(AIDS), 장기이식 환자 또는 그 밖의 다른 면역억제요법을 받는 환자 등)의 크립토кок쿠스 수막염 및 폐, 피부 등 신체 다른 부위의 크립토кок쿠스증
- AIDS 환자의 크립토кок쿠스증의 재발을 방지하기 위한 유지요법
- 세포독성화학요법이나 방사선요법, 골수이식으로 인한 호중구감소증으로 인해 진균감염의 위험이 있는 면역기능저하 환자의 진균감염증 예방
- 손 - 발톱진균증, 무좀(족부백선), 체부백선, 원선(살색선), 어루러기 및 피부칸디다증을 포함한 피부진균 감염증

【용법·용량】

약물투여경로는 환자의 임상상태에 따라 결정됩니다. 경구제제의 흡수는 빠르고 거의 완전하게 흡수되므로, 경구제제(캡슐, 건조시럽)와 주사제제의 투여량은 같습니다.
【성 인】 1. 질칸디다증：플루코나졸로서 150 mg 단회 경구투여 2 점막 칸디다증：이 약으로서 보통 1일 1회 50mg을 7-14일간 투여하여 의사의 판단에 따라 연장 투여할 수 있습니다. 2. 만성 위측성 구강칸디다증(의치로 인한 구강 내 통증)：이 약으로서 보통 1일 1회 50 mg을 14일간 투여하여 3회의 국소 소독을 병행해야 합니다. 3) 기타 점막 칸디다증 (질칸디다증을 제외한 식도칸디다증, 비침습성 기관지 폐렴염증, 칸디다노증, 피부 점막 칸디다증 등)：이 약으로서 보통 1일 1회 50mg을 14-30일간 투여하며 난치성 점막 칸디다증의 경우에는 1일 100mg으로 증량할 수 있습니다. 3. 칸디다혈증, 파종성 칸디다증 및 그 외의 침습성 칸디다 감염증(백막, 심내막, 폐, 비뇨기계 등)을 포함한 전신칸디다증：이 약으로서 보통 첫날 400mg을 1회 투여하고 다음날부터 1일 1회 200mg을 투여하여, 환자의 반응에 따라 1일 400mg까지 증량할 수 있습니다. 투여기간은 임상적 반응 및 의학적 판단에 따라 결정됩니다. 4. 크립토кок쿠스 수막염 및 다른 부위의 크립토кок쿠스증：이 약으로서 보통 첫날 400mg을 1회 투여하고 다음날부터 1일 1회 200 ～ 400mg을 투여합니다. 치료기간은 임상반응 및 진균학적 반응에 의해 결정되나 보통 최소한 6 ～ 8주간 투여해야 합니다. 5. AIDS 환자의 크립토кок쿠스 수막염 재발 방지를 위해서는 환자가 기초 치료를 모두 받은 후 이 약으로서 1일 1회씩 최소한 100mg을 무기한 투여합니다. 6. 세포독성화학요법이나 방사선요법, 골수이식으로 인한 호중구 감소증으로 인해 진균 감염증의 위험이 있는 면역부전 환자의 진균 감염증에 걸릴 위험증도에 따라 이 약으로서 1일 50～ 400mg을 투여하여야 합니다. 전신성 진균 감염증의 위험이 매우 높은 환자, 즉 골수이식의 경우와 같이 호중구 감소증이 심하거나 호중구 감소증 기간이 길 것으로 예상되는 환자에게는 1일 400mg을 1주일 동안 1주일 당 400mg 을 투여하여야 합니다. 7. 손 - 발톱진균증에는 보통 1주 150 mg씩 투여하며, 투여기간은 손, 발톱이 다시 자랄 때까지 (감염되지 않은 새로운 손, 발톱이 자랄 때까지) 투여합니다. 새로운 손톱이 자라는데 걸리는 기간은 보통 3-6개월, 무좀(족부백선), 체부백선, 원선(살색선), 피부칸디다증을 포함한 피부 진균감염증：이 약으로서 보통 1일 1회 50 mg 또는 1주 1회 150 mg을 2-4주간 투여합니다. 그러나 무좀의 경우 곁가에 따라 6 주간 투여가 필요할 수도 있습니다. 어루러기는 1일 1회 50mg을 2-4주간 투여합니다.
【소 아】 성인용량에 근거한 소아용량은 일반적으로 다음과 같은 기준을 적용하며, 최대 400mg 을 초과하지 않습니다.

단, 생후 6개월 미만의 영아에 대한 안전성, 유효성이 확립되어 있지 않습니다(생후 6개월의 경우 주의사항 참조).
1. 구강 인두 칸디다증 - 이 약으로서 첫날 체중 kg당 6mg을 투여하고, 다음날부터 1일 체중 kg당 3mg을 투여합니다. 재발방지를 위해 최소 2주간 투여해야 합니다.
2. 식도 칸디다증 - 이 약으로서 첫날 체중 kg당 6mg이 배, 다음날부터는 1일 체중 kg당 3mg을 투여합니다. 환자의 반응에 따라 1일 12mg 까지 증량할 수 있습니다.
최소 3주간, 증상 소멸 후 적어도 2주간 투여합니다.
3. 칸디다혈증, 파종성 칸디다증 및 그 외의 다른 침습성 칸디다 감염증(백막, 심내막, 폐, 비뇨기계 등)을 포함한 전신 칸디다증：1일 체중 kg당 6-12mg의 용량을 투여합니다. 투여기간은 임상적 반응 및 의학적 판단에 따라 결정합니다.
4. 크립토кок쿠스 수막염 - 이 약으로서 첫날 체중 kg당 12mg을 투여하고, 다음날부터 1일 체중 kg당 6mg을 투여합니다. 환자의 반응에 따라 1일 체중 kg당 12mg으로 증량할 수 있습니다.
치료기간은 뇌척수액 배양 음성 소견이 있을 후 10-12주간 동안 투여합니다.
5. AIDS환자의 크립토кок쿠스 수막염의 재발방지를 위해서는 환자가 기초치료를 모두 받은 후 1일 1회 체중 kg당 6mg을 투여합니다.
6. 신장에 소아는 신장에 중도대 마다 신장 신장에 환자와 동일한 기준으로 투여기간을 늘리고 용량을 줄여야 합니다. 10mg미만의 용량을 투여할 때는 정확한 양을 맞추기 위해 소아의 임상적 상태에 따라 시험량을 경구투여하거나, 주사제를 정맥주사 하여야 합니다.

【교정제】 신기능이 정상인 경우에는 보통 성인 용량을 투여하여 신장애가 있을 때에는(크레아티닌 청소율 40 ml/min이하) 투여용량을 줄이거나 투여간격을 늘려야 합니다.
【신장애 환자】 이 약은 변화되지 않은 채 주 소변을 통해 배설됩니다. 한번만 투여하는 경우에는 용량조절이 필요 없으나 여러 번 투여하여 하는 경우에는 투여첫날에만 사용량을 투여하고 다음날부터는 다음과 같이 용량을 조절해야 합니다.
경정제제를 투여하는 환자의 경우 각 투석 후에 사용량의 100%를 투여해야 합니다.
다. 투석을 하지 않는 날에는 크레아티닌 청소율에 따라 감량하여 투여해야 합니다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
1) 이 약 및 다른 부형제, 다른 아졸계 약물에 과민반응의 병력이 있는 환자
2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
3) 다음의 약을 투여받고 있을 환자：- 다화용성상작용시험결과에 근거하여, 이 약을 1일 당 400mg 또는 그 이상 용량을 반복 투여 받고 있는 환자에게 테르페나딘과의 병용 - QT 간격 연장 시키는 약물 및 CYP3A4에 의해 대사되는 시사프라이드, 아스테미졸, 에리트로마이신, 피모지, 퀴니딘과의 병용 - 에로고다민, 디하드로에르고다민
4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp 유당 lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.(유당함유제에 한함)
2) 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
1) 약물과민반응의 병력이 있는 환자
2) 신장애 환자
3) 간장애 환자(간기능이 악화될 수 있습니다.)
4) 심장질환 또는 전해질이상 등 부형제의 가능성이 있는 환자(Torsades de pointes 를 포함한 심실빈맥, QT연장, 심실세동, 발실차단, 서맥 등이 나타날 수 있습니다.)
5) 다음의 약을 투여받고 있는 환자：- 이 약과 1일 400mg 미만 용량의 테르페나딘 병용투여 받는 환자는 신중히 모니터링 되어야 합니다. - 할로판트린
6) 이 약은 강력한 CYP2C9억제제 및 중증도의 CYP3A4억제제입니다. 따라서 CYP2C9 과 CYP3A4를 통해서 대사되는 좁은 치료여용을 가진 약물과 병용 시 환자들을 모니터링 해야 합니다.
3. 이상반응
이 약은 일반적으로 내약성이 좋습니다. 이 약과 대조약물을 투여하는 임상시험 동안, 특히 AIDS, 알과 같이 중대한 기저 질환을 가진 일부 환자들에서 신장 및 혈액학적 기능시험 결과변화와 간장애가 관찰되었으나, 임상적 유의성과 치료와의 연관관계는 확실하지 않습니다. 이 약의 치료기간 동안 아래와 같은 빈도로 다음과 같은 이상반응이 관찰 될 수 보고되었습니다.：
매우 흔하게 보고된(≥1/10), 흔하게 보고된(≥1/100 ～ <1/10), 흔하지 않게 보고된(≥1/1000 ～ <1/100), 드물게 보고된(≥1/10000～<1/1000), 매우 드물게 보고된(<1/10000)

신체계	빈도	이상반응
혈액 및 림프계 이상	드물게	무과립구증, 백혈구감소증, 호중구감소증, 저혈소판증
면역계 이상	드물게	아나필락시스, 혈관부종
대사 및 영양계 이상	드물게	고중성지방혈증, 고콜레스테롤혈증, 저알부민혈증
진진계 이상	흔하지 않게	불면증, 졸림
신경계 이상	흔하게	두통
	흔하지 않게	발작, 험기증, 감각이상, 미각이상
	드물게	말림
청각 및 미로 이상	흔하지 않게	어지럼
심장계 이상	드물게	torsade de pointes, QT연장
위장관계 이상	흔하게	복통, 설사, 오심, 구토
	흔하지 않게	소화불량, 고창, 입안건조
간·담도계 이상	흔하게	ALT(Alanine aminotransferase) 증가, AST(Aspartate aminotransferase) 증가, 혈중alkaline phosphatase 증가
	흔하지 않게	담즙울체, 황달, 빌리루빈 증가
	드물게	간독성(드물게 치명적 경우 포함), 간부전, 간세포괴사, 간염, 간세포손상
피부 및 피하조직 이상	흔하게	발진
	흔하지 않게	가려움, 두드러기, 딸뽕비종가, 약물발진
	드물게	중독성 피부 괴사용해, 스티븐스-존슨 증후군, 급성 발발성 발진성 홍포증, 말락리아증, 열열부종, 탈모
근골격계, 결합조직 및 뼈이상	흔하지 않게	근육통
전신 이상 및 투여 부위 상태	흔하지 않게	피로, 권태, 무력증, 발열

소아환자：소아임상시험에서 기록된 이상반응 및 실험실검사치 이상(laboratory abnormalities)의 패턴과 빈도는 성인에서와 보여 진 바와 유사합니다

4. 일반적 주의

1) 특히 AIDS나 알과 같은 중증 기저질환이 있는 일부 환자에서 이 약의 투여기간 중 혈액학, 간장, 신장, 그 외 생화학적 기능검사에서 이상이 관찰되었으나 그 임상적인 중요성과 이 약과의 관련성에 대해서는 확인되지 않았습니다.
2) 매우 드물게 이 약을 수차례 복용한 적이 있는 중증 기저질환을 가진 환자의 투여에서 간과사가 관찰되었습니다. 이들 환자들은 간과사를 이들 질환을 가지고 있었거나 간독성을 유발할 수 있는 잠재적인 가능성을 가진 여러 약들을 병용하고 있었지만 이 약과의 관련성도 배제할 수 없으므로, 치료 중 이들 환자의 간효소가 의미있게 증가할 경우에는 이 약 투여에 따른 위험성과 유익성을 잘 평가해야 합니다.
3) AIDS 환자는 많은 약 물에서 중증 피부반응을 일으키기 쉽습니다. 이 약과 심한 피부발병에 관련이 있다고 알려진 다른 약물을 복합 투여한 결과 소수의 AIDS 환자에서 이 약의 피부반응들의 증가가 확인되었습니다.
4) 신장애 환자에게 투여할 경우 투여 전에 크레아티닌 청소율을 측정하여, 투여량과 투여간격을 조절하는 등 주의합니다.
5) 이 약 투여 전에 혈액

전문의약품

분류번호：629

항진균제

디푸코졸 캡슐

(플루코나졸)

검사, 신기능검사, 간기능검사, 혈중 전해질검사 등을 실시하는 것을 권장합니다.

5. 상호작용

이 약과 다음 약물을 병용투여하지 않습니다. - 시사프라이드：이 약과 시사프라이드 병용투여 시 Torsade de Pointes를 포함한 심혈관계 이상반응이 보고되었습니다. 이 약200mg씩 1일 1회 투여하고 시사프라이드(20mg 씩 1회 4회 투여) 병용투여 한 통제된 임상시험에서 시사프라이드에 혈청농도 증가 및 QTc 간격 연장이 나타났습니다. 따라서 이 약과 시사프라이드를 병용투여하지 않습니다. - 테르페나딘：테르페나딘과 함께 아졸계 항진균제를 투여 받는 환자에서 QTc간격 연장에 따르는 중증 심 부정맥이 발생되었으므로, 약물상호작용시험이 수행되었습니다. 이 약을 1일 200mg 투여 한 시험은 QTc 간격 연장을 입증하지 못했습니다. 또 다른 시험(이 약 1일 400mg, 1일 800mg 투여는 테르페나딘을 병용 시 이 약 1일 400mg 또는 그 이상 용량의 투여하 카나디딘의 혈청 농도를 상당히 증가시켰을 보였습니다. 이 약 400mg 또는 그 이상의 용량과 테르페나딘을 병용투여하지 않습니다. - 아스테미졸：이 약과 아스테미졸의 병용은 아스테미졸의 청소율을 감소시킬 수 있습니다. 아스테미졸의 혈청농도의 증가는 QT연장 및 드물게 torsade de pointes를 일으킬 수 있습니다. 이 약과 아스테미졸을 병용투여하지 않습니다. - 피모지：in vivo 및 in vitro 실험은 실시되지 않았으나, 이 약과 피모지의 병용투여가 피모지의 대사억제를 유발시킬 수 있습니다. 증가된 피모지 혈청농도는 QT연장 및 드물게 torsades de pointes 를 일으킬 수 있습니다. 이 약과 피모지는 병용투여하지 않습니다. - 퀴니딘：in vivo및 in vitro 실험은 실시되지 않았으나, 이 약과 퀴니딘의 병용투여는 퀴니딘의 대역적 제를 유발시킬 수 있습니다. 퀴니딘의 투여는 QT 연장과 드물게 torsades de pointes의 발현과 관련 있었었습니다. 이 약과 퀴니딘은 병용투여하지 않습니다. - 에리트로 마이신：이 약과 에리트로마이신의 병용은 심독성(QT간격 연장, torsades de pointes) 및 그에 따른 급성 심정지 위험 증가시킬 가능성이 있습니다.

이 약과 에리트로마이신은 병용투여하지 않습니다. 이 약과 다음 약물을 병용투여 시 신중투여 및 용량조절이 고려됩니다.
1) 다른 약물：플루코나졸이 미치는 영향 - 히드로클로로치아자：건강한 지원자를 대상으로 한 약물동력학적 상호작용시험에서 이 약과 다화용량의 히드로클로로치아지를 병용투여 시, 이 약의 혈장 농도가 40%까지 상하하였습다. 이 정도 수준의 영향으로, 이노제를 병용하는 환자에서 이 약의 투여량 조절은 필요 하지 않습니다. - 리튬파산：이 약과 리튬파산을 병용투여 시 이 약의 AUC가 25% 감소하고 반감기가 20% 짧아졌습니다. 그러므로 리튬파산과 병용 시 이 약의 증량을 고려하여야 합니다.
2) 플루코나졸이 다른 약물에 미치는 영향：이 약은 강력한 CYP2C9억제제 및 중증도의 CYP3A4억제제입니다. 아래 언급한 관찰되고/입증된 상호작용뿐만 아니라, 이 약을 병용투여 시 CYP2C9과 CYP3A4에 의하여 대사되는 다른 약물들의 혈장 농도가 증가되는 위험성이 있습니다. 특히 아래 약물들과 병용 시 신중함이 요구되며, 환자를 주의하여 모니터링 해야 합니다. 이 약의 긴 반감기 때문에 치료 중단 후에도 플루코나졸의 효소억제효과는 4-5일간 지속 됩니다. - 알펜타닐：이 약과 알펜타닐을 병용투여 한 시험에서 알펜타닐의 반감기 증가 및 청소율과 분포용량의 감소가 관찰되었습니다. 이 같은 작용의 기능성은 이 약의 CYP3A4억제에 있습니다. 알펜타닐의 용량조절이 필요할 수 있습니다. - 이미트리프틸린, 노르트리프틸린：이 약은 이미트리프틸린과 노르트리프틸린의 효과를 증가시킵니다. 이 약과 병용치료 시작 시점 및 일주일 후, 5-노르트리프틸린/5-이미트리프틸린이 축정될 수 있습니다. 필요 시 이미트리프틸린/노르트리프틸린의 용량이 조절되어야 합니다. - 알파테리신 B：감염증의 정상 마우스와 면역이 억제된 마우스를 대상으로 이 약과 알파테리신을 동시 투여했을 때 다음과 같은 결과를 보였습니다.：C, albanic에 의한 전신감염에서는 혈청간균과 약 2만 대 관찰되었음. Cryptococcuseofor-mans에 의한 두개내감염에서는 약물상호작용이 관찰되지 않았음, A. fumigatus에 의한 전신감염에서의 두 약물의 병합작용, 이 시험에서 얻어진 결과의 임상적 유의성은 알려지지 바 없습니다. - 항응고제：건강한 지원자를 대상으로 한 약물상호작용시험에서 이 약은 와파린 투여 후 프로트롬빈시간(2%)을 증가시켰습니다. 시판 후 조사결형에서 다른 아졸계 약제와 마찬가지로 이 약과 와파린을 동시에 병용투여 시 프로트롬빈시간을 연장으로 인한 출혈경향(형, 코피, 위장관 출혈, 혈소, 혈변)이 보고 되었습니다. 쿠마린계 항응고제를 투여 받는 환자에서서 프로트롬빈시간을 주의하여 모니터링 해야 합니다. 와파린의 용량조절이 필요할 수 있습니다. - 아지트로마이신：18일의 건강한 지원자를 대상으로 한 공개, 무작위, 3병향 교차시험에서 이 약800mg 단회 경구투여의 약동학에 대한 아지트로마이신(1200mg 단회 경구투여)의 영향 뿐 아니라 아지트로마이신의 약동학에 대한 이 약의 영향이 평가되었습니다. 이 약과 아지트로마이신 사이에 유의한 약동학적 상호작용은 없었습니다. - 벤조디아제핀계 약물(속 효소)：미다졸람 투여 후, 이 약으로 인해 미다졸람의 농도와 정신운동학적 효과가 상당히 증가되었습니다. 이러한 효과는 이 약의 주사제보다 경구제에서 더 두드러졌습다. 이 약과 벤조디아제핀계 약물의 병용이 필요 시 벤조디아제핀계 약물의 감량을 고려해야 하며, 환자를 적절히 모니터링해야 합니다. 이 약은 트리아졸람의 대사를 저해하기 때문에 트리아졸람(단회투여)의 AUC를 50% 증가시키고 Cmax는 20-32%, 반감기는 25-50% 증가시켰습니다. 트리아졸람의 용량조절이 필요할 수 있습니다. - 카르바마제핀：이 약은 카르바마제핀의 대사를 저해하며 카르바마제핀 혈청농도가 30% 증가됨이 관찰되었습니다. 카르바마제핀 독성이 발생할 위험이 있습니다. 농도 측정과/또는 에 따라 카르바마제핀의 용량조절이 필요할 수 있습니다. - 칼슘채널차단제：특정 칼슘채널차단제(니페딘, 니소디핀, 알로피딘, 베라파민, 펠로디핀)은 CYP3A4에 의해 대사 됩니다. 이 약은 칼슘채널차단제의 전신 노출을 증가시킬 가능성이 있습니다. 이상반응에 대해 빈번한 모니터링을 권장합니다. - 페레크시브：이 약 (1일 200mg)과 페레크시브(200mg) 병용 치료 시, 페레크시브의 Cmax와 AUC는 각각 68%, 134% 증가하였습니다. 이 약과 병용 시 페레크시브의 투여는 절반용량으로 줄이는 것이 필요할 수 있습니다. - 시클로포스포란：이 약은 사이클로포스포란의 AUC와 농도를 상당히 증가시킵니다. 사이클로포스포란 농도에 따라, 사이클로포스포란 감량에 의해 이 약과 병용할 수 있습니다. - 시클로포스포리드：이 약과 시클로포스포리드의 병용요법 시 혈청 빌리루빈과 혈청 크레아티닌의 증가가 나타났습니다. 혈청 빌리루 빈 및 혈청 크레아티닌 상승의 위험성을 신중히 고려했을 때, 이 약과 병용할 수 있습니다. - 펜타닐：이 약과 펜타닐의 상호작용 가능성이 있는 치명적인 사례 한 건이 보고되었습니다. (이것은 펜타닐 중독으로 인한 사망으로 인한 사망으로 판단되었습니다. 더욱이 12 명의 건강한 지원자 시험에서도 한 무리인, 교차시험에서 이 약이 펜타닐 제거(elimination)를 상당히 지연시킴을 보였습니다. 펜타닐 농도 상승은 호흡 억제를 일으킬 수 있습니다. - 할로판트란：이 약은 CYP3A4에 대한 억제작용 때문에 할로판트린의 혈장 농도를 증가시킬 수 있습니다. - HMG-CoA환원효소억제제：이 약을 CYP2C9에 의해 대사(예：플루바스타틴) 또는 CYP3A4에 의해 대사(예：아토르바스타틴, 시바스타틴)는 HMG-CoA 환원효소억제제와 병용투여 시 근육병증 및 혈관근용해의 위험성이 증가됩니다. 병용요법이 필요할 경우 환자의 근육병증 및 혈관근용해 증상을 관찰해야 하며, 크레아티닌 키나아제(creatinine kinase)를 모니터링 해야 합니다. 근육병증/혈관근용해가 진단, 의심되거나 크레아티닌 키나아제의 혈청한 증가가 관찰된다면 HMG-CoA 환원효소억제제 투여를 중단하여야 합니다. - 로자탄：이 약은 치료기간 동안, 로자탄이 인지오메타신에유체활작용의 대부분을 담당하는 대사산물(제2-31 74) 로 대사되는 것을 방해합니다. 환자들은 계속해서 합합을 모니터링해야 합니다. - 메사돈：이 약은 메사돈의 혈청농도를 증가시킬 수 있습니다. 메사돈의 용량조절이 필요 할 수 있습니다. - 비스테로이드성 항염증제제(NSAIDs)：플루비프로펜 단독 투여에 비해 이 약과 병용투여 시 플루비프로펜의 Cmax와 AUC가 각각 23%, 81% 증가하였 습다. 이 약 유사하게 라세피 이부프로펜(400mg)단독투여에 비해 이 약과 병용 시 약물학적 혈청 이상치인 [S-(+)-이부프로펜의 Cmax와 AUC가 각각 15%, 82% 증가하였습니다. 특별한 연구된 바는 없지만, 이 약은 CYP2C9에 의해 대사되는 다른 NSAIDs(예：나프록센, 로사시관, 멜록시캄, 디클로날)의 전신 노출을 증가시킬 가능성 이 있습니다. 이상반응과 NSAIDs관련 독성에 대해 빈번한 모니터링이 권장됩니다. 효과/농도 측정에 따른 시들리루무스의 용량조절을 고려하여 이 약과 병용할 수 있습니다. - 설포닐요소계：건강한 지원자에 대해 이 약과 병용투여 시 설포닐요소계 약물(예：클로르소프amid, 글리벤클라리드, 글리파지, 톨부타미드)의 혈청반감기 연장을 증가시킨다. 이 약 500mg을 투여한 환자에 있어서는 호르몬 수치에 관련된 영향을 끼치지 않았습다. 따라서 위의 용량과 같은 다화용량의 플루코나졸을 투여는 경우투여의 병용 영향은 미치지 않는 것으로 보인다. - 페티토인：이 약은 페티토인의 간대사를 저해한다. 이 약과 병용투여 시 페티토인 독성을 피하기 위해 페티토인 의 혈청농도도를 모니터링 해야 합니다. - 프레드니솔론：프레드니솔론을 투여 받던 간이식 환자에서서 이 약을 3개월간 치료 후 중증 시, 급성 부신기능 기능저하가 발생 했는 사례가 보고되었습니다. 이 약의 중단에 대해 CYP3A4의 활성산물이 야기되어 프레드니솔론의 대사가 증가되었기 때문일 것으로 여겨집니다. 이 약과 프레드니솔 론을 같이간 투여 받은 환자는 이 약의 중단 시 부신기능 기능저하에 대해 신중히 모니터링 되어야 합니다. - 리파부탄：이 약과 리파부탄 병용 시 리파부탄의 혈청 농도 가 80%까지 증가한다는 상호작용 보고가 있었습니다. 이 약과 리파부탄을 병용한 환자에서서 포도당염이 보고되었습니다. 이 약과 리파부탄을 병용 시 환자를 신중히 모 니터링 해야 합니다. - 시클루리드：이 약은 P-glycoprotein(약제 및 CYP3A4에 의한 시클루리드 간대사 저해에 의해 시클루리드의 Cmax와 AUC가 각각 50%, 약 55% 증가시키며 시클루리드의 청소율을 약 50% 감소시킵니다. 시클루리브의 용량조절이 필요할 수 있습니다. - 시들리루무스：이 약은 아마도 CYP3A4와 P-glycopro-tein을 통한 시들리루무스의 대사를 저해하므로 시들리루무스의 혈청농도를 증가시킵니다. 효과/농도 측정에 따른 시들리루무스의 용량조절을 고려하여 이 약과 병용할 수 있 습니다. - 설포닐요소계：건강한 지원자에 대해 이 약과 병용투여 시 설포닐요소계 약물(예：클로르소프amid, 글리벤클라리드, 글리파지, 톨부타미드)의 혈청반감기 연장을 보였습니다. 이 약과 설포닐요소계 약물 병용투여기간 동안 혈당에 대한 빈번한 모니터링과 설포닐요소계 약물의 적절한 감량이 권장됩니다. - 테크놀리루무스：이 약은 정에서 CYP3A4에 의해 타크롤리루무스의 대사를 저해시킴으로서 경구 투여된 테크놀리루무스의 혈청농도를 5배까지 증가시킵니다. 테크놀리루무스를 정맥 투여했을 때 에는 유의한 약동학적 변화가 관찰되지 않았습다. 증가된 테크롤리루무스의 농도는 신독성과 연관이 있습니다. 테크놀리루무스의 농도에 따라 경구 투여되는 테크롤리루 무스의 용량을 시들리루무스 대사로 하여야 합니다. - 테오필린：위약 대조 상호작용 시험에서 이 약 200mg을 14일 동안 투여 시 테오필린의 평균혈청농도가 18% 감소하였습니다. 고용 량의 테오필린을 투여 받거나 테오필린 독성발생 위험이 증가된 환자들은 이 약을 투여 하는 동안 테오필린독성의 징후를 관찰해야 하며, 만약 독성 징후가 나타날 시에 치료방법은 적절히 수정되어야 합니다. - Vinca알칼로이드계 약물：연구된 바가 없으나, 이 약의 CYP3A4억제 기능성에 기인하여 이 약은 vinca 알칼로이드계 약물(예：빈도리신, 빈블라스틴)의 혈청농도 상승과 신독성을 일으킬 수 있습니다. - 비타민 A：이 약과 모든 trans-retinoic acid(비타민 A)의 산성형의 병용투여를 받는 환자를 포함하 는 다른 사례에 따르면 중추신경계(CNS)와 관련해 의도하지 않았던 이상반응으로서 기증 뇌종양이 나타났으며, 그것은 이 약의 치료 중단 후에 사라졌습다. 이 약의 병용이 중추신경계 관련 이상반응이 있음을 의심하십시오. - 지도바탄：이 약이 경구용 지도바탄의 청소율을 약 45% 감소시키기에 따라 지도바탄의 Cmax와 AUC 를 각각 84%, 74% 증가시켰습니다. 지도바탄의 반감기는 이 약과의 병용 후에 약 128%까지 연장됨다. 이 약과 지도바탄을 병용투여 받는 환자들은 지도바탄 관련 이상 반응 발생에 대해 모니터링되어야 합니다. 지도바탄의 감량이 고려될 수 있습니다. - 내인성스테로이드：이 약 1일 500mg 또는 여성의 내인성 스테로이드 농도에 영향 을 주지 않았습다. 1일 200-400mg 투여는 건강한 남성 지원자의 부신피질 자극 호르몬 자극반응이나 내인성 스테로이드 농도에 영향을 주지 않았습다. - 노르코나라 CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4 저해제：이 약의 경구용 제제(첫째날 400 mg 투여 후, 4일 동안 24시간 마다 200 mg 투여)와 경구용 피로코나졸(첫째날 12시간마다 400 mg 투여 후, 2.5일 동안 12시간마다 200 mg 투여)를 6명의 건강한 남성 피험자에게 병용투여 시 보리코나졸의Cmax와 AUC는 각각 평균치(±표준오차)는 57%(90% CI: 20%, 107%), 70%(90% CI: 40%, 128%) 증가했습니다. 이에 이어진 8명의 건강한 남성 피험자를 포함한 임상시험에서 보리코나졸과 플루코나졸의 투여량 감소 그리고/또는 투여빈도 감소는 이러한 작용을 얻게거나 감소시키지 못했습니다. 이 약과 보리코나졸의 병용투여는 어떠한 용량에서도 권장되지 않습니다. - 상호작용시험은 이 약의 경구제와 음식, 시메티딘, 제산제, 골수이식에 대한 전신방사선요법과의 병용 시 임상적으로 유의할만한 이 약의 흡수장애가 일어나지 않음을 보였습니다. - 처방의는 이 약과 상호작용시험이 수행되지 않은 다른 약물들에 대해서도 상호작용이 일어날 수 있음을 인지하여야 합니다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

임부：임신 첫 3개월(1sttrimester)에 플루코나졸 200mg 이하 용량 (단회 또는 반복투여)으로 치료받은 임신부 수백명의 자료에 의하면, 이 약으로 인해 태아에게 바람직 하지 않은 영향은 없었습니다. 복시나오이데스진균증에 대해 3개월 또는 그 이상의 기간 동안 고용량의 플루코나졸(1일 400-800mg)을 투여 받은 임신부의 경우, 영아에서 다발성 선천성 기형이 보고 되었습니다. 플루코나졸의 사용과 이러한 부작용 발생 시이의 상관관계는 명확하지 않습니다. 동물에서는 모체에 독성이 나타날 정도의 고용량에서부터 태자에 대한 부작용이 확인되었습니다. 5mg/kg 또는 10mg/kg의 용량은 태자에 영향을 끼치지 않았습다. 25mg/kg, 50mg/kg 및 그 이상의 용량에서 태자 의 해부학적인 변형(과일낭, 신우확장) 증가 및 골화 지연이 관찰되었습니다. 80mg/kg(사할리 권장용량의 약 20-60%) - 320mg/kg의 용량범위에서 컷트의 배자지사 (embryolethality)가 증가하였으나 파형증, 구개열, 비정상적인 두개내부면 골화를 포함한 태아의 기형이 있었습다. 이러한 영향들은 컷트에서는 에스트로겐 합성 억제 시 동일하게 나타나며, 임신, 기관발생, 분만 시는 에스트로겐 농도가 낮아짐으로 인한 이미 알려지 있는 결과 때문일 수 있습니다. 병발된 몇몇의 증례보고는 임신 첫 3개 월 (1sttrimester)의 모든 또는 대부분의 기간 동안 고용량의 플루코나졸(1일 400-800 mg)을 투여 받은 임신부의 영아에서 두드러지고 드문 형태의 출생기형(birth de-fects)이 나타남을 기술하고 있습니다. 이러한 영아에서 발견되는 특징은 다음을 포함합니다：납적머리증, 비정상적 얼굴, 비정상적 머리덜개뼈 발달, 구개열, 대두부 휨 (femoral bowing), 앞은 갈비뼈, 간백, 관절염증, 선천성 심장 질환

임부에 대한 이 약의 투여는 피해야 합니다.

수유부：이 약은 혈장과 비슷한 농도로 모유에서 발견되었습니다. 따라서 수유부에 있어 이 약의 투여하지 않습니다.

7. 소아에 대한 투여

생후 6개월 미만의 영아에 대한 이 약의 안전성, 유효성은 확립되지 않았습다. 그러나 일부 소수(생후 6개월까지의 29명)의 영아에서 이 약이 안전하게 사용되 었다는 자료가 있으므로, 이 약의 투여가 꼭 필요하다고 판단되는 경우에만 투여합니다.

8. 윤전과 기계 조작 능력에 미치는 영향

운전 및 기계 조작 시 때때로 험기증 및 발작이 일어날 수 있으므로 주의해야 합니다.

9. 과량투여시의 처치

- 이 약을 과량복용 시 환각, 편집적 행동이 나타났다는 보고가 있었습다.
- 과량투여 시 소화요법(밀요 시 지지요법 및 위세척)이 적합할 수 있습니다.
- 이 약은 대부분 소변으로 배설되므로 소변양을 증가시키면 이 약의 배설량이 증가할 것임다. 3시간동안 혈액투석을 하면 혈청농도가 거의 50%정도 감소됩니다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(약~30℃)보관

- ※ 의약품용 사용시하기 전에 본 설명서를 주의깊게 읽어주시기 바라며, 설명서는 반드시 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
※ 만일 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품을 구입하였을 때는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다. 자세한 내용은 자사로 문의하시길 바랍니다. (소 비자 상담실 02-6925-4064)
※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드렉(http://ezdrug.klda.go.kr) → “정보마당” → “의약품용 정보”를 참조하시기 바랍니다.
※ 설명서 (제작성일) 이후 변경된 내용은 회사 홈페이지(http://www.pharmaking.co.kr)에서 확인 하실 수 있습니다.

(제작성일)：2013. 07. 31