

아이월드 신비콜

엑스
과립

일반의약품
분류번호: 229

【원료약품 및 그 분량】 1회용량(2.5g)중

감초(KP).....	1.0g	마황(KP).....	2.0g
반하(KP).....	3.0g	복령(KP).....	2.5g
생강(생규).....	1.0g	시호(KP).....	1.0g
자소엽(KP).....	1.0g	진피(KP).....	1.5g
행인(KP).....	1.0g	후박(KP).....	1.5g
		이상 연조엑스로서 1.80g(건조물로서 0.75g)	

【성 성】 담갈색의 과립제

【효능 · 효과】 인후염, 기관지염, 기관지천식

【용법 · 용량】 만 15세 이상 성인 1일 2회, 1회 용량(2.5g)씩 식전(식사하기 전)에 복용 만 15세 미만은 복용하지 말 것.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
1) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
3) 병후의 쇠약기, 현저하게 체력이 쇠약해진 환자(이상반응이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 수 있다.)
4) 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토 등이 나타날 수 있다.)
5) 땀이 많이 나는 환자(땀 과다, 전신무력감 등이 나타날 수 있다.)
6) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.)
7) 지금까지 약에 의해 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
8) 부종(부기) 환자
9) 배뇨곤란이 있는 환자(질한 및 증상이 악화될 수 있다.)
10) 고혈압 환자(질한 및 증상이 악화될 수 있다.)
11) 심장에 또는 신장에(신장장애) 환자(질한 및 증상이 악화될 수 있다.)
12) 갑상선기능장애 환자(질한 및 증상이 악화될 수 있다.)
13) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
14) 당뇨병 환자(마황(에페드린 류)에 의해 글리코겐의 분해가 촉진되어 혈당이 상승할 수 있다.)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
(1) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토 등
(2) 피부 : 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등
(3) 자율신경계 : 불안, 땀 과다, 빠른맥, 소변을 자주 볼, 두근거림, 전신무력감, 정신흥분 등

- (4) 비뇨기계 : 배뇨장애
- (5) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)
- (6) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
- 2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
1) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
2) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프제 이노제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이노제(트리클로로메타이아지드)와 병용(함께 복용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.
3) 마황 또는 에페드린 함유제제, MAO 억제제, 갑상선제제(티록신, 리오치온), 카테콜아민제제(에피네프린, 이소프레날린), 크산틴계제제(테오필린, 디프로필린)와 병용시 불면, 땀 과다, 빠른맥, 소변을 자주 볼, 두근거림, 전신무력감, 정신흥분 등의 증상이 나타나기 쉬우므로 감량하는 등 신중히 복용할 것.
4) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
5) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 성약의 중복에 주의할 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것).
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
- 4) 사용기한을 넘긴 제품은 복용하지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 6포, 500g

【소비자상담실】 080)597-1020

문서개정일 : 20130802

- * 만약 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
* 이 첨부문서는 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.i-pharm.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
* 이 제품은 제제의 특성상 제조번호 별로 색상의 차이가 있을 수 있습니다.



(주)아이월드제약
인천광역시 남동구 함박외로 316(논현동)
www.i-pharm.kr

