

손·발톱 진균(곰팡이), 백선(무좀), 피부칸디다증, 어루러기

프틴 광범위 진균 치료제

(크림) (나프티핀염산염)

일반의약품

분류번호:02650

【원료약품 및 그 분량】 1g 중

- 유효성분 : 나프티핀염산염(USP) 10mg
- 첨가제(보조제) : 벤질알코올 1.1mg
- 기타 첨가제 : 부틸히드록시톨루엔, 세탄올, 소르비탄스테아레이트, 수산화나트륨, 스테아르산, 유동파라핀, 정제수, 폴리스orb에이트60, 프로필렌글리콜

【성상】 백색의 크림제

【효능·효과】

다음의 피부 진균(곰팡이)증

- 1) 백선 : 족부백선(무좀), 수부백선, 고부백선(대퇴부백선)(완선(사타구니백선)), 체부백선
- 2) 피부칸디다증
- 3) 어루러기
- 4) 조갑(손·발톱) 진균(곰팡이)증

【용법·용량】

1. 피부 진균(곰팡이)증 : 1일 1회(가능하면 취침시) 환부(질한 부위)를 깨끗이 닦고 완전히 건조시킨 후 환부(질한 부위) 및 그 주위의 피부에 얇게 바르고 부드럽게 문지른다.
2. 조갑(손·발톱) 진균(곰팡이)증 : 손·발톱을 짧게 깎고, 1일 1회(가능하면 취침시) 또는 필요에 따라 1일 2회(아침, 저녁) 얇게 바른다.
 - 재발 방지를 위해 모든 증상이 소실(없어진)된 후에도 약 2주간 더 사용한다.
 - 치료기간 이후에도 임상적인 증상이 개선되지 않으면 진단을 다시 해야 한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 이 약 및 이 약 성분에 과민증 또는 그 병력이 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여 할 것.
 - 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
3. 부작용(이상반응)
 - 드물게 적열감(화끈감), 찢린 상처, 건조감, 홍반(붉은 반점), 가려움, 국소자극이 나타날 수 있다.
4. 일반적주의
 - 1) 이 약 사용으로 인해 자극 또는 민감성이 나타나면 치료를 중지하고 적절한 요법을 실시한다.
 - 2) 수산화칼륨용액으로 직접적인 한미경적 검사 또는 적당한 배지에 배양함으로써 질병의 진단을 확인할 수 있다.
 - 3) 의사의 지시가 없는 한 밀봉용대법 또는 포장법을 사용하지 않는다.
 - 4) 이 약에 대한 반응이 나타나지 않으면 진균(곰팡이)학적 검사를 실시하여 다른 병원균에 의한 감염 여부를 확인 후 다른 항 진균(곰팡이)요법을 시행한다.
 - 5) 산성에서 칸디다균의 증식이 잘 되므로 칸디다증일 경우에는 산성비누를 사용하지 않는다.
5. 상호작용
다른 약물과의 상호작용에 대해 보고된 바 없으므로 다른 국소 적용 약물과 병용(함께 복용)하는 것은 권장되지 않는다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 랫트와 토끼를 대상으로 한 동물실험에서 사람에 대한 투여량의 150배 또는 그 이상의 용량을 경구투여(복용)한 경우에 이 약으로 인한 임신장애 또는 태자독성에 대한 뚜렷한 증거가 나타나지 않았다.
 - 2) 임부에 대한 적절한 임상 연구가 수행되지 않았으며 동물실험결과가 사람에게도 항상 똑같이 적용되는 것은 아니므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(우뚹)한다고 판단되는 경우에만 이 약을 투여한다.
 - 3) 이 약의 모유로의 이행 여부에 대해 알려진 바 없으나 많은 약물들이 모유로 배출되므로 수유부에 이 약 투여 시 특히 주의한다.
7. 소아에 대한 투여 : 소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않다.
8. 적용상의 주의
 - 1) 이 약은 외용으로만 적용한다.
 - 2) 급성염증 또는 노출된 상처 부위에는 적용하지 않는다.
 - 3) 눈, 코, 입 및 다른 점막에 닿지 않도록 주의하여 적용한다.
9. 저장상의 주의사항 : 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 30g/튜브

【사용기간】 제조일로부터 36개월

* 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 지나거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
* 이 약을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
* 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
* 부작용보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

첨부문서 개정 연월일 : 2017. 09. 13

【제조사】 태극제약(주)

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123

【제조외지자】 제이에스제약(주)

전남 장성군 황룡면 강변로 484-28

소비자상담전화 : 061)394-5530

PTC01-E01-02