

DASAN Pharmaceutical	
자재명	디스포지정·공용설명서
규격	190 X 290mm(양면)
인쇄도수	■1도(K100%)
작성(수정)일	2023.02.09

디스포지정 5/80밀리그람, 5/160밀리그람, 10/160밀리그람

(암로디핀베실산염 / 발사르탄)

Disforge Tab.(Amlodipine Besylate / Valsartan)

※ 의약품을 사용하시기 전에 **첨부분서를** 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.

[원료약품 및 그 분량] 이 약 1정 중 (디스포지정5/80밀리그람) ■유효성분: 암로디핀베실산염(EP) 6.94mg (암로디핀으로서 5mg) 발사르탄(USP) 80mg ■기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라아노란색(03662011), 클로이드성아산화규소, 크로스카멜로오스나트륨, 크로스포비돈	
(디스포지정5/160밀리그람) ■유효성분: 암로디핀베실산염(EP) 6.94mg (암로디핀으로서 5mg) 발사르탄(USP) 160mg ■기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라아노란색(036620011), 클로이드성아산화규소, 크로스카멜로오스나트륨, 크로스포비돈	
(디스포지정10/160밀리그람) ■유효성분: 암로디핀베실산염(EP) 13.87mg (암로디핀으로서 10mg) 발사르탄(USP) 160mg ■기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라아노란색(03662519), 클로이드성아산화규소, 크로스카멜로오스나트륨, 크로스포비돈	

[성성]
• 5/80밀리그람 - 어두운 노란색의 원형 필름코팅형 • 5/160밀리그람 - 어두운 노란색의 달걀형 필름코팅형 • 10/160밀리그람 - 밝은 노란색의 달걀형 필름코팅형

[효능·효과] 암로디핀 또는 발사르탄 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 본태성 고혈압

- [용법·용량]**
- 이 약의 권장용량은 1일 1회 1정으로, 식사와 관계없이 물과 함께 복용한다. 가능한 매일 같은 시간에 아침에 복용할 것이 권장된다. 이 약을 투여하기 전에 개개의 성별암로디핀 또는 발사르탄으로 용량을 조절할 것이 권장되나, 다음과 같이 개개의 성분에 대한 단독요법으로 혈압이 조절되지 않는 경우 이 약으로 바로 전환하는 것을 고려할 수 있다.
- 5/80밀리그람: 암로디핀 5밀리그람 또는 발사르탄 80밀리그람 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 환자에 투여한다.
 - 5/160밀리그람 : 암로디핀 5밀리그람 또는 발사르탄 160밀리그람 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 환자에 투여한다.
 - 10/160밀리그람 : 암로디핀 10밀리그람 또는 발사르탄 160밀리그람 단독요법 또는 5/160밀리그람으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 환자에 투여한다.
- 발사르탄과 암로디핀을 병용으로 복용하고 있는 환자인 경우, 복용의 편의함을 위하여 이 약7개개의 주성분 함량이 동일한 복합제)으로 전환할 수 있다.
- 신장에 환자**: 경증 및 중증도의 신장애 환자(creatinine clearance 10mL/min 이하)인 경우 용량조정이 필요치 않으나, 중증의 신장애 환자(creatinine clearance 10mL/min 미만) 및 투석환자는 이 약을 투여하지 않는다. 중증도 신장애 환자인 경우, 갈륨 수치 및 크레아티닌에 대한 모니터링이 권장된다.
 - 간장애 환자**: 경도 및 중증도 간장애 환자의 경우 발사르탄 1일 투여량은 80mg을 초과해서는 안 된다. 중증의 간장애, 담즙성 간결핵, 간담계 질환에: 담즙 부비성 질환에게 이 약을 투여하지 않는다.
 - 65세 이상의 고령자**: 용량 증감시 주의해야 한다.
 - 소아**: 만 18세 미만의 소아환자에 대한 안전성·유효성이 확립되어 있지 않아 이 약의 투여가 권장되지 않는다.

[사용상의 주의사항]
1. 경고 임산 2, 37인 임부에 레닌-안지오텐신 체계에 직접 작용하는 약물 투여시 태아 및 신생아에게 손상 및 사망까지 유발할 수 있다. 따라서 임신 및 임신으로 확인될 경우 즉시 이 약의 투여를 중단해야 한다. (7, 임부 및 수유부에 대한 투여 항 참조)

- 다음 환자에게는 투여하지 말 것
 - 이 약의 주성분 및 디하이드피리딘계 유도체에 과민증이 있는 환자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
 - 중증의 신장애환자(크레아티닌 청소율 10mL/min 미만)사용경험이 없음
 - 중증의 간장애, 담관성 간경화, 담도폐색· 담낭염·부비성 환자
 - 당뇨병이나 중증도~중증의 신장애 환자(사구체여과율 60mL/min/1.73m²에서 일리스카친 함유투여제와의 병용)은 신장성 혈관부종 환자이거나, ACE 억제제 혹은 안지오텐신 II 수용체 길항제 치료시 혈관부종의 병력이 있는 환자
 - 렌탈고알도스테론증 환자(원발고알도스테론증 환자는 레닌-안지오텐신-알도스테론계가 활성화되지 않기 때문에 이 약을 투여하지 않는다.)
 - 중증의 대동맥판협착증 환자
 - 속 효과
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 디스포지정 및/또는 제약 부족 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 이 약의 투여를 시작할 때 디하이드피리딘계 유도체에 과민증이 있는 환자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
 - 중증의 신장애환자(크레아티닌 청소율 10mL/min 미만)사용경험이 없음
 - 중증의 간장애, 담관성 간경화, 담도폐색· 담낭염·부비성 환자
 - 당뇨병이나 중증도~중증의 신장애 환자(사구체여과율 60mL/min/1.73m²에서 일리스카친 함유투여제와의 병용)은 신장성 혈관부종 환자이거나, ACE 억제제 혹은 안지오텐신 II 수용체 길항제 치료시 혈관부종의 병력이 있는 환자
 - 렌탈고알도스테론증 환자(원발고알도스테론증 환자는 레닌-안지오텐신-알도스테론계가 활성화되지 않기 때문에 이 약을 투여하지 않는다.)
 - 중증의 대동맥판협착증 환자
 - 속 효과
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 디스포지정 및/또는 제약 부족 환자

- 위와 비교 임상시험에서 이 약을 투여 받은 군은 고혈압 환자 중 0.4%에서 과도한 저혈압이 관찰되었다. 안지오텐신 수용체 길항제 (ARB) 길항제를 복용하고 있는 레닌-안지오텐신 체계가 활성화된 환자에, 고령환의 이노제를 복용하고 있는 제약 및/또는 나트륨 부족 환자에서, 중후성 저혈압이 발생할 수 있다. 이 약 투여 전 이러한 상태를 보정해야 하며 투여 시작 시 명백한 의학적 관찰을 권장한다. 이 약 복용 시 저혈압이 발생하면, 환자를 빈도이 높이고 필요한 상리시염수를 생략 즉시로 섭취 주입한다. 혈압이 안정된 후에 치료를 계속할 수 있다.
- 2) 고칼륨혈증 환자
- 이 약과 칼륨보조제, 칼륨보존이노제, 칼륨을 함유한 식염 등을 칼륨 수치를 상승시킬 수 있는 다른 약물(예. 헤파린과 병용 시에는 주의하여야 하며, 빈번히 칼륨 수치를 모니터링 해야 한다.
- 3) 신장염착증 환자
- 이 약은 발사르탄에 의해 양측성 또는 편측성 신장염 협착증이 있는 환자 또는 협착증이 알려진 단신증 환자에서 혈중 요소 및 혈청 크레아티닌(creatinine)을 증가시킬 수 있으므로 안전성 면에서 모니터링이 권장된다.
- 4) 신장 이상환자
- 최근 신장 이상을 받은 환자에서 이 약의 안전한 사용을 입증할 수 있는 자료가 없다.
- 5) 혈관부종
- 발사르탄을 투여받은 환자에서 기드폐색 및/또는 얼굴, 입술 및 혀의 부기를 일으키는 혈관부종(후두와 성문의 부기 포함)이 보고되었다. 이러한 환자 중 일부는 ACE저해제와 같은 다른 약을 투여로 인해 혈관부종이 유발된 경향이 있었다. 이 약 투여시 혈관부종이 나타나면 투여를 즉시 중단하여야 하며, 지루해해서는 안된다.
- 6) 심부전 또는 심근경색 후 환자
- 일반적으로 암로디핀과 같은 칼슘제제 길항제를 중증의 울혈성 심부전환자(NTA 분류 II 또는 IV 단계)에게 사용시 주의가 필요하다. NHA 분류 II 또는 IV 단계의 비파혈성 환인의 심부전 환자를 대상으로 한 위약-대조 시험 (PARADE-2)에서, 암로디핀은 위약에 비해 심부전의 위험을 완화하 감소시켰으며 불구하고 폐부종 증가와 관련이 있는 것으로 보고되었다. 신기능이 레닌-안지오텐신-알도스테론(renin-angiotensin-aldosterone) 체계의 활성에 의존하는 환자에, 중증의 심부전에게 안지오텐신-전환효소 저해제(ACE 저해제)또는 안지오텐신 수용체 길항제의 투여는 소변간소증 및/또는 진행성 고칼슘혈증 및 (드물게) 급성 심부전 및/또는 사망과 관련이 있다. 심부전 또는 심근경색 발생 후 환자에 대한 평가에는 신기능 평가를 항상 포함해야 한다.
- 7) 급성심근경색환자
- 갑상체년치단제(암로디핀)의 투여를 시작하거나 용량을 증량한 환자(특히, 중증의 폐색성 관상동맥질환)에서 협심증 또는 급성심근경색의 발현도, 유효기간도, 유효기간도 또는 중증도의 증가가 드물게 보고 되었다.
- 8) 대동맥판막 및 승모판막협착증, 폐색성 비대칭성근육병증 환자
- 다른 모든 혈관이완제와 마찬가지로, 대동맥 또는 승모판 막폐색증 또는 폐색성 비대칭성근육병증 환자에서 암로디핀 투여시 특별한 주의가 필요하다.

- 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)의 이중차단 : 발사르탄을 포함한 안지오텐신수용체 차단제(ARB), ACE 저해제 또는 알리스카틴 등 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)에 영향을 미치는 다른 약제와의 병용은 권장되지 않는다.
- 경증·중증도 간장애 환자 (경증 및 중증도의 간장애 환자에서 이 약 성분 중 발사르탄의 1일 투여량은 80mg을 초과하지 않는 것이 바람직하다.)
- 이상반응
 - 이 약에 대한 안전성은 5,175명의 환자가 참여하고 그 중 2,613명이 암로디핀과 발사르탄을 병용 투여 받은 57개의 대조임상시험으로부터 평가되었다.
 - 이상반응은 발현빈도에 따라, 매우 흔하게(≥ 1/10), 흔하게(≥ 1/100, 1/10), 흔하지 않게(≥ 1/1,000, 1/100), 드물게(≥ 1/10,000, 1/1,000), 단독보고를 포함하여 매우 드물게(1/10,000) 로 정리하였다. 같은 빈도 그룹에서는 이상반응의 중대함 (Seriousness)이 감소하는 순서로 정리되었다.
 - (표) 발현된 이상반응

	발현부위	발현빈도	발현증상
감염	감염(infections and infelations)	흔하게	비인두염, 인플루엔자
	면역계 이상	드물게	과민성
	눈의 이상	드물게	사각시증
	정신계 이상	드물게	불안
신경계 이상	흔하게	드물	
	흔하지 않게	어지러움(dizziness), 졸음, 체위성 어지러움, 감각이상	
	흔하지 않게	한기(verigo)	
	드물게	가을림	
심장이상	흔하지 않게	빈맥, 가슴 두근거림	
	드물게	심신	
	흔하지 않게	기립성 저혈압	
	드물게	저혈압	
호흡기계, 흉부 및 중격동 이상	흔하지 않음	가침, 인두 및 후두 통증	
	흔하지 않게	천사, 구역, 복통, 변비, 구갈	
	흔하지 않게	발진(rash), 홍반	
	드물게	다한증, 발진(lexanthema), 가려움	
근골격계 및 결합조직 이상	흔하지 않게	관절부종, 요통, 관절염	
	드물게	근육연축, 무기력	
	드물게	빈뇨증, 다뇨증	
	드물게	발기부전	
전신 이상 및 투여부위 반응	흔하게	부종, 혈압부종, 얼굴부종, 말초부종, 파관, 홍조, 무력증, 안면홍조	

- 병용에 대한 추가정보
 - 아령 증, 약도 또는 위약 대조 임상시험에서, 암로디핀 단독투여군(9%)에 비해 병용 투여군(5.8%)에서 말초 부종의 발생빈도가 통계적으로 낮게 나타났다.
- 각 유효성분에 대한 추가 정보
 - 비록 이 약을 투여한 임상시험 및 사후추경험에서 관찰되지 않았더라도, 이전에 각각의 성분에 대하여 보고된 이상반응이 나타날 수 있다.
 - 발사르탄
 - (표) 발사르탄 단독투여시 발생한 이상반응반응

	발현부위	발현빈도	발현증상
혈액 및 림프계	알려지지 않음		헤모글로빈 감소 헤마토크릿 감소 중증구 감소 혈소판 감소
	면역계	알려지지 않음	혈형병용 포함할 과민성
	대사 및 영양	알려지지 않음	혈청 칼륨 증가
	혈관	알려지지 않음	혈관염
간 및 담도	알려지지 않음		간기능 수지(혈청 빌리루빈 포함) 상승
	피부 및 피하조직	알려지지 않음	혈관부종
	근골격계 및 연결조직	알려지지 않음	근육통
	신장 및 비뇨기계	알려지지 않음	사보전 및 사소상 혈청 크레아티닌 상승

약물과의 인과관계와 상관없이 임상시험 동안에 다음과 같은 증상이 보고되었다: 불면, 설욕감퇴, 인두염, 비염, 부비염염, 상기도감염, 비리소스 감염

② 암로디핀

약물과의 인과관계와 상관없이 암로디핀 임상시험에서 보고된 이상반응은 (표3)과 같다.

(표3) 암로디핀 단독투여시 발생한 이상반응은

	발현부위	발현빈도	발현증상
혈액 및 림프계	알려지지 않음		헤모글로빈 감소 헤마토크릿 감소 중증구 감소 혈소판 감소
	면역계	알려지지 않음	혈형병용 포함할 과민성
	대사 및 영양	알려지지 않음	혈청 칼륨 증가
	면역계 이상	매우 드물게	알라지 반응
대사 및 영양 이상	매우 드물게	고혈당	
	정신계 이상	흔하지 않게	불면증, 감장변화
	신경계 이상	흔하지 않게	말림, 감각저하, 미각이상
	매우 드물게	말초 신장애, 과다근육긴장증	
심장 이상	매우 드물게	부정맥, 서맥, 심방세동, 심실성 빈맥, 심근경색	
	흔하지 않게	관상관관, 비명	
	흔하지 않게	구토, 소화불량	
	매우 드물게	척장염, 위염, 잇몸증식	
피부 및 피하조직 이상	매우 드물게	간염, 황달	
	흔하지 않게	말초증, 자색반증, 피부 말색, 광과민반응	
	매우 드물게	혈관부종, 두드러기, 다형홍반, 스티븐 존슨 증후군	
	매우 드물게	관극통	
근골격 및 연조직 이상	흔하지 않게	폐노장애, 야근증	
	흔하지 않게	여성유방증	
	흔하지 않게	통증, 견관절, 가슴통증	
	흔하지 않게	체중감소, 체중 증가	
전신 이상 및 투여부위	매우 드물게	관소소 증가(대부분 남용증제와 관련)	

- 국내 사후조사 결과
 - 국내에서 제1상사를 위하여 8년 동안 859명을 대상으로 실시한 사용성적조사 결과, 유효성에 발현되는 인과관계와 상관없이 15.2%(44명, 56건)로 보고되었다.

- 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 약물유해반응 발현율은 1.75%(16명, 19건)이었으며, 두통 0.47%(4명, 4건), 어지러움 0.35%(3명, 3건), 가려움 0.36%(3명, 3건), 말초부종 0.23%(2명, 2건), 저혈압 0.23%(2명, 2건), 부종, 가슴통증, 등통, 기침, 야뇨증 각 12%씩 나타났다.
- 이 약과의 인과관계에 상관없이 증해진 유효사례는 보고되지 않았다. 예상하지 못한 유효사례로 가슴불쾌 0.23%(2명, 2건), 등통, 복부불편감, 역류성식도염, 목통증, 고콜레스테롤혈증, 저혈당, 야뇨증이 각 12%씩 중 92건이 보고되었다. 예상하지 못한 약물유해반응은 통증 1건, 야뇨증 1건으로 중 2건이 나타났다.
- 이 약에 대한 국내 제1상 유효사례 및 자발적 부작용 보고자료를 국내 사관 하거나 모든 의약품들 대상으로 보고된 유효사례 보고자료와 제1상 종료시험에서 통합한(한) 결과, 다른 모든 의약품에서 보고된 유효사례에 비해 이 약에서 통계적으로 유의하게 많이 보고된 유효사례 중 새로 확인된 것들은 다음과 같다. 다만, 이 결과가 해당성분과 다음의 유효사례간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
 - 전신 이상 : 가슴통증, 체중증가
 - 근골격계 : 관절통, 골격통, 허리근육통
 - 구강 : 잇몸과다형성
 - 위장관계 : 위염
 - 정신계 이상 : 신경과민
 - 신경계 : 감각저하
 - 피부 및 피하조직 이상 : 스티븐스-존슨증후군

- 일반적 주의
 - 운전 및 기계조작시 주의
 - 운전 및 기계 사용에 미치는 영향에 대한 임상시험은 수행되지 않았다. 운전 및 기계 사용시 간헐적으로 어지러움 및 피로가 나타날 수 있음을 고려해야 한다. 다른 항고혈압제와 마찬가지로 운전이나 기계류를 조작할 때는 특별히 주의 한다.
 - 발사르탄
 - 이 약의 투여에 의해 투여 후에 일시적인 급격한 혈압감하심신 및 의식 소실 등을 동반할 일일수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 또한 특히 다음 환자에서는 사용량에서 투여를 시작하고 증량하는 경우에는 환자의 상태를 충분히 관찰하면서 서서히 한다.
 - ① 혈역 투석중인 환자
 - ② 이노제를 투여중인 환자(특히 심한 나트륨 부족 혹은 체액 부족 환자에서는 드물게 중후성 저혈압이 발생할 수 있으므로 주의한다.)
 - ③ 약격한 염분 제한 중인 환자
 - 고령환의 이노제를 복용하여 심한 나트륨 고갈이나 체액 고갈이 있는 환자의 경우 이 약 투여 초기에 드물게 저혈압 현상이 나타날 수 있다. 이 약 투여 전 이러한 나트륨 및 체액의 고갈은 이노제 용량을 감소하는 등의 방법으로 보정해야 한다. 저혈압이 발생한 경우 환자를 빈도한 자세로 높이고 필요하면 생리식염 주사액을 점적주입한다. 혈압이 안정된 후 이노제투여를 계속한다.
 - 신동맥 협착증 환자: 2차 편측성 신동맥협착을 수반하는 신혈관성 고혈압 환자 12명에 대한 이 약의 단기투여 시 신장의 혈역 동력학, 혈청 크레아티닌, BUN의 유익성 있는 변화는 유도되지 않았다. 그러나 레닌-안지오텐신-알도스테론계에 영향을 미치는 다른 약물들 양측성 또는 편측성 신동맥 협착증이 있는 환자에 투여한 경우 혈중 요소 및 혈청 크레아티닌을 증가시킬 수 있으므로 안전성 면에서 모니터링이 권장된다. 양측성 또는 편측성 신동맥 협착 환자에서는 신혈관류량의 감소와 사구체 여과율의 저하에 의해 급속하게 신기능을 악화시킬 우려가 있으므로, 특히 부득이하다고 판단되는 경우를 제외하고는 투여를 피한다.
 - 경증 및 중증도의 간장애 환자에 대한 이 약의 1일 투여량은 80 mg을 초과하지 않는 것이 바람직하다. 이 약 대부분 미분해체로서 담즙으로 배설되며 담도폐색 환자에게는 낮은 제거율을 나타내었으므로 이러한 환자에서는 사용하지 않는다. 경증에서 중증도 간장애 환자에게 이 약 투여시 혈장 농도가 건강한 성인에 비해 약 2배 상승하는 것으로 보고된 바 있다.
 - 이 약을 투여받은 심부전 또는 심근경색 발생 후의 환자는 주로 혈압이 감소하지만 자속적인 저혈압 증세 때문에 치료를 중단할 필요는 없다. 심부전 환자 또는 심근경색이 발생한 후 환자의 치료 개시 시 주의해야 한다. 레닌-안지오텐신-알도스테론계 제제 것과 민감한 환자에서 신기능 변화가 예상된다. 신기능이 레닌-안지오텐신-알도스테론계의 활성에 의존하는 중증의 심부전 환자에게 ACE억제제와 안지오텐신 II수용체 길항제로 치료하는 것은 소변간소증 및/또는 진행성 고칼슘혈증 및 (드물게) 급성 심부전 및/또는 사망과 관련 있다. 유사한 결과들이 이 약에서도 보고된 적 있다. 심부전 또는 심근경색 발생 후 환자에 대한 평가에는 신기능 평가를 항상 포함해야 한다. 심부전 환자에서 ACE억제제, 베타차단제 그리고 발사르탄의 중요요법은 권장되지 않는다. 베타차단제와 ACE억제제를 동시 투여하면 심부전으로 인한 이환율과 사망률이 증가하기 때문이다.
 - 몇몇 심부전 환자에서 BUN, 크레아티닌 및 칼륨 수치의 증가가 관찰되었다. 이러한 현상은 주로 경미하고 일시적이며, 기존에 신손상을 지니고 있던 환자들에서 나타날 가능성이 높다. 이 약 및/또는 이노제의 용량 감소 및 투약 증단을 고려해야 한다.
 - 고칼륨혈증 환자에서는 고칼륨혈증을 악화시킬 우려가 있으므로 치료 불가피하다고 판단되는 경우를 제외하고 투여를 피한다. 또한 신장 기능장애, 당뇨병 등에 의해 혈청 칼륨치가 높아지기 쉬운 환자에서는 고칼륨혈증을 발전시킬 수 있으므로 혈청 칼륨치를 주의한다.
 - 최근 신장기능을 실시한 환자에 대해서는 사용경험이 없다.

- 암로디핀
 - 심부전환자에 대한 투여: 하혈성 병인이 없는 NYHA II V등급의 심부전환자에 대한암로디핀의 장기단, 위약대시시험(PARADE-2)에서 암로디핀은 위약과 비교시 심부전의 악화율을 유의적인 차이가 없음에도 불구하고 폐부종 보고의 증가와 면적이 있었다.
 - 271명은 손상환자에 대한 투여: 모든 약물들 anagrelon과 마찬가지로 암로디핀의 반감기는 271명부전환자에서 길어졌으며, 이들 환자에 대한 권장용량은 확립되지 않았다. 그러므로, 이런 환자들은 주의하여야 투여한다.
 - 혈당증도 반감기가 길어 투여를 중지한 후에도 완전한 혈당강하작용이 나타나므로, 투여 중지후 다른 혈당강하제를 투여하는 경우에는 용량 및 투여간격에 주의하고 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여한다.
 - 호파발현이 천천히 나타나므로 응급 치료를 요하는 불안정형혈당증에는 효과를 기대할 수 없다.

- 상호작용
 - 발사르탄
 - 안지오텐신 수용체 차단제, ACE 저해제 또는 알리스카틴의 병용투여에 의한 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)의 이중차단은 이러한 약물들 단독요법과 비교시 저혈압, 실신, 고칼륨혈증 및 신기능의 비파괴성 심부전 포함) 위험을 증가시키는 것과 관련이 있다. 이 약과 RAAS에 작용하는 다른 약물들 병용투여하는 환자의 경우, 혈압, 신기능 및 전해질을 면밀히 모니터링해야 한다. 당뇨병이나 중증도~중증의 신장애 환자(사구체여과율 60 mL/min/1.73m²에)게 이 약과 알리스카틴 함유투여제를 병용투여하지 않는다.
 - 칼륨, 칼륨 보조제, 칼륨보존 이노제, 칼륨을 함유한 식염물들 들 또는 칼륨 수치를 상승시킬 수 있는 다른 약물(예. 헤파린과 병용 시에는 주의하여야 하며, 빈번히 칼륨 수치를 모니터링 해야 한다.
 - 비스테로이드성 소염제(NSADs): 안지오텐신 II 수용체 길항제에 NSADs에, 항응고요법으로 아스피린, COX-2 저해제와 동시에 투여되었을 때 고혈압합 효과 감소할 수 있다. 특히 고령 환자, 체액이 부족한 환자(이노제 투여환자 포함, 또는 신장기능이 저하되어 있는 환자의 경우 신장기능 악화의 위험성을 증가시킬 수 있다. 그러므로 NSADs를 투여하고 있는 환자에게 발사르탄 투여를 시작하거나 투여 방법을 변경할 때에는 신장기능의 모니터링이 권장된다.
 - 전달제(transporters): 사람의 간 조직을 가지고 한 in vitro 연구 결과에서 발사르탄이 간 흡수 전달체 OATP1B3과 간 유출 전달체 MRP2의 기질을 보여 주었다. 흡수-전달제 저해제(리파라신, 사이클로스포린) 또는 유출 전달제 억제제(리토비라비)와의 병용투여는 발사르탄의 전신 노출을 증가시킬 수 있다.
 - 발사르탄 단독투여 시, 다음의 약물과 임상적으로 유의한 약물 상호작용이 관찰되지 않았다: 시메티딘, 와파린, 푸로세미드, 디곡신, 아미레ulton, 인도메타신, 하드로로로르티아지드, 암로디핀, 글리베클라미드와의 상호작용에 대한 임상시험이 있었다.

- 암로디핀
 - 심사르탄: 암로디핀 10mg과 심바사르탄 80mg의 다화용성 병용투여는 심바사르탄 단독투여시와 비교하여 심바사르탄의 노출을 77%증가 증가시켰다. 암로디핀을 투여받은 환자에 심바사르탄의 1일 최대 투여용량은 20mg이다.
 - CYP3A4 저해제: 고령자에서 암로디핀 5mg과 딜티아제 1일 160mg을 복합투여한 경우에 암로디핀의 전신노출이 57%까지 증가하였다. 강력한 CYP3A4 저해제(예. 케토코나졸, 이트라코나졸, 리토나비어)의 경우 암로디핀의 혈중 농도를 딜티아제 보다 더 많이 증가시킬 수 있으므로 암로디핀은 CYP3A4저해제의 병용투여시 주의하여야 투여한다.
 - CYP3A4 유도제: CYP3A4 유도제(예. 리팜핀, 세인트 존스 워터의)의 병용투여는 암로디핀의 혈청농도를 반감시킬 수 있다. 그러므로 특히 강력한 CYP3A4 유도제와 병용투여하는 기간 및 그 이후에 혈압을 모니터링하고 용량 조정을 고려해야 한다.
 - 기타: 암로디핀 단독투여시, 딜티아제과 이노제, 알파-차단제, 베타-차단제, 안지오텐신 전환 효소 저해제 (Angiotensin converting enzyme inhibitor), 작용시간이 긴 질산염제제, 니트로글리세린, 설파형, 디곡신, 와파린, 아트로프사틴, 실데나필, 일리무비/미그네스 (제네라), 시메티딘, 비스테로이드성 소염제, 항생제, 경구 혈당강하제, 해면물약물들, 사이클로스포린과 병용시 안전하였다.
 - 지용주사: 20명의 건강한 자원자에 240 mL의 자용주사의 암로디핀 10mg의 단일 경구투여시 암로디핀의 약동학에 유의적인 영향이 없었다.

- 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 안지오텐신 II 길항제의 작용기간 때문에 태아에 대한 위험을 배제 할 수 없다. 안지오텐신 전환효소 저해제(레닌-안지오텐신-알로스테론 체계(RAAS)에 작용하는 특수한 약물군을 임신 271 및 371에 복용한 임부에게서 발달중인 태아에 대한 손상과 사망이 보고된 바 있다. 그리고 임신 171에 ACE 저해제의 사용은 태아 기형의 잠재적 위험성과 관련이 있다. 발사르탄을 우발적으로 복용한 임부에서 자태유신, 양수중독증, 신생아 신기능이상(이 보고된 바 있다. RAAS에 직접 작용하는 다른 약물과 같이, 이 약도 임신 중 또는 임신을 할 계획이 있는 경우에 사용해서는 안 된다. 의사는 임신할 가능성이 있는 여성에게 RAAS에 작용하는 약물들 처방할 때에 임신 중 이러한 약물들 잠재적 위험성에 대해 설명해주어야 한다. 이 약 치료 중 임신이 확인되면, 가능한 빨리 이 약을 중단해야 한다.
 - 사람에서 발사르탄 및/또는 암로디핀의 유증 분비 여부는 알려지지 않았으나, 쥐에서는 발사르탄이 유즙으로 분비되었다. 따라서 수유중인 여성이 이 약을 사용하는 것은 권장되지 않는다.
 - 이 약 및 각각의 인과관계에서 생식능에 대한 임상연구는 없었다. 이 약에 대한 생식능에 대한 비임상자료는 없지만, 발사르탄 및 암로디핀 각각의 성분으로 실시한 비임상시험에서 생식능에 대한 영향을 나타내지 않았다.

- 소아에 대한 투여
 - 이 약은 1만세 미만 환자에서의 안전성 및 유효성에 대한 자료가 충분치 않으므로, 투여를 권장하지 않는다.
- 고령자에 대한 투여
 - 고령자에서 유사한 용량을 사용하였을 때 이 약의 두 성분에 대하여 모두 우수한 내약성을 나타내었으므로 정상 용량을 권장한다.

- 임상검사이처의 영향
 - 발사르탄/암로디핀을 투여 받은 고혈압 환자 중 검사수치가 기저치에서 명백하게 변한 환자는 매우 적었다. 암로디핀/ 발사르탄 병용군(5.5%) 및 발사르탄 단독투여군(5.6%)에서는 위약투여군(4.5%) 보다 높은 혈중요소질소(BUN)을 나타냈다.
 - 발사르탄 투여시 때때로 간기능 검사치의 상승이 보고되었으나 이 약을 투여하는 본태성 고혈압 환자에 대해 특별한 임상검사이처의 모니터링이 필요한 정도는 아니다.
- 과량투여시의 처치
 - 이 약을 과량 복용한 경험은 없다. 발사르탄 과량 투여 시 주요한 증상으로 어지러움을 동반한 저혈압이 나타날 수 있다. 암로디핀 과량 투여 시에는 말초혈관을 과도하게 확장시켜 반사성반력을 일으킬 수 있다. 전신성 저혈압이 지속되어 사망에 이르는 쇼크까지도 일어난 사례가 보고된 바 있다.
 - 이 약 과량투여로 인한 임상적으로 유의한 저혈압이 나타나면, 삼가 및 호흡 기능을 자주 모니터링하고, 사자를 높게 유지하며 체액의 순환 체역량 및 노 배출량을 유심하 관찰하는 등 능동적으로 심할한 요법을 행해야 한다. 혈관수축제 사용이 급기가 아니라면 혈관긴장도 및 혈압을 회복시키는 데 도움이 될 수 있다. 정맥 클루르산 칼슘은 칼슘 채널 차단을 회복시키는 데 도움이 될 수 있다. 발사르탄과 암로디핀은 모두 혈액투석으로 제거되지는 않는다. 이 약의 과량복용 직후에는 구토를 유도하거나 위세척을 하는 것을 고려할 수 있다. 건강한 자원자에서 암로디핀 복용 후 즉시사-2시간 시점에서 약작용을 투여했을 때, 암로디핀 흡수를 유의적으로 감소시켰다.
- 약물동태상성형 정보
 - 사람의 디스포지정10/160mg(주)다산제약과 대조약 엑스포지정10/160mg(주)다산제약한국노바티스(주)를 2×2 교차시험으로 각 1명씩 건강한 성인에게 공복 시 단일 경구투여하여 42명의 혈중 암로디핀 및 발사르탄을 측정된 결과, 비교평가항목치(AUC₀₋₂₄, C_{max})를 로그변환하여 통계처리하였을 때, 평균치 차의 90%신뢰구간이 log 0.89에서 log 1.25 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다. (암로디핀)

구분		비교평가항목		참고평가항목	
		AUC _{0-24hr} (ng · hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
대조약	엑스포지정10/160밀리그램 (한국노바티스(주))	192.7±41.3	4,089±0.662	6.00 (5.00~8.00)	42.20±8.53
시험약	디스포지정10/160mg (주)다산제약)	187.2±41.9	4,016±0.726	6.00 (5.00~10.00)	43.38±12.01
90% 신뢰구간* (기준: log 0.8 ~ log 1.25)		log 0.9292 ~ 1.0097	log 0.9522 ~ 1.0104	—	—