



한국다케다제약주식회사

일반의약품
수입완제품



화이트벤[®] 멘톨나잘스프레이 0.1%

자일로메타졸린염산염

화이트벤 멘톨나잘스프레이 0.1%(자일로메타졸린염산염)는 코감기(급성비염), 알레르기성 비염 또는 축농증(부비동염)으로 인한 코막힘, 콧물, 재채기 및 머리무거움 증상을 완화시켜주는 무방부제의 코에 뿌리는 스프레이입니다. 상쾌한 멘톨(박하)향의 스프레이를 만나보세요.

원료약품 및 그 분량 이 약 1mL중
자일로메타졸린염산염(EP) 1mg

성상

일정량씩 분무되는 용기에 든 결정형이 없는 박하향의 무색 내지 거의 무색의 액

효능·효과

코감기(급성비염(코염)), 알레르기성 비염(코염) 또는 부비동염(축농증)에 의한 다음 증상의 완화 :
코막힘, 콧물, 재채기, 머리무거움



용법·용량

7세 이상의 소아 또는 성인에게 다음과 같이 적용하며 1일 3회를 초과하지 마세요.
1일 1~3회(매 8~10시간 마다), 1회 1번 각 비강(코안)에 분무하세요.

사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 마세요.

- 1) 만 7세 미만의 유아
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 3) MAO 억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하세요.

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 2) 지금까지의 약(비염(코염)용 분무제 포함)에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 부종(부기), 자극감, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 고혈압, 심장질환, 당뇨병, 갑상선질환, 녹내장 환자
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 5) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 6) 다음과 같은 기침이 있는 사람 : 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하시고, 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하세요.

- 1) 이 약의 사용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 : 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 부종(부기), 자극감, 가려움
- 2) 3일간 사용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

4. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키세요.
- 2) 이 약은 과도하게 사용하면 오히려 코막힘을 일으킬 수 있으므로 과도하게 사용하지 마세요.
- 3) 이 약은 비염(코염)용 분무제로만 사용하고, 눈과 귀에는 사용하지 마세요.
- 4) 오염을 방지하기 위해 가능한 공동으로 사용하지 마세요.
- 5) 7일 이상 계속 사용하지 마세요.
- 6) 사용 시에는 음주하지 마세요.
- 7) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 사용하세요.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하세요.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하세요.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마세요.

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

10 mL

올바른 사용법

1. 분무 전 코를 풀어 코 속을 깨끗하게 하면 좋습니다.
2. 보호캡을 열고 그림대로 엄지로 약병의 바닥부분을 지탱하고 검지와 중지로 약병 위를 잡아 수직으로 세웁니다.
3. 1~2 차례 눌러 약액이 열린 안개처럼 분무되는지 확인합니다.



4. 머리를 약간 앞으로 내밀고, 손가락으로 한 쪽 코를 막고 반대편 콧구멍에 스프레이 노즐을 넣습니다.
5. 코로 가볍게 숨을 들이마시면서, 동시에 스프레이를 힘있게 1차례 눌러 분무합니다.
6. 반대편 코에도 위의 과정을 반복합니다.



제조회사

Takeda Pharma A/S
Dybendal Alle 10, DK-2630 Taastrup,
Denmark

제조사

Takeda GmbH
Robert-Bosch-Str.8, 78224 Singen,
Germany

수입판매자

한국다케다제약주식회사
서울시 강남구 테헤란로 98길 8,
12층(대치동)

- 필요한 경우, 스프레이 노즐을 미온수로 헹궈줍니다. • 무방부제 (Preservative Free)
- 스프레이를 약병에서 분리하지 마십시오.
- 이 약품 1병(10mL)에는 약 70회 분무 가능한 약액이 들어 있습니다.
- 1회 분무량에는 자일로메타졸린염산염(Xylometazoline hydrochloride) 140µg이 들어있습니다.

• 이 약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 유통과정 중 잘못으로 사용기한이 경과되었거나 제품이 변질, 변패, 오염 또는 손상된 경우 구입한 약국을 통하여 교환 또는 환불 받으실 수 있습니다.

• 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하시고, 기타 제품관련 문의 사항은 당사 소비자상담실로 문의하여 주시기 바랍니다. (제품문의 전화 080-553-3300)

• 의약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.

• 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 알려거나 당사 소비자 상담실로 문의하여 주시기 바랍니다.(080-553-3300)

• 이 첨부문서 작성일자(2014년 12월 09일)이후 변경된 내용은 한국다케다제약 홈페이지 (www.takeda.co.kr) 또는 식품의약품안전처 온라인의약도서관(http://drug.mfds.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

www.whituben.co.kr





한국다케다제약주식회사

일반의약품

수입완제품



화이트벤[®] 나잘스프레이 0.1%

자일로메타졸린염산염

화이트벤 나잘스프레이 0.1%(자일로메타졸린염산염)는 코감기(급성비염), 알레르기성 비염 또는 축농증(부비동염)으로 인한 코막힘, 콧물, 재채기 및 머리무거움 증상을 완화시켜주는 무방부제의 코에 뿌리는 스프레이입니다. 향을 좋아하지 않는 분을 위한 무향의 스프레이입니다.

원료약품 및 그 분량 이 약 1mL중
자일로메타졸린염산염(EP) 1mg

성상

일정량씩 분무되는 용기에 든 무색 내지 거의 무색의 투명한 액

효능·효과

코감기(급성비염(코염)), 알레르기성 비염(코염) 또는 부비동염(축농증)에 의한 다음 증상의 완화 :
코막힘, 콧물, 재채기, 머리무거움



용법·용량

7세 이상의 소아 또는 성인에게 다음과 같이 적용하며 1일 3회를 초과하지 마세요.
1일 1~3회(매 8~10시간 마다), 1회 1번 각 비강(코안)에 분무하세요.

사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 마세요.

- 1) 만 7세 미만의 유아
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 3) MAO 억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하세요.

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 2) 지금까지의 약(비염(코염)용 분무제 포함)에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 부종(부기), 자극감, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 고혈압, 심장질환, 당뇨병, 갑상선질환, 녹내장 환자
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 5) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 6) 다음과 같은 기침이 있는 사람 : 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하시고, 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하세요.

- 1) 이 약의 사용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 : 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 부종(부기), 자극감, 가려움
- 2) 3일간 사용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

4. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키세요.
- 2) 이 약은 과도하게 사용하면 오히려 코막힘을 일으킬 수 있으므로 과도하게 사용하지 마세요.
- 3) 이 약은 비염(코염)용 분무제로만 사용하고, 눈과 귀에는 사용하지 마세요.
- 4) 오염을 방지하기 위해 가능한 공동으로 사용하지 마세요.
- 5) 7일 이상 계속 사용하지 마세요.
- 6) 사용 시에는 음주하지 마세요.
- 7) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 사용하세요.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하세요.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하세요.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마세요.

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

10 mL

올바른 사용법

1. 분무 전 코를 풀고 코 속을 깨끗하게 하면 좋습니다.
2. 보호캡을 열고 그림대로 엄지로 약병의 바닥부분을 지탱하고 검지와 중지로 약병 위를 잡아 수직으로 세웁니다.
3. 1~2 차례 눌러 약액이 열린 안개처럼 분무되는지 확인합니다.



4. 머리를 약간 앞쪽으로 내밀고, 손가락으로 한 쪽 코를 막고 반대편 콧구멍에 스프레이 노즐을 넣습니다.
5. 코로 가볍게 숨을 들이마시면서, 동시에 스프레이를 힘있게 1차례 눌러 분무합니다.
6. 반대편 코에도 위의 과정을 반복합니다.



제조회사

Takeda Pharma A/S
Dybendal Alle 10, DK-2630 Taastrup,
Denmark

제조사

Takeda GmbH
Robert-Bosch-Str.8, 78224 Singen,
Germany

수입판매자

한국다케다제약주식회사
서울시 강남구 테헤란로 98길 8,
12층(대치동)

- 필요한 경우, 스프레이 노즐을 미온수로 행귀줍니다. • 무방부제 (Preservative Free)
- 스프레이를 약병에서 분리하지 마십시오.
- 이 약품 1병(10mL)에는 약 70회 분무 가능한 약액이 들어 있습니다.
- 1회 분무량에는 자일로메타졸린염산염(Xylometazoline hydrochloride) 140μg이 들어있습니다.

이 약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 유통과정 중 잘못으로 사용기한이 경과되었거나 제품이 변질, 변패, 오염 또는 손상된 경우 구입한 약국을 통하여 교환 또는 환불 받으실 수 있습니다.

올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하시고, 기타 제품관련 문의 사항은 당사 소비자상담실로 문의하여 주시기 바랍니다. (제품문의 전화 080-553-3300)

의약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.

첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 알려거나 당사 소비자 상담실로 문의하여 주시기 바랍니다.(080-553-3300)

이 첨부문서 작성일자(2014년 12월 09일)이후 변경된 내용은 한국다케다제약 홈페이지 (www.takeda.co.kr) 또는 식품의약품안전처 온라인의약도서관(http://drug.mfds.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

www.whituben.co.kr

화이트벤[®] 나잘스프레이 0.1%
자일로메타졸린염산염

KOR R01/0115/6132370