

상처, 입술포진, 화상엔 -

티로클 겔

(티로트리신)



일반의약품

분류번호 629
(기타의 화학요법제)

티로클겔은 외상(상처), 화상 및 긁은 피부로 인해 감염의 우려가 있거나 이미 감염된 피부에 사용할 수 있는 외용제입니다. 또한 입술 포진(물집), 습진으로 인한 2차 감염 예방에도 효과적입니다.

이 제제는 상처나 피부에 진균과 바이러스로부터 감염을 예방 및 치료하는 약제로, 손상된 부위에 빠른 재생을 돕습니다. 또한 겔 제제의 특유한 쿨링 효과로 피부의 열감을 덜어내어 통증 경감에 도움이 됩니다.

원료약품의 분량(1g 중)

티로트리신(KP) 1 mg
첨가제(보존제) : 세틸피리디늄염화물수화물(USP) 0.5 mg

성상 무색의 투명한 겔

효능·효과

감염의 우려가 있거나 감염된 외상(상처), 화상, 긁은 피부감염, 하지족부궤양에서의 피부진균감염, 습진에서의 2차감염, 입술포진

용법·용량

감염된 부위에 하루 2~3회 적당량을 바릅니다.

가벼운 상처나 점막 부위의 감염에는 드레싱이 필요하지 않습니다. 광범위한 질환 부위 및 심한 삼출성 상처에는 드레싱이 권장되며 제품을 1~2회 사용시마다 드레싱을 교체하는 것이 권장됩니다.

사용상의 주의사항

사용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 사용하시기 바랍니다.

1. 다음과 같은 사람(신체 부위)에는 이 약을 사용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응의 병력이 있는 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
- 3) 코점막 부위

2. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.

- 1) 이 약의 주성분과 보존제가 모두 중으로 분비된다고 알려져 있으므로 이 약을 사용하는 동안 수영하거나 샤워하는 동안 이 약을 사용하지 않습니다.

- 2) 눈에 직접 닿으면 화끈감이 나타날 수 있으므로, 눈 주위에 사용할 경우 이 약이 눈에 직접 닿지 않도록 주의합니다.
3. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 약사와 상의하십시오.
이 약에 포함된 프로필렌글리콜에 과민반응의 병력이 있는 환자
4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지하십시오.
- 1) 피부 화끈감 등의 과민반응
 - 2) 이 약을 사용한 후 증상이 악화되거나, 일주일 이상 사용하여도 증상의 개선이 없는 경우
5. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 오용(잘못 사용)·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.
 - 3) 제품 개봉 후 3개월 이내에 사용하십시오.

저장방법 : 기밀용기, 25℃ 이하 보관

포장단위 : 5g

- 이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
- 이 설명서는 2015년 11월 19일자로 작성되었으며 이 후로 변경된 내용은 홈페이지(www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.

제조사 (주)퍼슨
충청남도 천안시 서북구 백석공단1로 47

제조의회사 **ILDONG 일동제약주식회사**

본사 서울특별시 서초구 바우뒤편로27길 2
공장 경기도 안성시 공단1로 25
소비자상담실 : (전화)080-022-1010(수신자부담)