

라푸진^정

라푸티딘

[원료약품 및 그 분량] 이 약 1정 중

라푸티딘(별규) 10mg

[성상] 흰색의 원형 필름코팅정**[효능·효과]**

1. 위궤양, 십이지장 궤양
2. 급성위염 및 만성위염의 위점막병변의 개선
3. *Helicobacter pylori*에 감염된 소화성 궤양 환자에 대한 항생제 병용요법
4. 마취전 투약
5. 역류성 식도염 치료

[용법·용량]

1. 위궤양의 단기치료
통상 라푸티딘으로 1회 10mg을 1일 2회 오전 및 취침전에 경구 투여한다. 최대 8주간 투여한 임상시험 결과 대부분 8주 이내에 치유되나 간혹 환자에 따라 치유기간이 달라질 수 있다.
2. 십이지장궤양의 단기치료
통상 라푸티딘으로 1회 10mg을 1일 2회 오전 및 취침전에 경구 투여한다. 최대 6주간 투여한 임상시험 결과 대부분 6주 이내에 치유되나 간혹 환자에 따라 치유기간이 달라질 수 있다.
3. 급성위염 및 만성위염의 위점막 병변의 개선
통상 라푸티딘으로 1일 1회 10mg을 취침전 경구 투여한다. 최대 2주간 투여한 임상시험 결과 대부분 2주 이내에 치유되나 간혹 환자에 따라 치유기간이 달라질 수 있다.
4. *Helicobacter pylori*에 감염된 소화성 궤양 환자에 대한 항생제 병용요법
라푸티딘 20mg, 클레리스로마이신 500mg, 아목사실린 1000mg을 1일 2회 7일간 또는 14일간 투여한다.
5. 마취전투약
통상 라푸티딘으로서 1회 10mg을 2회(수술전날 취침전, 수술당일 마취투여 2시간전) 경구투여한다.
6. 역류성 식도염 치료
라푸티딘으로서 1회 10mg을 2회 경구투여한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 1) 이 약 성분에 과민증 환자
 - 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 1) 약물 과민증의 기왕력이 있는 환자
 - 2) 간장애 환자
 - 3) 신장애 환자
 - 4) 투석 환자
 - 5) 고령자
3. 이상반응
 - 1) 속, 아낙필락시스양 증상 : 속, 아낙필락시스양 증상을 일으킬 수 있으므로, 관찰을 충분히 실시해 안면창백, 혈압저하, 전신발적, 호흡곤란 등이 나타났을 경우에는 투여를 중지하고, 적절한 처치를 실시한다.
 - 2) 간기능 장애, 황달 : AST(GOT), ALT(GPT), γ -GTP치의 상승 등을 수반하는 간기능 장애, 황달이 나타나는 일이 있으므로, 관찰을 충분히 실시하고, 이상이 인정되었을 경우에는 투여를 중지하고, 적절한 처치를 실시한다.
 - 3) 무과립구증, 혈소판감소 : 무과립구증(초기증상 : 인두통, 전신권태감, 발열 등), 혈소판 감소가 나타나는 일이 있으므로, 이상이 인정되었을 경우에는 투여를 중지하고, 적절한 처치를 실시한다.
 - 4) 기타 : 다른 H₂ 수용체길항제에서 범혈구감소증, 재생불량성빈혈, 경련, 간질성신염, 스티븐스-존슨증후군(피부점막안증후군), 리엘증후군(중독성표피괴사증), 횡문근융해증, 방실차단 같은 심장차단, 부전수축, 경련이 나타났다는 보고가 있다.
 - 5) 임상시험 및 시판후조사 결과에서 나타난 이상반응은 다음 표와 같다.

발현부위	이상반응	발현빈도(%) (n=1,287)	발현부위	이상반응	발현빈도(%) (n=1,287)
소화기계	변비	0.2%	혈액계	적혈구수감소	0.08%
	설사	0.08%		적혈구용적률감소	0.08%
	굳은변	0.08%		Hematocrit 감소	빈도불명
	구역	빈도불명*	간장	ALT(GPT)상승	0.7%
	구토	빈도불명		AST(GOT)상승	0.5%
	복부팽만감	빈도불명		Al-P상승	0.5%
	식욕부진	빈도불명		γ -GTP상승	0.4%
중추신경계	두통	0.08%		T-Bil상승	0.2%
	불면	0.08%		LDH상승	0.08%
	졸음	0.08%		TTT상승	0.08%
	가역성 착란상태	빈도불명	신장	노단백이상	0.2%
	환각	빈도불명		BUN상승	0.08%
	의식장애	빈도불명	기타	혈청요산치상승	0.2%
	현기증	빈도불명		Cl상승	0.2%
순환기계	동계	0.08%		생리지연	0.08%
	열감	0.08%		Na상승	0.08%
	안면홍조	0.08%		K저하	0.08%
혈액계	백혈구수증가	0.2%		여성화유방	빈도불명
	호산구상승	0.08%		부종	빈도불명
	백혈구수감소	0.08%		권태감	빈도불명

* 시판후 자발보고 등의 보고에서 빈도불명으로 보고됨

6) 국내에서 *Helicobacter pylori* 감염환자 493명(시험군 245명, 대조군 248명)을 대상으로 한 소화성 궤양 환자에 대한 항생제 병용요법 입증을 위한 임상시험에서 약물 관련 이상반응은 설사(6.02%), 복부팽만감(6.02%), 식욕 부진(3.01%), ALT상승(1.81%) 순으로 나타났고, 예상하지 못한 이상반응은 발생하지 않았다.

7) 국내에서 역류성 식도염 환자를 대상으로 한 3상 임상시험결과 이상반응은 다음과 같다. 중대한 이상반응은 발생하지 않았다.

발현부위	이상반응	발현빈도(%) (n=165)	발현부위	이상반응	발현빈도(%) (n=165)
소화기계	복통	1.21%	호흡기, 흉부 및 종격동 질환	기침	1.21%
	소화불량	0.61%		입인두통증	0.61%
	복부팽만감*	0.61%		입인두불쾌감	0.61%
	구역	1.21%		젖은기침	0.61%
	변비	1.21%	일반적질환 및 국소반응	피로감	0.61%
	장염	0.61%		홍통	1.21%
	위궤양	0.61%	실험실 검사	ALT(GPT)상승	0.61%
	미란성위염	0.61%	골격근 및 결합조직 질환	사지통증	0.61%
	구토	0.61%		관절통	0.61%
	심이지장염	0.61%		경부통	0.61%
감염	고창	0.61%	피부 및 파하조직 질환	가려움증*	0.61%
	코인두염	2.42%		여드름	0.61%
	상기도감염	1.21%	손상, 중독 및 사술 후 합병증	타박상	1.21%
	기관지폐렴	0.61%		식욕부진*	0.61%
	완선	0.61%	정신질환	불면증	0.61%
신경계	두통	0.61%	간-담도계	비알콜성 지방간염	0.61%
	현기증	0.61%			
	경동맥협착	0.61%			

* 인과관계를 배제할 수 없는 이상반응은 3명(1.82%, 3/165명)에서 3건으로 복부팽만감(0.61%), 가려움증(0.61%), 식욕부진(0.61%)으로 나타났다.

4. 일반적주의

- 이 약으로 인해 악성종양의 증상이 완화되거나 진단이 지연될 수 있으므로 악성 종양이 의심되는 경고 증상(의도하지 않은 현저한 체중 감소, 재발성 구토, 부전설어증, 토혈이나 흑토증 등)이 있으면서 위궤양이 있거나 의심되는 경우 검사를 실시하여 악성종양 여부를 확인하여야 한다.
- 위궤양이 의심되는 경우에는 초기 단계에서 X-ray나 위내시경 검사 등을 실시하여야 하며, 악성 위암으로 확인될 경우에는 이 약의 투여를 중지한다.
- 치료를 있어서는 경과를 충분히 관찰하여 질환의 상태에 따른 치료상 필요한 최소한의 사용에 그치고 이 약으로 효과가 보이지 않을 경우에는 다른 요법으로 바꾼다. 또한 혈액상, 간기능, 신기능 등에 주의한다.

5. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 용량에 따른 투여간격에 주의하고, 환자의 상태를 관찰하여 신중히 투여한다.

6. 투석환자

비 투석시 최고혈중농도가 건강인의 약 2배로 상승하는 것이 보고되고 있으므로, 저용량부터 신중하게 투여한다.

7. 임신부, 수유부에 대한 투여

- 임산부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 의사의 판단 하에 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단될 경우에 한하여 투약한다.
- 동물실험 결과 이 약이 유즙으로 분비되는 것이 관찰되었으므로 수유 중인 여성의 경우에는 투여하지 말 것

8. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다.

9. 보관 및 취급상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오염에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 보관할 것

10. 기타

- 동물실험결과 발암성은 관찰되지 않았으며, 체표면적당 용량으로 환산 시 인체투여용량(10~20mg)의 약 170배, 330배, 1000배에 해당하는 용량에서 위선의 내분비신경세포의 과증식 수가 용량과 관련하여 증가되었다.
- 동물을 대상으로 한 생식발생독성 시험결과 체표면적당 용량으로 환산 시 인체투여용량(10~20mg)의 약 200배 이상에서 침출림, 탈모, 하복부 오염, 자발운동의 감소, 간대성경련이 관찰되었다. 배태자의 치사, 발육억제 및 최기형성은 관찰되지 않았다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 300정(병), 30정(병)

[제조원] 한국콜마(주)/세종특별자치시 전의면 산단길 245

[제조외국 및 판매원] 진양제약(주)/경기도 안산시 단원구 별마로 627

※ [최신 제품 정보 확인 방법] 이 첨부문서 작성일자(2013.09.16)이후 변경된 내용은 진양제약홈페이지(www.jinyangpharm.com)나 고객센터상담(02-3470-0350)을 통하여 확인할 수 있습니다.

※ 본 제품을 복용하기 전에 사용설명서를 주의깊게 읽어야 하며, 사용설명서는 본 제품과 함께 보관하십시오

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.