

비타민D 고함량(1000단위)

디맥정 (농축콜레칼시페롤 과립)

비타민D는 칼슘 항상성의 양성 조절인자로서 칼슘 대사 및 골격계의 발달과 유지에 필수불가결한 성분입니다. 디맥정은 골밀도 개선 및 비타민D의 유익한 효능을 위하여 개발된 고함량 비타민D(1000IU) 제제입니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

농축콜레칼시페롤 과립(EP)10mg
(비타민D₃로서 1000IU)

【성상】

흰색의 장방형 정제

【효능·효과】

- 골다공증 치료 보조
- 흡수장애가 없는 건강한 사람에서 비타민D 결핍질환 위험으로부터의 예방
- 구루병의 예방

【용법·용량】

- 골다공증 치료 보조 : 1회 1정(1000IU)씩 1일 1회
- 흡수장애가 없는 건강한 사람에서 비타민D 결핍질환 위험으로부터의 예방 : 1회 1/2정(500IU)씩 1일 1회
- 구루병 예방 : 1회 1/2정씩(500IU) 1일 1회

성인 : 충분한 양의 물과 함께 복용합니다.

정제를 삼키기 어려운 유아 : 손가락에 정제를 놓고 물에 봉해시킨 후 가능한 식사와 함께 복용하십시오. 음식에 넣을 때는 음식을 끓인 이후 넣어주고, 비타민D가 많은 식품인 경우 용량조절이 필요할 수 있습니다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 1) 과칼슘혈증환자
 - 2) 과칼슘뇨증환자
 - 3) 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자
 - 4) 신장결석환자
 - 5) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 6) 3개월 미만의 영아
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 벤조티아디아진 유도체 : 과칼슘혈증 위험 증가
- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.(복용 전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)
 - 1) 1세 미만의 영아
 - 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민D 또는 칼슘의 투여를 피하십시오.
 - 4) 신장결석의 이력이 있는 환자
 - 5) 유육종증 환자
 - 6) 움직임이 제한적인 환자(석고깁스)
 - 7) 벤조티아디아진 유도체를 투여한 환자
 - 8) 거짓부갑상선기능저하증 환자

- 9) 임부 : 과다복용시 기형유발의 위험이 있습니다.(신체적 및 지적 발달 지연, 대동맥협착의 특이한 형태)
- 10) 수유부 : 비타민D와 대사체는 모유로 분비되어 신생아에게 과칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
- 11) 신장에 환자
- 12) 다른 비타민D 제제를 복용하는 경우(용량이 조절되어야 함)
- 13) 페니토인 또는 바비탈류 약물 복용환자
- 14) 치아징계 이노제 복용환자
- 15) 글루코코르티코이드 복용환자
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.
상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 1) 신경정신계 - 정신적 증상, 의식장애(혈청 칼슘 증가), 두통
 - 2) 위장관 - 구역, 구토, 식욕부진, 체중감소, 갈증증가(혈청 칼슘 증가)
 - 3) 전해질
칼슘혈청증가에 따른 급성 증상 : 부정맥, 구역, 구토, 정신적 증상, 의식장애
칼슘혈청증가에 따른 만성 증상 : 증가된 배뇨감, 갈증증가, 식욕부진, 체중감소, 신장결석, 신장석회화, 뼈의 외곽 조직에서의 석회화, 개별 증례에 있어서 치명적 진행(과다복용시)
 - 4) 심장 - 부정맥(혈청 칼슘 증가)
 - 5) 비뇨기계 - 증가된 배뇨감, 신장결석, 신장석회화(혈청 칼슘 증가)
 - 6) 기타 - 뼈의 외곽 조직에서의 석회화(혈청 칼슘 증가), 근육통 및 관절통
5. 일반적 주의
 - 1) 일일 500 IU 이상을 투여하는 경우 혈액 및 뇨중 칼슘 수치와 신장기능을 주기적으로 모니터링하여야 합니다. 모니터링 결과 필요하다면 용량을 조절해야 합니다.
 - 2) 이 약을 삼키기 어려운 유아는 정제를 물에 녹인 다음 복용합니다.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
 - 2) 오염을 피하고 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.
 - 3) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.

【포장단위】 30정, 90정

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【최종 개정연월일】 2014. 12. 01

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 의하여 생산된 제품입니다. 구입시 사용기한이 지났거나 유통기한 중 변질, 변패, 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.

※ 첨부문서 작성일자(2014년 12월 1일)이후 변경된 내용은 홈페이지(www.dalimpharm.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

※ 이 약은 습도가 높으면 인습의 우려가 있으므로, PTP를 개봉하여 조제하지 마시고 복용시까지 PTP 포장상태로 보관하십시오.

제조사

dalim다림바이오텍

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 107

대표전화 : 02) 335-1656

공장 및 연구소 : 031) 353-6091

소비자상담실 : 080) 333-1656(수신자부담)