



대용

레보플록사신 100mg

(레보플록사신수화물)

사용 전에 사용설명서를 주의깊게 읽어 보십시오.

사용설명서를 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

【원료약품 및 그 분량】 이 약 1정(205mg) 중
레보플록사신수화물(KPC) 100mg

※ 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원동물) : 소, 사용
부유(우유)

【성 상】 이 약은 백색 - 미황색의 원형 필름코팅정입니다.

【효능·효과】

〈유효균종〉

포도구균, 황녹연쇄구균, 용혈연쇄구균, 장내구균, 폐렴구균, 펩토
연쇄구균, 인플루엔자, 대장균, 시트로박터, 시겔라, 엔테로박터, 세라티
아, 프로테우스, 녹농균, 헤모필루스 인플루엔자, 아시네토박터,
칸필로박터, 클라미디아트라코마티스

〈작용증〉

- 종기, 큰종기, 얇은 연조직염(단독), 연조직염, 땀샘염, 림프관(절)염, 피하농양, 접촉성 여드름, 감염성 축농증, 모낭염, 손발톱(표지), 유선염, 외상·열상·수술상 등의 (표재성) 2차감염, 항문주위농양
- 인후두염, 급성 기관지염, 만성 기관지염, 미만성 폐색기관지염, 만성호흡기질환의 2차감염, 폐렴, 기관지확장증(감염성),
- 신우신염, 방광염, 전립선염, 임균성요도염, 비임균성요도염, 부고환염
- 세균성 이질, 장염
- 자궁부속기염, 자궁내감염, 바르톨린샘염
- 눈꺼풀염, 다래개, 누낭염, 결막염, 각막결막
- 편도염, 중이염, 부비동염, 치주조직염, 악염
- 담낭염, 담관염

【용법·용량】

보통 성인 레보플록사신으로서 1회 100mg을 1일 2~3회경구 투
여합니다. 중증 또는 효과가 불충분한 환자는 이 약으로서 1회
200mg, 1일 3회 투여합니다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감합
니다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

- 1) 레보플록사신 등의 퀴놀론계 항균제를 투여받은 환자 중에
서 외과적 수술이 필요하거나 또는 장애기간의 연장을 유
발하는 어깨, 손·아킬레스건등의 건파열이 보고 되었습니
다. 시판후 조사에서는 이러한 위험성은 고령자이거나 스테
로이드와 병용시더증가합니다. 환자가 통증, 염증, 건파열
을 경험하면 이 약의 투여를 중지해야 합니다. 그리고 건염
또는 건파열이 아님을 확실하진단 받을때까지 휴식을 취하
고 운동을 삼가야합니다. 건파열은 이 약 투여중 또는 투여
후에도 나타날 수 있습니다.
- 2) 퀴놀론계 항균제는 신경근육 차단 작용이 있어 중증 근육력
하진의 경우 증상이 더 심해 질 수 있습니다. 시판 후 조사
에서는 퀴놀론계 항균제를 복용한 중증근무력 환자에게서
사망과 호흡 보조기가 필요한 경우를 포함한 심각한 이상
반응이 보고되었습니다.(3.신중투여 참조)

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 퀴놀론계 항균제에 과민반응의 병력이 있는 환자
- 2) 이 약 및 퀴놀론계 항균제로 인한 건염, 건파열의 병력이
있는 환자
- 3) 소아 및 18세 이하의 성장 중인 청소년
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
- 5) 간질 환자
- 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galac-
tose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase de-
ficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose
malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자분에게는 투
여하면 안됩니다.
3. 다음 환자에게는 신중히 투여하십시오.
1) 중증 신장애 환자

- 2) 중증 뇌동맥경화증 등의 중추신경계 질환이 있거나 의심되
는 환자경련의 위험이 있습니다.)
- 3) 경련성 질환의 병력이 있는 환자(경련의 위험이 있습니다.)
- 4) 펜토텐, 플루르비프로펜과 같은 페닐초산계 또는 프로피온산
계비스테로이드소염제 및 테오필린을 투여 중인 환자
(경련의 위험이 있습니다.)
- 5) 고령자
- 6) 인슐린 또는 경구용 혈당강화제와 이 약을 동시에 투여받
는 당뇨병 환자
- 7) 글루코코르티코이드-인산 탈수소효소(G-6-PD) 결핍 환자(드물게
용혈반응이 나타날 수 있습니다.)
- 8) 중증 근육력증 환자(중증이 심해질 수 있습니다.)

4. 이상반응

- 1) 속 : 드물게 속이 나타나는 경우가 있으므로 충분히 관찰하고,
혈압강하, 호흡곤란, 흉부부박감 등의 증상이 나타나는 경우
에는 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.
- 2) 과민반응 : 치명적인 과민반응과 아니발파시 반응이 보고
되었고 일부 반응은 심장혈관 허탈, 저혈압 속, 발작, 의식상
실, 저림, 메스꺼움, 맥관통, 기도 폐쇄, 호흡곤란, 두드러기, 가려
움, 배변 심장 박동, 연하곤란, 기타의 심각한 피부반응 등과
동반되어 나타날 수 있습니다. 또한 약물과의 인과관계는 명
확하지 않지만 레보플록사신을 포함하는 퀴놀론계 항생제를
반복투여한 환자에게 드물게 과민성 혈관염 등의 증상을 수
반하는 심각하고 때로는 치명적인 과민반응이 보고되었습니
다. 이러한 증상이 나타나는 경우 투여를 중지합니다. 또한
과도한 햇빛이나 인공적인 자외선을 피하며 또한 수포, 홍반
등을 동반한 광과민반응이 나타나면 투여를 중단합니다.
- 3) 정신신경계 : 때때로 불안, 어지러움, 두통, 드물게 떨림, 불안,
우울, 정신병적 반응, 초조, 혼돈, 경련, 매우 드물게 시각 및
청각장애, 미각 및 후각 장애, 현청 등이 나타날 수 있습니다.
말초신경 장애로서 드물게 감각신경 또는 감각운동 축색의
감각신경병증의 결과로 감각이상증, 감각저하증, 감각장애,
쇠약 등이 보고되었습니다. 만약 통증, 작열감, 저림, 무감각,
가벼운 충격, 통각, 온도, 위치, 진동감각 등의 변화가 수반되
는 신경 증상이 나타난다면 투여를 중지합니다. 또 오히려
사신에서 드물게 저린감이 나타난다는 보고가 있습니다.
- 4) 순환기계 : 때때로 심계항진 같은 심장박동 장애가 나타날
수 있습니다. 심전도상에서 QT 간격 연장, 중증 또는 부정맥
과 관련된 것으로 보고되었고 시판후 조사에서 Torsades
de pointes가 드물게 보고되었으므로 저칼륨증, 유의한 서
맥, 심근병증과 같은 Torsades de pointes에 대한 위험인
자가 존재하는 환자는 투여를 금합니다.
- 5) 신장 : 때때로 BUN, 혈청크레아티닌의 상승, 매우 드물게
급성신부전이 나타날 수 있습니다. 또한 약물과의 인과관
계는 명확하지는 않지만 레보플록사신을 포함하는 퀴놀론
계 항생제를 반복투여한 환자에게 드물게 사이질성 신장염
등의 증상을 수반하는 심각하고 때때로 치명적인 과민반응
이 보고되었습니다.
- 6) 간장 : 흔히 간효소치(AST/ALT) 상승, 때때로 급성 간과사,
급성 간부전, 중증 간염, 간장애, 황달, ALP, γ-GTP, 총 빌리
루빈의 상승 등이 나타날 수 있습니다.
- 7) 혈액계 : 때때로 백혈구 감소, 적혈구 감소, 헤모글로빈 감소,
헤마토크리트 감소, 호산구 증가, 범혈구감소증, 빈혈, 용
혈반응(증상 : 헤모글로빈뇨, 혈소판감소증, 매우 드물게
무과립구증이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이
나타나는 경우에는 투여를 중지합니다.
- 8) 소화기계 : 때때로 구역, 구토, 복부불쾌감, 설사, 식욕부진,
복통, 복부팽만감, 드물게 소화불량, 구내염, 혀염, 목마름, 변
비 등이 나타날 수 있습니다. 또한 드물게 생명을 위협하는
치명적인 위막성대장염 등의 합병을 수반한 대장염이 나타
나는 경우가 있으므로 복통, 빈번한 설사 등 대장염을 의심
하는 증상이 나타나면 경우에는 즉시 투여를 중지하고 적절
한 처치를 합니다.
- 9) 근골격계 : 근육통, 무력감, CPK 상승, 혈중 및 요중 미오글로
빈 상승을 특징으로 하는 급격한 신기능 악화를 수반한 횡문
근병증이 일어날 수 있으므로 주의합니다. 드물게 관절염,
건염 등의 건질현, 매우 드물게 건파열이 일어날 수 있습니
다. 근육 약화가 나타날 수 있는데, 특히 중증근무력증 환자
는 증상이 더 심해질 수 있으므로 주의합니다.
- 10) 피부 : 피부점막만중후군(스티븐스-존슨증후군), 중증표
피자용해(괴양중후군)가 나타날 수 있으므로 충분히 관
찰하고 이상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절
한 처치를 합니다.
- 11) 호흡기계 : 발열, 기침, 호흡곤란, 흉부X선 이상, 호산구 증가

등을 동반하는 간질성폐렴, 알레르기성 폐렴이 나타날 수 있으므로 주의하고, 이런 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 부진피질호르몬제 투여 등의 적절한 처치를 합니다.

12) 경구용 혈당강하제 또는 인슐린을 복용중인 당뇨병 환자에서 혈당장애(고혈당 또는 저혈당)가 보고되었으므로, 이러한 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.

13) 기타

북아메리카에서 시행된 3상 임상시험에서 이 약과 관련성이 있는 유해반응은 피험자의 6.7%에서 발현되었습니다. 피험자중 4.1%는 유해사례로 인하여 이 약의 투여를 중지하였습니다. 전반적인 발현율과 유해사례의 종류 및 분포는 750 mg을 1일 1회 투여한 경우, 250 mg을 1일 1회 투여한 경우, 500 mg을 1일 1회 또는 1일 2회 투여한 경우에서 유사하게 나타났습니다. 본 임상시험에서 이 약을 투여받은 피험자 중 이 약과 관련성이 있는 것으로 판단된 약물 유해사례는 다음과 같습니다. : 구역 1.5%, 설사 1.2%, 지열 0.5%, 불면증 0.4%, 복통 0.4%, 헛배부름 0.2%, 기어움 0.2%, 어지러움 0.3%, 발진 0.3%, 소화불량 0.3%, 생식기칸디다증 0.1%, 칸디다증 0.2%, 마각도착증 0.2%, 구토 0.3%, 변비 0.1%, 전신감염 0.1%, 생식기 가려움증 0.1%, 두통 0.2%, 신경통 0.1%, 흉반상발진 0.1%, 두드러기 0.1%, 식욕감퇴 0.1%, 졸림 0.1%, 중독 0.1%, 구갈 0.2%, 떨림 0.1%, 알레르기 반응 0.1%.

5. 일반적 주의

1) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현등을 방지하기 위하여 감수성을 확인하고 치료상 필요한 최소기간만 투여하는 것이 바람직합니다.

2) 위험요인이 있는 환자에게는 경련 또는 다른 중추신경계 이상반응이 나타날 수 있음을 알려야 합니다.

3) 이 약에 의한 광과민반응은 매우 드물게 나타나는 반응이지만, 광과민 반응을 방지하기 위해 환자는 스스로 불필요하게 강한 햇빛이나 인공적인 자외선(예를 들어 태양광선 램프, 일광욕실등)에 노출시키지 않도록 하여야 하며, 발진등의 광과민 반응이 의심되는 증상이 발생할 시 투여를 중단해야 합니다.

4) 운전 또는 기계작업에 미치는 영향
어지러움, 졸림, 시각장애와 같은 바람직하지 않은 효과들이 환자의 집중력 및 대처능력을 손상시킬 수 있으며, 이는 자동차 운전중도는 기계조작과 같은일에 영향을 줄 수 있습니다.

5) 대부분의 심한 폐렴구균성폐렴의 경우는 이약이 적절한 치료제가지 못할 수 있습니다. 그리고 녹농균(*aeruginosa*)에 의한 병원 내감염은 다른 약물과의 병용투여가 필요합니다.

6) 이 약을 포함한 거의 대부분의 항균제에서 경증에서 생명을 위협하기도 하는 위막성 대장염이 보고되었습니다. 그러므로 어떤 항균제든 투여후에 설사하는 환자는 주의하여야 합니다. 클로스트리다이피페(Clostridium difficile)에서 생성되는 독성물질이 1차적인 원인으로 알려져 있으므로, 위막성대장염이 의심될때는 이 약의 투여를 즉시 중지하고, 환자에게는 지체없이 보조수단 토박수치료로 처치(예를들면 경구용 반코마이신등)를 실시하여야 합니다. 이면임상상태에서는 정연동을 저해 하는 제제는 금기하여야 합니다.

6. 상호작용

1) 이 약을 포함한 퀴놀론계 항균제와 비스테로이드소염제(예: 펜부텐, 플루르비프로펜과 같은 페닐초산계 또는 프로파논산계)와의 병용투여는 중추신경자극과 경련성 발작의 위험을 증가시킬 수 있으므로 신중히 투여합니다.

2) 알류미늄 또는 마그네슘 함유 제산제, 수크랄페이트, 철분 함유 제제, 칼슘 함유 제제, 아연 또는 철분이 함유된 종합비타민제와의 병용에 의해 흡수가 저하되어 효과가 저하되는 경우가 있으므로 이 약투여 전 후 2시간 이내에는 병용하지 않는 것이 바람직합니다.

3) 퀴놀론계 항균제는 테오필린과의 병용투여 시, 테오필린의 혈중 농도를 증가시키고 그 작용을 증강시킨다는 보고가 있으므로 병용하는 경우에는 테오필린을 감량하는 등 신중히 투여합니다.

4) 이 약은 외파린과 같은 경우 항응고제와 단백결합부위에서 경쟁적으로 작용하여 항응고제의 작용을 증가시켜 출혈, 프로트롬빈시간연장 등이 나타났다는 보고가 있으므로 항응고제의 용량을 줄여야하며, 병용 시 적절한 혈액학적 모니터링이 필요합니다.

5) 이 약을 사이클로스포린과 병용투여 시 사이클로스포린의 반감기가 33% 증가하지만, 용량조절은 필요치 않습니다.

6) 프로베네시드와 시메티딘

프로베네시드와 시메티딘은 이 약의 소실에 통계학적으로 유의성은 영향을 주었습니다. 이 약의 신장소일은 시메티딘에 의해 24%, 프로베네시드에 의해 34%씩 감소하였습니다. 이것은 두 약물 모두 이약의 신세노관 배설 차단능력이 있기 때문입니다. 이러한 결과가 바로 어떤 임상적인 의미를 가지는 것은 아니라고 생각되지만, 이 약을 특히 신장장애가 있는 환자에게 프로베네시드, 시메티딘과 같은 신세노관 배설에 영향을 주는 약물과 병용투여하는 경우에는 신중히 투여해야 합니다. 프로베네시드는 이 약의 관 분비를 저해하여 이 약의 요로감염 치료효과를 감소시킬 수 있습니다.

7) 당뇨병증에 : 퀴놀론계 항균제와 함께 복용 할 경우 혈당장애(고혈당 또는 저혈당)가 보고되었으므로 병용투여 시 혈중 당수치를 주의 깊게 모니터링해야 합니다.

7. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 동물의 생식독성연구에서는 특별한 문제가 없었습니다. 그러나 사람에게 대한 연구자료가 부족하고, 퀴놀론계 항균제가 성장 중인 생장기의 체중을 지탱하는 연골을 손상시키는 실험적인 위험성 때문에, 이 약은 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 투여하지 않습니다.

2) 이 약과 구조적으로 유사한 옐록록사신에서 모유 중으로 이행되는 것이 알려져 있으므로, 이 약 투여중에는 수유를 중단합니다.

8. 소아에 대한 투여

이 약을 포함한 퀴놀론계 항균제는 몇몇 어린 동물종에서 관절병, 뼈연골을 유발하였습니다. 소아 및 18세이하의 성장 중인 청소년에 대한 안전성이 확립 되어 있지 않으므로 투여하지 않습니다.

9. 고령자에 대한 투여

1) 이 약은 주로 신장으로 배설되는데, 고령자는 신기능이 저하된 경우가 많아 높은 혈중 농도가 지속 될 위험이 있고 이상반응이 발현하기 쉬우므로, 용량 및 투여간격에 유의하여 신중히 투여합니다.

2) 시판후 조사에서 중증의/때로는 치명적 간독성이 65세 이상의 노인환자에게서 보고되었습니다. 만약, 간염의 증상이나 중증화가 나타난 환자에게는 즉시 이약의 투여를 중지합니다.

10. 과량 투여시의 처리

마우스, 랫트, 개, 원숭이를 이용한 동물실험에서 이 약의 경우 재를 단일 고용량으로 투여하였을 때 소화운동불능, 과거몰처짐, 운동활동감소, 호흡곤란, 허탈, 떨림, 경련과 같은 중추신경계 증상과 QT 간격의연장이 나타났습니다. 과량투여시 위세척을 실시하고, 환자를 주의 깊게 관찰하여 적절한 수액보충을 실시하여야 하며, QT 간격의연장 가능성 때문에 심전도 모니터링이 필요합니다. 이 약은 혈액투석이나 복막투석을 통해서 는 효과적으로 제거되지 않습니다.

11. 기타

동물실험(어린 개, 젊은 성견, 어린 랫트에서 관절이상)이 나타났다는보고가 있습니다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 자사포장단위

【사용기간】 제조일로부터 36개월입니다.

제조사 : 대웅제약주 / 강원도 횡성군 횡성읍 한우로495

제조의뢰자 : (주)대웅제약 / 경기도 화성시 향남읍 제암로4 단길 35-14

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용한 때는 유효기간이 지나거나 변질, 변색, 오염되었거나 손상된 의약품은 공정거래위원회 고시(소비자분쟁해결기준)에 근거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.

대웅 (주) 대웅제약
경기도 화성시 향남읍 제암로495 423-35-14

작성연월일 : 2013. 11. 11

최종개정연월일 : 2013. 11. 11

※ 이 첨부서류 최종 개정 연월일 이후 변경된 내용은 대웅 홈페이지(www.daeuwong.co.kr) 및 소비자상담 전화번호(080-550-8308~9)에서 확인 할 수 있습니다.