

골관절염 치료제

전문

디레인 캡슐

(디아세레인)



03071-001

【분류번호】399

【원료약품 및 그 분량】1캡슐 중,

디아세레인(KFC).....50mg

· 첨가제(타르색소): 황색5호 황색 203호

【성상】황갈색의 가루가 들어있는 상부-주황색 하부-담황색의 경질캡슐

【효능·효과】골관절염관절증, 퇴행성 관절질환(

【용법·용량】성인: 디아세레인으로서 일 50~

100mg을 ~2회 분할하여 식후 경구투여 한다.

증상에 따라 적절히 증감한다.

의약품정보 : www.dkpharm.co.kr

제조의회사

동국제약

창원로 220 동국제약빌딩 3~4F

제조사

대회제약(주)

경기도 황금동 황금로 405

제조번호:



사용기한:

35 x 14mm

여기서부터 여백

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것. 1) 염증성 대장 질환(궤양성 대장염, 크론병) 2) 장폐색 증후군 환자 3) 원인불명의 복통 환자 4) 이 약 또는 이 약의 구성성분 및 Rhein계(안트라퀴논 배당체) 약물에 과민반응 환자 5) 중증의 간부전 환자 6) 15세 미만의 소아 7) 이 약은 유당수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수 장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것. 1) 소장 결장 질환의 병력이 있는 환자(이 약은 안트라퀴논류이므로 투여하지 않거나 또는 신중히 투여한다.) 2) 임부 및 수유부 3) 고령자

(용량 감소가 필요하다.) 4) 이 약은 황색 5호(산셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 이상반응 1) 소화기계: 설사, 묽은 변, 복통, 장기투여 시 위장장애출혈, 궤양 및 천공, 드물게 직장 점막의 색소 침착이 나타날 수 있다. 2) 피부: 가려움, 발진, 습진 등이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의 장기 복용할 경우 의사의 지시에 따른다

5. 상호작용 1) 칼슘, 마그네슘, 알루미늄을 함유하는 제산제 및 소금은 이 약의 위장관 흡수를 저해하므로 가능하면 2시간 이상의 간격을 두고 투여한다. 2) 이노제와 병용투여시 이노작용이 약하게 증강될 수 있다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여 1) 동물실험에서 태자의 골형성 지연이 보고 되었다. 2) 이 약이 인체 내에서 태자에 미치는 영향에 대한 자료는 없으나, 모유 중으로 안트라퀴논은 유도체가 소량 이행하므로 임부 및 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

7. 과량투여시의 처치 1) 증상: 과량투여 시 심한 설사가 나타날 수 있다. 2) 처치: 필요시 전해질 공급 등의 대증요법을 실시한다.

【저장방법】기밀용기, 실온(~30℃)보관

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품이며, 공정거래위원회고시 소비자분쟁 해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. 만약, 구입 시 사용유효기간이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다. ※첨부문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오. ※가장 최근 개정된 제품설명서의 내용 등 본 제품에 대한 정보는 식약처 의약품사이트(http://ezdrug.mfds.go.kr) 또는 당사 홈페이지(http://www.dkpharm.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다. ※제품에 관한 문의사항은 동국제약(주) 소비자상담실 ☎080-777-5678 수신자 요금 부담로 문의하십시오. ※의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.

설명서 최종 개정 연월일 2013. 10. 11