

비타민D 복합 영양제

디카맥스에브리원

디카맥스에브리원정은 야외활동이 부족하여 햇빛을 쬌기 어려운 분들, 원활한 두뇌활동이 필요한 분들에게 필요한 고용량 비타민D, 활성형 비타민B를 함유한 멀티비타민&미네랄 영양제입니다. 디카맥스에브리원정은 성장기의 자녀 뿐 아니라 노년기의 부모님, 임신·수유기의 아내, 피로에 지친 남편 등 가족 모두의 건강을 위한 선택입니다.

[원료약품의 분량] 1정 중

- 유효성분: 농축콜레칼시페롤과립(EP).....5mg (비타민D로서 500IU)
- 탄산칼슘(USP).....250mg (칼슘으로서 100mg)
- 산화마그네슘(KP).....82.92mg (마그네슘으로서 50mg)
- 산화아연(KP).....6.23mg (아연으로서 5mg)
- 푸르셀티아민(KP).....20mg
- 리보플라빈(KP).....20mg
- 판토텐산칼슘(KP).....20mg
- 파리독신염산염(KP).....5mg
- 폴산(KP).....0.1mg
- 시아노코발라민(KP).....0.1mg
- 아스코르브산과립97% (별규).....154.5mg (아스코르브산으로서 150mg)
- 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이노란색 (200F620027), 오파드라이흰색(03B28796), 전호화전분

[성상] 밝은 황백색의 타원형 필름코팅정

[효능·효과]

- 다음 경우의 비타민 D, B₁, B₂, B₆, C의 보급
 - 발육기, 육체피로, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하 시, 노년기, 임신·수유기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
 - 뼈, 이의 발육불량·구루병의 예방·각기·눈의 피로·다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

[용법·용량]

만 8세 이상 및 성인: 1일 2회 1정씩 또는 1일 1회 2정씩 복용

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유클로증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
 - 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 4) 신장결석 환자
 - 5) 심한 증상의 산부전 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계제제, 제산제
 - 2) 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 1) 만 1세 미만의 젖먹이
 - 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이

- 4) 고옥살산노증환자(hyperoxaluria: 요중에 과량의 옥살염이 배설되는 상태)
- 5) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
- 6) 심장·순환기계기능장애 환자
- 7) 신장장애 환자
- 8) 저단백혈증 환자
- 9) 강심배당체를 투여 중인 환자
- 10) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자
- 11) 신장결석 병력이 있는 환자
- 12) 임부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 구역, 구토, 설사, 묽은변, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부팽만감, 변비, 저혈압, 얼굴덜아오름, 심박동 불규칙, 피부발진, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 폐부종
- 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 3) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 4) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- 5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 우울심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 6) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.
- 7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 8) 우발적으로 과량복용한 경우
- 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용시 주의사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오.
 - 3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
 - 4) 요를 황색으로 변화게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있습니다.
 - 5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[포장단위] 120정

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30°C)보관

[최종개정연월일] 2022.12.21

[제조사] (주)다림바이오휴 강원도 원주시 지정면 신평로 33 A동 1~3층, B동 1층, S동

- ※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 의하여 생산된 제품입니다. 구입시 사용기한이 지났거나 유통기한 중 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
- ※ 이 첨부문서의 최종개정연월일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 의약품 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에 피해 구제를 신청할 수 있습니다.

dalim(주)다림바이오휴

강원도 원주시 지정면 신평로 33A동 1~3층, B동 1층, S동
대표전화: 02) 335-1656 소비자상담실: 080) 333-1656(수신자부담)
공장 및 연구소: 033) 738-4600
한국의약품안전관리원: 1644-6223, 14-3330