

피로회복·체력저하에 리액트 프리미엄정

[성 상] 적갈색의 원형 필름코팅정제

[성분·함량] 이 약1정(422mg) 중

니코틴산아미드(KP)	15mg
파리독신염산염(KP)	25mg
리보플라빈(KP)	15mg
벤포티아민(KPC)	50mg
우르소데옥시콜산(KP)	15mg
이노시톨(KP)	15mg
콜린타르타르산염(USP)	25mg

첨가제(타르색소) - 황색5호 알루미눔레이크, 적색40호 알루미눔레이크, 청색2호 알루미눔레이크

[효능·효과] 다음 경우의 비타민 B1, B2, B6의 보급 1) 육체피로 2) 임신·수유기 3) 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 4) 이 약에 함유된 비타민 등의 효능효과는 다음과 같습니다 - 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 각기, 눈의 피로, 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

[용법·용량] 성인 1일 1회, 1회 2정을 경구복용하십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오. 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 2) 만 3개월 미만의 젖먹이 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오. 1) 레보도파 3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오. 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 구역, 구토, 묽은 변, 설사 2) 파리독신을 일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다. 3) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment, 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(요산과다증)(hyperuricacidemia, 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다. 4) 우발적으로 과량복용한 경우 5) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 6) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다. 5. 기타 이 약의 복용시 주의사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오. 2) 오를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다. 6. 저장상의 주의사항 1) 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[포장단위] 자사포장단위

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

- ※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 “소비자분쟁해결기준”에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 첨부문서 최종개정연월일(2013.12.30) 이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다

제조·판매자

일양약품주식회사
경기도 용인시 기흥구 하갈로 110
소비자상담실 : 080-021-1010(수신요금부담전화)
학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 www.jiyang.co.kr

P1311-01