


생약성분의 기침 감기약 기침/가래/천식 엑스콜코프캡슐



KGMP
적격업체제품
일반의약품
등록번호 222

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐(420mg) 중

덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물(KP)	8.0mg
dL-메틸에페드린염산염(KP)	12.5mg
노스카핀(KP)	10.0mg
구아아를실폰산칼륨(KP)	45.0mg
카르비녹사민말레산염(USP)	2.0mg
카페인무수물(KP)	12.5mg
감초엑스산(생규)	23.0mg
팔루인엑스산(생규)	4.0mg
길경엑스산(생규)	29.0mg
생강엑스산(생규)	3.0mg

첨가제(타르색소) : 녹색3호, 황색203호
첨가물(동물유래성분) : 유당(젖당)수화물(소, 우유)

【성 상】 연한 갈색의 분말이 든 상 · 하루 녹색캡슐제

【효능 · 효과】 기침, 가래, 천식.

【용법 · 용량】

보통 성인(만 15세 이상) 1회 2캡슐, 만 11세이상-만 15세 미만 1½캡슐,
만 7세이상-만 11세미만 1회 1캡슐, 1일 3회 식후 30분에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 3) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 4) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance) Lapp 유당(젖당)불내효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것.

다른 진해거담제, 감기약, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염용 경구제, 멸미약, 알레르기약), 진정제.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.

- 1) 만 3개월 미만의 영아에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영 · 유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 약을 복용시키지 않도록 한다. 만 2세 미만 영 · 유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터해야 한다.
- 2) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 3) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 4) 간장질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 부종(부기), 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침할 등), 배뇨곤란 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 5) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 6) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 7) 다음과 같은 기침이 있는 사람
출연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열 · 발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진 · 발적, 가려움, 구역 · 구토, 식욕부진, 어지러움, 배뇨곤란, 목마름(지속적이거나 심한), 불안, 떨림, 불면.
2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증 증상이 나타난 경우
① 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등이 나타날 수 있다.(1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 무증, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인 되는 경우 복용을 중지할 것.)
② 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
 - 2) 소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.
 - 3) 만 7세 이하의 영·유아에게는 시럽제를 복용시킬 것.
 - 4) 복용시에는 음주하지 말 것.
 - 5) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.
 - 6) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메타이디드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.
- 6. 저장상의 주의사항**
- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것
 - 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【사용기한】 외부포장에 표기

【포장단위】 자사포장단위

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질·변패·오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회고시 소비자분쟁기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의약품정보를 참조하십시오.
- ※ 본 첨부문서 작성일자(2014년 3월) 이후에 변경된 내용은 홈페이지(www.hanpoong.co.kr) 또는 고객센터실(02-521-2618)에서 확인하실 수 있습니다.

- ※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께보관하십시오.

*첨부문서작성일 2014. 3월

제 조
판매원



한풍제약



www.hanpoong.co.kr

전라북도 전주시 덕진구 구릿길 11



고객상담실: 02-521-2618