

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

알마게이트(KP) 500mg

[성상]

박하향이 나는 흰색의 원형 정제 (앞 : JS AT)

[효능·효과]

다음 질환에 사용할 수 있다.

다음 질환의 제산작용 및 증상의 개선 : 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다(속쓰림, 구역, 구토, 위통, 신트림), 역류성식도염

[용법·용량]

성인 : 알마게이트로서 1회 1g, 1일4회, 식후 1-2시간 및 취침시에 씹어서 경구투여(복용)한다

소아(6-12세) : 성인용량의 1/2을 투여한다.

연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

다른 약물을 투여받고 있는 환자

2. 이상반응

소화기계 : 이 약을 투여하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 수 있다.

3. 일반적 주의

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.

2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 투여한다.

3) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.

4. 상호작용

1) 테트라사이클린계 항생물질의 흡수를 저해할 수 있으므로 병용(함께 사용)투여하지 않는다.

2) 이 약의 흡착작용 또는 소화관내·체액의 pH 상승에 의해 병용(함께 사용)약물의 흡수·배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 투여한다.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아)보관한다.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30°C)보관

[포장단위] 자사포장단위

[사용기간] 제조일로부터 36개월

※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

※ 사용기한이 지난 의약품은 복용하지 마십시오.

※ 이 약을 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.

※ 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)(의약품검색)을 참조하십시오.