

의약품용 봉용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

광범위 경구용 항진균제 플로칸 캡슐 (플루코나졸)

FULOCAN Cap.

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

플루코나졸 (USP) 50.0mg
첨가제(타르색소) : 청색호 적당
동물유래성분 : 유당수화물 기원동물 : 소, 사용유위 : 0

【성상】 흰색분말이 충전된 상부는 청색, 하부는 흰색의 캡슐제

【효·효과】

- 급성 또는 재발성 질칸디다증
- 면역기능이 정상인 환자 및 면역기능저하 환자 : 구강 인두, 식도, 비참성성 기관지 폐감염과 칸디다증, 피부점막 및 만성외측성 구강칸디다증의치료로 인한 구강내 통증등을 포함한 점막 칸디다증
- 칸디다혈증, 파종성 칸디다증 및 그 외의 다른 침습성 칸디다감염증(복막, 심내막, 폐, 비뇨기계) 등을 포함한 전신 칸디다증
- 면역기능이 정상인 환자 및 면역기능저하 환자(헤이즈AIDS), 장기이식 환자 또는 그 밖의 다른 면역억제요법을 받은 환자 등의 크립토쿠쿠스 수막염 및 폐, 피부 등 신체 다른 부위의 크립토쿠쿠스증
- ADS 환자의 크립토쿠쿠스증의 재발을 방지하기 위한 유지요법
- 세포독성화학요법이나 방사선요법, 골수이식으로 인한 호중구감소증으로 인해 진균감염의 위험이 있는 면역기능저하 환자의 진균감염증 예방
- 수·발성진균증, 무좀족부백선, 체부백선, 원색선박선, 어루러기 및 피부칸디다증을 포함한 피부진균 감염증

【용량·용법】

아플투여경로는 환자의 임상상태에 따라 결정한다.

경구제제의 흡수는 빠르고 거의 완전하게 흡수되므로, 경구제제·캡슐, 건조시럽과 주사제제의 투여량은 같다.

- 질칸디다증: 플루코나졸로서 150 mg 1회로 1회 경구투여
- 점막 칸디다증
 - 구강 인두 칸디다증 : 이 약으로서 보통 1회 1회 50mg을 7~14일간 투여하며 의사의 판단에 따라 연장 투여할 수 있다.
 - 만성 위축성 구강칸디다증의치료로 인한 구강 내 통증 : 이 약으로서 보통 1회 1회 50 mg을 14일간 투여하며 의치의 국소 소독을 병행해야 한다.
 - 기타 점막 칸디다증 (질칸디다증을 제외한 식도칸디다증, 비참성성 기관지 폐감염증, 칸디다노증, 피부 점막 칸디다증 등) : 이 약으로서 보통 1회 1회 50 mg을 14~30일간 투여하며 난치성 점막 칸디다증의 경우에는 1일 100mg으로 증량할 수 있다.
- 칸디다혈증, 파종성 칸디다증 및 그 외의 침습성 칸디다 감염증(복막, 심내막, 폐, 비뇨기계) 등을 포함한 전신칸디다증 : 이 약으로서 보통 첫날 400mg을 1회 투약하고 다음날부터 1회 1회 200mg을 투여하며, 환자의 반응에 따라 1일 400mg까지 증량할 수 있다. 투여기간은 임상적 반응 및 의학적 판단에 따라 결정한다.
- 크립토쿠쿠스 수막염 및 다른 부위의 크립토쿠쿠스증 : 이 약으로서 보통 첫날 400mg을 1회 투여하고 다음날부터 1일 1회 200~400mg을 투여한다. 치료기간은 임상반응 및 진균학적 반응에 의해 결정되나 보통 최소한 6~8주간 투여해야 한다.
- ADS 환자의 크립토쿠쿠스 수막염 재발 방지를 위해서는 환자가 기초 치료용 모두 받은 후 이 약으로서 1일 1회씩 최소한 100mg을 무기한 투여한다.
- 세포독성화학요법이나 방사선요법, 골수이식으로 인한 호중구 감소증으로 인해 진균 감염증의 위험이 있는 면역억진 환자의 진균 감염증 예방: 환자의 진균 감염증에 결할 위험정도에 따라 이 약으로서 1일 50~400mg을 투여하여야 한다. 전신성 진균 감염증의 위험이 매우 높은 환자, 즉 골수이식의 경우와 같이 호중구 감소증이 심하거나 호중구 감소증 기전이 될 것으로 예상되는 환자에게는 1일 400mg을 권장한다. 이러한 환자에게는 호중구 감소증이 시작되리라고 예상되는 5~6일전부터 400mg을 투여하여야 하며 호중구가 1,000 cells/mm3이상으로 증가된 후에도 1주일 동안 계속 400 mg을 투여하여야 한다.
- 수·상·발톱진균증에는 1주 1회 150 mg씩 투여하며, 투여기간은 수·발톱이 다시 자랄 때까지 (감염되지 않은 새로운 수·발톱이 자랄 때까지) 투여한다. 새로운 손톱이 자라는데 걸리는 기간은 보통 3~6개월, 발톱의 경우 6~12개월 정도 걸리며 성장속도는 개인별로 연령에 따라 다를 수 있다. 장기간 투여로 성공적으로 치료한 후 때때로 수·발톱이 손상된 채로 있는 경우도 있다. 무좀족부백선, 체부백선, 원색선박선, 피부칸디다증을 포함한 피부 진균감염증 이 약으로서 보통 1회 1회 50 mg을 1주 1회 150 mg을 2~4주간 투여한다. 그러나 무좀의 경우 경도에 따라 6주간 투여가 필요할 수도 있다. 어루러기는 1일 1회 50mg을 2~4주간 투여한다.

○소아
성인용량에 근거한 소아용량은 일반적으로 다음과 같은 기준을 적용하며, 최대 400 mg 을 초과하지 않는다. 단, 생후 6개월 미만의 영아에 대한 안전성, 유효성은 확립되지 있지 않다(사용상의 주의사항 참조).

1. 구강 인두 칸디다증 - 이 약으로서 첫날 체중 kg당 6mg을 투여하고, 다음날부터 1일 체중 kg당 3mg을 투여한다.

재발방지를 위해 최소 2주간 투여하여야 한다.

2. 식도 칸디다증 - 이 약으로서 첫날 체중 kg당 6mg이며, 다음날부터는 1일 체중 kg당 3mg을 투여한다. 환자의 반응에 따라 1일 12mg까지 증량할 수 있다.

3. 칸디다증, 증상 소실 후 적어도 2주간 투여한다.

4. 칸디다혈증, 파종성 칸디다증 및 그 외의 다른 침습성 칸디다 감염증(복막, 심내막, 폐, 비뇨기계) 등을 포함한 전신 칸디다증 - 1일 체중 kg당 6~12mg의 용량을 투여한다. 투여기간은 임상적 반응 및 의학적 판단에 따라 결정한다.

4. 크립토쿠쿠스 수막염 - 이 약으로서 첫날 체중 kg당 12mg을 투여하고, 다음날부터 1일 체중 kg당 6mg을 투여한다. 환자의 반응에 따라 1일 체중 kg당 12mg으로 증량할 수 있다. 치료기간은 뇌척수액 배양 음성 소견이 있을 후 10~12주간 동안 투여한다.

5. ADS환자의 크립토쿠쿠스 수막염의 재발방지를 위해서는 환자가 기초치료를 모두 받은 후 1일 1회 체중 kg당 6mg을 투여한다.

6. 신장에 소이는 신장애 정도에 따라 성인 신장애 환자와 동일한 기준으로 투여간격을 늘리고 용량을 줄여야 한다. 10mg/미만의 용량을 투여할 때는 정확한 양을 맞추기 위해 소아의 임상적 상태에 따라 시뮬제를 경구투여하거나, 주사제를 정맥주사 하여야 한다.

○경량자

신기능이 정상인 경우에는 보통 성인 용량을 투여하며 신장애가 있을 때에는크레아티닌 청소율 40 ml/min(이하) 투여용량을 줄이거나 투여간격을 늘려야 한다.

○신장애 환자

이 약은 변화되지 않은 채 투로 소변을 통해 배설된다. 한번만 투여하는 경우에는 용량조정이 필요 없으나 여러 번 투여해야 하는 경우에는 투여처치에만 사용량을 투여하고 다음날부터는 다음과 같이 용량을 조절해야 한다.
정기적인 투석을 받는 환자의 경우 각 투석 후에 사용량의 100%를 투여해야 한다; 투석을 하지 않는 날에는 크레아티닌 청소율에 따라 감량하여 투여해야 한다.

【사용상의주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 이 약 및 다른 부형제, 다른 이종제 약물에 과민반응의 병력이 있는 환자
2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
3) 다음의 약을 투여받고 있는 환자 - 다화용성산작용시험결과에 근거하여, 이 약물 1일 당 400mg 또는 그 이상 용량을 반복 투여 받고 있는 환자에게 테르페나딘과의 병용 - QT 간격 연장시키는 약물 및 CYP3A4에 의해 대사되는 시사프라이드, 아스테미졸, 에리트로마신, 피모진, 퀴니딘과의 병용 - 에르고타민, 디하이드로에르고타민
4) 이 약을 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 다음 환자에는 투여할 것

- 1) 약물과민반응의 병력이 있는 환자
2) 신장애 환자
3) 간장애 환자(간기능이 악화될 수 있다.)
4) 심장질환 또는 전해질이상 등 부형제의 가능성이 있는 환자(Torsades de Pointes를 포함한 심실빈맥, QT연장, 심실세동, 방실차단, 서맥 등이 나타날 수 있다.)
5) 다음의 약을 투여하고 있는 환자 - 이 약과 1회 400mg 미만 용량의 테르페나딘 병용투여 받은 환자는 신중히 모니터링 되어야 한다. - 할로판트린
6) 이 약은 강력한 CYP2C9과 CYP2C19의 억제제이며, 중증도의 CYP3A4억제제이다. 따라서 CYP2C9, CYP2C9과 CYP3A4를 통해서 대사되는 좁은 치료여간을 가진 약물과 병용 시 환자증상을 모니터링 해야 한다.

3. 이상반응

이 약은 일반적으로 내약성이 높다. 이 약과 대조약물을 투여하는 임상시험 동안, 특히 ADS 압과 같이 중대한 기저 질환을 가진 일부 환자들에서 신장 및 혈액학적 기능이상 결과변화와 간장애가 관찰되었으나, 임상적 유의성과 치료와의 인과관계는 확실하지 않다. 이 약의 치료기간 동안 아래와 같은 빈도로 다음과 같은 이상반응이 관찰 및 보고되었다: 매우 흔하게 보고된(≥1/10), 흔하게 보고된(≥1/100~<1/10), 흔하지 않게 보고된(≥1/1000~<1/100), 드물게 보고된(≥1/1000~<1/100), 매우 드물게 보고된(1/10000)
소아환자소아임상시험에서 기록된 이상 반응 및 실험실검사수치 이상(laboratory abnormalities)의 패턴과 빈도는 성인에게서 보여진 바와 유사하다.

4. 일반적 주의

1) 특히 ADS나 임과 같은 중증 기저질환이 있는 일부 환자에서 이 약의 투여기간 중 혈액학, 간성, 신장, 그 외 생화학적 기능검사에서 이상이 관찰되었으나 그 임상적인 중요성과 이 약과의 관련성에 대해서는 확인되지 않았다.
2) 매우 드물게 이 약을 수차례 병용한 적이 있는 중증 기저질환을 가진 환자의 부장에서 간과시가 관찰되었다. 이들 환자들은 간과시를 유발할 수 있는 질환을 가지고 있었거나 간독성을 유발할 수 있는 잠재적인 가능성을 가진 여러 약들을 병용하고 있었지만 이 약과의 관련성도 배제할 수 없으므로, 치료 중 이들 환자의 간효소가 이미약제 증가할 경우에는 이 약 투여에 따른 위험성과 유익성을 잘 평가해야 한다.
3) ADS 환자는 많은 약물에서 중증 피부반응을 일으키기 쉽다. 이 약과 심한 피부발에 관련이 있다고 알려진 다른 약물을 병용 투여한 결과 소수의 ADS 환자에서 그러한 피부반응의 증가가 확인되었다.
4) 신장애 환자에게 투여할 경우 투여 전에 크레아티닌 청소율을 측정해야 하며, 투여량과 투여간격을 조절하는 등 주의한다.
5) 이 약 투여 전에 혈액학적, 신기능검사, 간기능검사, 혈중 전해질검사 등을 실시하는 것을 권장한다.

5. 상호작용

1) 이 약과 다음 약물을 병용투여하지 않는다.

- (1) 시사프라이드: 이 약과 시사프라이드 병용투여 시 Torsade de Pointes를 포함한 심혈관계 이상반응이 보고되었다. 이 약200mg씩 1일 1회 투여과 시사프라이드20mg 씩1일 4회 투여 병용투여 한 통째로 임상시험에서 시사프라이드의 혈장농도 증가 및 QTc 간격 연장이 나타났다. 따라서 이 약과 시사프라이드를 병용투여하여 않는다.
- (2) 테르페나딘: 테르페나딘과 함께 이종제 항진균제를 투여 받은 환자에서서 QTc간격 연장에 따르는 중증 심부정맥이 발생되었으므로, 약물상호작용시험이 수행되었다. 이 약을 1일 200mg 투여한 시험은 QTc 간격 연장을 입증하지 못했다. 또 다른 시험이 1일 400mg, 1일 800mg 투여는 테르페나딘을 병용 시 이 약 1일 400mg 또는 그 이상 용량의 투여가 테르페나딘의 혈중 농도를 상당히 증가시킴을 보였다. 이 약 400mg 또는 그 이상의 용량과 테르페나딘을 병용투여하지 않는다.
- (3) 아스테미졸: 이 약과 아스테미졸의 병용은 아스테미졸의 청소율을 감소시킬 수 있다. 아스테미졸의 혈장농도의 증가는 QT연장 및 드물게 Torsade de Pointes를 일으킬 수 있다. 이 약과 아스테미졸을 병용투여하지 않는다.
- (4) 피모진: in vivo 및 in vitro 시험은 실시되지 않았으나, 이 약과 피모진의 병용투여가 피모진의 대사억제를 유발시킬 수 있다. 증가된 피모진 혈장농도는 QT 연장 및 드물게 Torsades de Pointes를 일으킬 수 있다. 이 약과 피모진은 병용투여하지 않는다.
- (5) 판진: in vivo 및 in vitro 실험은 실시되지 않았으나, 이 약과 퀴니딘의 병용투여는 퀴니딘의 대사억제를 유발시킬 수 있다. 퀴니딘의 투여는 QT 연장과 드물게 Torsades de Pointes의 발생과 관련 있었다. 이 약과 퀴니딘은 병용투여하지 않는다.
- (6) 에리트로마이신: 이 약과 에리트로마이신의 병용은 심독성 QT간격 연장, Torsades de Pointes 및 그에 따른 급성 심장지 위험 증가시킬 가능성이 있다. 이 약과 에리트로마이신은 병용투여하지 않는다.
- 이 약과 다음 약물을 병용투여 시 신중투여 및 용량조정이 고려되어야 한다.

다른 약물이 플루코나졸에 미치는 영향

(1) 히드로콜로코이산: 건강한 지원자를 대상으로 한 약물동력학적 상호작용시험에서 이 약과 다화용양의 히드로콜로코이산을 병용투여 시, 이 약의 혈장 농도가 40%까지 상승하였다. 이 정도 수준의 영향으로, 이노제를 병용하는 환자에서 이 약의 투여량 조절은 필요 하지 않다.

(2) 리판화산: 이 약과 리판화산을 병용투여 시 이 약의 AUC가 25% 감소하고 반감기가 20% 짧아졌다. 그러므로 리판화산과 병용 시 이 약의 증량을 고려해야 한다.

플루코나졸이 다른 약물에 미치는 영향

이 약은 강력한 CYP2C9과 CYP2C19의 억제제이며, 중증도의 CYP3A4억제제이다. 이런 언급한 관찰되고/임증된 상호작용뿐만 아니라, 이 약을 병용투여 시 CYP2C9, CYP2C9과 CYP3A4에 의해 대사되는 다른 약물들의 혈장 농도가 증가되는 위험성이 있다. 따라서 아래 약물들과 병용 시 신중함이 요구되며, 환자를 주의하여 모니터링 해야 한다. 이 약의 긴 반감기 때문에 치료 후에도 플루코나졸의 효소억제효과는 4~5일간 지속 된다.

- (1) 알펜타닐: 이 약과 알펜타닐을 병용투여 한 시험에서 알펜타닐의 반감기 증가 및 청소율과 분포용적의 감소가 관찰되었다. 이 같은 작용의 가능성은 이 약의 CYP3A4억제에 있다. 알펜타닐의 용량조정이 필요할 수 있다.
- (2) 이미트리프틸린, 노르트리프틸린: 이 약은 이미트리프틸린과 노르트리프틸린의 효과를 증가시킨다. 이 약과 병용치료 시작 시점 및 일주일 후, 5-노르트리프틸린 /5-이미트리프틸린이 측정될 수 있다. 필요 시 이미트리프틸린/노르트리프틸린의 용량이 조정되어야 한다.
- (3) 암포테리신 B: 감염상태의 정상 마우스와 면역이 억제된 마우스를 대상으로 이 약과 암포테리신 B를 동시 투여했을 때 다음과 같은 결과를 보였다: C. albicans에 의한 전신감염에서는 항진균효과가 약간 더 관찰되었음, Cryptococcus neoformans에 의한 두개내감염에서는 약물상호작용이 관찰되지 않았음, Aspergillus fumigatus에 의한 전신감염에서의 두 약물의 길항작용, 이 시험에서 얻어진 결과의 임상적 유의성은 알려진 바 없다.
- (4) 항응고제: 건강한 남자를 대상으로 한 약물상호작용시험에서 이 약은 와파린 투여 후 프로트롬빈시간(2%)을 증가시켰다. 시판 후 조사경향에서 다른 이종제 약물과 마찬가지로 이 약과 와파린을 동시에 병용투여 시 프로트롬빈시간 연장으로 인한 출혈경향성, 코피, 위장관 출혈, 혈변이 보고 되었다. 쿠미렌제 항응고제를 투여 받는 환자에서서 프로트롬빈시간을 주의하여 모니터링 해야 한다. 와파린의 용량조정이 필요할 수 있다.
- (5) 아지트로마이신: 18명의 건강한 지원자를 대상으로 한 공개, 무작위, 3병행 교차시험에서 이 약800mg 1회로 경구투여의 약동학에 대한 아지트로마이신200mg 1회로 경구투여의 영향 본 아니라 아지트로마이신의 약동학에 대한 이 약의 영향이 평가되었다. 이 약과 아지트로마이신 사이에 유의한 약동학적 상호작용은 없었다.
- (6) 벤조디아제핀계 약물속효성: 미다졸람 투여 후, 이 약으로 인해 미다졸람의 농도와 정신운동학적 효과가 상당히 증가하였다. 이러한 효과는 이 약의 주사제보다 경구제에서 더 두드러졌다. 이 약과 벤조디아제핀계 약물의 병용이 필요 시 벤조디아제핀계 약물의 강량을 고려해야 하며, 환자를 적절히 모니터링해야 한다. 이 약은 트라이azol람의 대사를 저해하기 때문에 트라이azol람(단회투여)의 AUC를 약 50% 증가시키고 Cmax는 20~32%, 반감기는 25~50% 증가시킨다. 트라이azol람의 용량조정이 필요할 수 있다.
- (7) 카르바마제핀: 이 약은 카르바마제핀의 대사를 저해하여 카르바마제핀 혈청농도가 30% 증가됨이 관찰되었다. 카르바마제핀 독성이 발생될 위험이 있다.

농도 측정 효과에 따라 카르바마제핀의 용량조정이 필요할 수 있다.

(8) 칼슘채널차단제: 특정 칼슘채널차단제(니페디핀, 이소라디핀, 안로라핀, 베라파민, 펠로디핀은 CYP3A4에 의해 대사 된다. 이 약은 칼슘채널차단제의 전신 노출을 증가시킬 가능성이 있다. 이상반응에 대해 빈번한 모니터링이 권장된다.

(9) 세라록시브: 이 약 1일 200mg과 세라록시브200mg 병용 치료 시, 세라록시브의 Cmax와 AUC는 각각 68%, 134% 증가하였다. 이 약과 병용 시 세라록시브의 투여는 절반용량으로 줄이는 것이 필요할 수 있다.

(10) 사이클로스포린: 이 약은 사이클로스포린의 AUC와 농도를 상당히 증가시킨다. 사이클로스포린 농도에 따라, 사이클로스포린 감량에 의해 이 약과 병용할 수 있다.
(11) 사이클로스포아이드: 이 약과 사이클로스포아이드의 병용요법 시 혈청 빌리루빈과 혈청 크레아티닌의 증가가 나타났다. 혈청 빌리루빈 및 혈청 크레아티닌 상승의 위험성을 신중히 고려했을 때, 이 약과 병용할 수 있다.

(12) 펜타닐: 이 약과 펜타닐의 상호작용 가능성이 있는 치명적인 사례 한 건이 보고되었다. 이것은 펜타닐 중독으로 인한 사망으로 판단되었다. 더욱이 12명의 건강한 지원자를 대상으로 한 무작위, 교차시험에서 이 약이 펜타닐 제거(elmination)를 상당히 지연시킴을 보였다. 펜타닐 농도 상승은 호흡 억제를 일으킬 수 있다.
(13) 할로판트린: 이 약은 CYP3A4에 대한 억제작용 때문에 할로판트린의 혈장농도를 증가시킬 수 있다.
(14) HMG-CoA 환원효소억제제: 이 약을 CYP2C9에 의해 대사하여: 플루바스타틴 또는 CYP3A4에 의해 대사하여: 이토라브스타틴, 심바스타틴되는 HMG-CoA 환원효소억제제와 병용투여 시 근육경직 및 횡문근융해의 위험성이 증가한다. 병용요법이 필요할 경우 환자의 근육경직 및 횡문근융해 증상을 관찰해야 하며, 크레아티닌 키나아제(creatine kinase)를 모니터링 해야 한다. 근육경직/횡문근융해가 진단, 의심되거나 크레아티닌 키나아제의 현저한 증가가 관찰된다면 HMG-CoA 환원효소억제제 투여를 중단해야 한다.

(15) 로자틴: 이 약은 치료기간 동안, 로자틴이 인조오펜테인수용체길항작용의 대부분을 담당하는 활성대사체(제-31 74)로 대사되는 것을 병해한다. 환자들은 계속해서 혈압을 모니터링해야 한다.

(16) 메사돈: 이 약은 메사돈의 혈장농도를 증가시킬 수 있다. 메사돈의 용량조정이 필요할 수 있다.

(17) 비스테로이드성 항염증제(NSAIDs): 플루비프로펜, 단독 투여에 비해 이 약과 병용투여 시 플루비프로펜의 Cmax와 AUC가 각각 23%, 88% 증가하였다. 이와 유사하게 리아세피, 이부프로펜400mg/단회투여에 비해 이 약과 병용 시 약물학적 활성 이성체인 (S-+)-이부프로펜의 Cmax와 AUC가 각각 15%, 82% 증가하였다. 특별히 연구된 바는 없지만, 이 약은 CYP2C9에 의해 대사되는 다른 NSAIDs에: 나프록센, 로낙시카, 멜록시카, 디클로페닌의 전신 노출을 증가시킬 가능성이 있다. 이상반응과 NSAIDs관련 독성에 대해 빈번한 모니터링이 권장된다. NSAIDs의 용량조정이 필요할 수 있다.
(18) 경구용 피임제: 다화용량 플루코나졸과 경구용 피임제의 병용에 관해 두 가지의 약동학적 연구가 수행되었다. 이 약 1일 200mg 투여 시 ethinyl estradiol 과 levonorgestrel의 AUC가 각각 40%, 24% 증가한 반면, 이 약 50mg을 투여한 약에 있어서는 호르몬 수치에 관련된 영향을 끼치지 않았다. 따라서 위의 용량과 같은 다화용량의 플루코나졸 투여는 경구용 피임제의 효능에 영향을 미치지 않는 것으로 보인다.

(19) 테르페나딘: 이 약은 테르페나딘의 간대사를 저해한다. 이 약과 병용투여 시 테르페나딘 독성을 피하기 위해 테르페나딘의 혈청농도를 모니터링 해야 한다.
(20) 프레디니솔론: 프레디니솔론을 투여 받던 210시 환자에서서 이 약을 3개월간 치료 후 중단 시, 급성 부신피질 기능저하가 발생했다는 사례가 보고되었다. 이 약의 중단에 의해 CYP3A4 활성기능이 야기되어 프레디니솔론의 대사가 증가되었기 때문일 것으로 여겨진다. 이 약과 프레디니솔론을 장기간 투여 받은 환자는 이 약의 중단 시 부신피질 기능저하에 대해 신중히 모니터링 되어야 한다.

(21) 리리부탄: 이 약과 리리부탄 병용 시 리리부탄의 혈청 농도가 80%까지 증가한다는 상호작용 보고가 있었다. 이 약과 리리부탄을 병용한 환자에서서 포도당염이 보고되었다. 이 약과 리리부탄을 병용 시 환자를 신중히 모니터링 해야 한다.

(22) 사쿠나비르: 이 약은 P-glycoprotein 저해 및 CYP3A4에 의한 사쿠나비르 간대사 저해에 의해 사쿠나비르의 AUC와 Cmax를 각각 약 50%, 약 55% 증가시키며 사쿠나비르의 청소율을 약 50% 감소시킨다. 사쿠나비르의 용량조정이 필요할 수 있다.

(23) 시를리루스: 이 약은 아마도 CYP3A4와 P-glycoprotein을 통한 시를리루스의 대사를 저해함으로써 시를리루스의 혈장농도를 증가시킨다. 효과/농도 측정과 다른 시를리루스의 용량조정을 고려하여 이 약과 병용할 수 있다.

(24) 설포비라이드: 건강한 지원자에 대해 이 약과 병용투여 시 설포비라이드계 약물에: 클로르포프라미드, 글리벤클리드, 글리피즈, 톨부타미드의 혈청반감기 연장을 보였다. 이 약과 설포비라이드계 약물 병용투여기간 동안 혈당에 대한 빈번한 모니터링과 설포비라이드계 약물의 적절한 감량이 권장된다.
(25) 타크롤리루스: 이 약은 장에서 CYP3A4에 의한 타크롤리루스의 대사를 저해시킴으로서 경구 투여된 타크롤리루스의 혈청농도를 5배까지 증가시킨다. 타크롤리루스를 종종 내로 투여했을 때에는 유의한 약동학적 변화가 관찰되지 않았다. 증가된 타크롤리루스의 농도는 신독성과 연관이 있다.
(26) 타크롤리루스: 이 약에 따라 경구로 투여되는 타크롤리루스의 용량을 감소시켜야 한다.

(26) 테오필린: 위약 대조 상호작용 시험에서 이 약 200mg을 14일 동안 투여 시 테오필린의 평균 혈장정상율이 18% 감소하였다. 고용량의 테오필린을 투여 받거나 테오필린 독성상징 위험이 증가된 환자들은 이 약을 투여 하는 동안 테오필린독성의 징후를 관찰해야 하며, 만약 독성 징후가 나타나 시에 치료방법은 적절한 수정되어야 한다.

(27) 토파시티딘: 토파시티딘은 중증도의 CYP3A4억제작용 및 강력한 CYP2C9 억제작용을 가지는 약물 (예: 플루코나졸과 병용투여 시 토파시티딘의 노출이 증가된다. 토파시티딘에 대한 용량 조정이 필요할 수 있다.

(28) Vmca 알칼로이드계 약물: 연구된 바가 없으나, 이 약의 CYP3A4억제 가능성에 기인하여 이 약은 vmca 알칼로이드계 약물(예: 빈크리스틴, 빈블라스틴의 혈장농도 상승과 신독성을 일으킬 수 있다.

(29) 비타민 A: A 이 약과 모든 trans-retinoic acid (비타민 A)의 생체형의 병용투여를 받는 환자들로부터 보고된 사례에 따르면 중증신경계(ONS)와 관련해 의도하지 않았던 이상반응으로서 가장 빈종임이 나타났으며, 그것은 이 약의 치료 중단 후에 사라졌다. 이 약과의 병용이 중증신경계 관련 이상반응이 있음을 명심해야 한다.

(30) 지도부탄: 이 약이 경구용 지도부탄의 청소율을 약 45% 감소시켰기에 따라 지도부탄의 Cmax와 AUC를 각각 84%, 74% 증가시킨다. 지도부탄의 반감기는 이 약과의 병용 후 약 128%까지 연장된다. 이 약과 지도부탄을 병용투여 받은 환자들은 지도부탄 관련 이상반응 발생에 대해 모니터링되어야 한다. 지도부탄의 감량이 고려될 수 있다.

(31) 내인성스테로이드: 이 약 1일 50mg 투여는 여성의 내인성 스테로이드 농도에 영향을 주지 않았다. 1일 200~400mg 투여는 건강한 남성 지원자의 부신피질 지출 호르몬 자극반응에 내인성 스테로이드 농도에 영향을 주지 않았다.

(32) 보리코나졸(CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4 저해제): 이 약의 경구용 제제(캡슐) 400 mg 투여 후, 4일 동안 24시간 마다 200 mg 투여와 경구용 보리코나졸(캡슐) 120mg마다 400 mg 투여 후, 2일 동안 12시간마다 200 mg 투여를 6명의 건강한 남성 피험자에게 병용투여 시 보리코나졸의Cmax와 AUC는 각각 평균적으로 57%(90% C: 20%, 107%), 79%(90% C: 40%, 128%) 증가했다. 이에 이어진 8명의 건강한 남성 피험자를 포함한 임상시험에서 보리코나졸과 플루코나졸의 투여량 감소 그리고또는 투여반도 감소는 이러한 작용을 없애거나 감소시키지 못했다. 이 약과 보리코나졸의 병용투여는 어떠한 용량에서도 권장되지 않는다.

상호작용 시험은 이 약의 경구제와 음식 시미테딘, 제산제, 골수이식에 대한 전신방사선요법과의 병용 시 임상적으로 유의할만한 이 약의 흡수증가가 일어나지 않았음을 보였다. 차변은 이 약과 상호작용시험이 수행되지 않은 다른 약물들에 대해서도 상호작용이 일어날 수 있음을 인지하여야 한다.

6. 임부, 수유부, 기임여성에 대한 투여

1)임부

임신 첫3개월(1st trimester)에 플루코나졸 200mg 1회로 용량 (단회 또는 반복투여)으로 치료받은 임신부 수백명의 자료에 의하면, 이 약으로 인해 태아에게 발생하지 않은 영향은 없었다. 루시디2010 데스진군중에 대해 3개월 또는 그 이상의 기간 동안 고용량의 플루코나졸(일 400~800mg)을 투여 받은 임신부의 경우, 영아에서 다발성 선천성 기형이 보고 되었다. 플루코나졸의 사용과 이러한 부작용 발생 사이의 상관관계 명확하지 않다. 동물에서는 모체에 독성이 나타날 정도의 고용량에서만 태자에 대한 부작용이 확인되었다. 5mg/kg 또는 10mg/kg의 용량은 태자에 영향을 끼치지 않았다. 25mg/kg, 50mg/kg 및 그 이상의 용량에서 태자의 해부학적 변형과 기능, 신우확장) 증가 및 골화 지연이 관찰되었다. 80mg/kg/1일 간격용량의 약 20~60배~320mg/kg의 용량에서는 캐트와 태자지(kernybirth defects)가 증가하였으며 파형능, 구개열, 비정상적인 두개안면부 골화를 포함한 태아의 기형이 있었다. 이러한 영향들은 캐트에서의 에스트로겐 합성 억제 시 동일하게 나타나며, 임신, 기관발생, 분만 시는 에스트로겐 농도가 낮아짐으로 인한 것이 알려지 있는 결과 때문일 수 있다. 발표된 몇몇의 중태보고는 임신 첫 3개월 (1st trimester)의 모든 또는 대부분의 기간 동안 고용량의 플루코나졸(일 400~800 mg)을 투여 받은 임신부의 영아에서 두드러지고 드문 형태의 출생(형birth defects)이 나타났을 것으로 보인다. 이러한 영아에서 발견되는 특징은 다음을 포함한다: 입파마리증, 비정상성 얼굴, 비정상적 머리발레(배꼽 발달, 구개열, 대퇴부 휨(temoral bowing), 얇은 갈비뼈, 간백, 관절염증증, 선천적 심장 질환, 입부에 대한 이 약의 투여는 피해야 한다.

2)수유부

이 약은 혈청과 비슷한 농도로 모유에서 발견되었다. 따라서 수유부에게 이 약을 투여하지 않는다.

7. 소아에 대한 투여

생후 6개월 미만의 영아에 대한 이 약의 안전성, 유효성은 확립되지 않았다. 그러나 일부 소아/생후 1일부터 6개월까지의 29명의 영아에서 이 약이 안전하게 사용되었다는 자료가 있으며, 이 약의 투여가 꼭 필요하다고 판단되는 경우에만 투여한다.

8. 운전과 기계 조작에 미치는 영향

운전 및 기계 조작 시 때때로 현기증 및 발작이 일어날 수 있으므로 주의해야 한다.

9. 과량투여시의 처리

- 1) 이 약을 과량복용 시 화학, 편광성 행동이 나타났다는 보고가 있었다.
- 2) 과량투여 시 대용요법/필요 시 지지요법 및 위생적이 적절할 수 있다.
- 3) 이 약은 대부분 소변으로 배설되므로 소변양을 증가시키면 이 약의 배설율이 증가될 것이다. 3시간동안 혈액투석을 하면 혈장농도가 거의 50%정도 감소된다.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(~30℃)

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 30캡슐, 100캡슐

※ 위용용어 : 아래 용어 설명을 참조하시기 바랍니다. (가나다 순서)

1. 간부전: 간기능상승 2. 감염: 출진 3. 경구투여: 먹는다. 복용한다
4. 고장: 복배 5. 골화 지연: 뼈발달지연
6. 구강: 입만 7. 길항작용: 억제작용, 대항작용
8. 내약성: 약에 대한 내성
9. 농도: 고혈당증
10. 뇌극: 갈비뼈
11. 다발성: 여러 부위에서 동로에 나타나는 12. 단회투여: 1회 투여
13. 담즙유출: 쓸개즙분출
14. 대용요법: 중증질환 치료하는 방법
15. 병용: 함께 복용(사용)
16. 부종: 부기
17. 빈맥: 빠른맥
18. 병용: 임상적으로 사용
19. 서맥: 느린 맥
20. 서동: 진 뜸떨기
21. 소실: 없어짐
22. 신독성: 신장독성
23. 아나필락시스: 과민성 반응
25. 영아: 젖먹이
26. 임신: 젖먹이
27. 임신: 젖먹이
28. 임신: 젖먹이
29. 임신: 젖먹이
30. 임신: 젖먹이
31. 임신: 젖먹이
32. 임신: 젖먹이
33. 임신: 젖먹이
34. 임신: 젖먹이
35. 임신: 젖먹이
36. 임신: 젖먹이
37. 임신: 젖먹이
38. 임신: 젖먹이
39. 임신: 젖먹이
40. 임신: 젖먹이
41. 임신: 젖먹이
42. 임신: 젖먹이
43. 임신: 젖먹이
44. 임신: 젖먹이
45. 임신: 젖먹이
46. 임신: 젖먹이
47. 임신: 젖먹이
48. 임신: 젖먹이
49. 임신: 젖먹이
50. 임신: 젖먹이
51. 임신: 젖먹이
52. 임신: 젖먹이
53. 임신: 젖먹이
54. 임신: 젖먹이
55. 임신: 젖먹이
56. 임신: 젖먹이
57. 임신: 젖먹이
58. 임신: 젖먹이
59. 임신: 젖먹이
60. 임신: 젖먹이
61. 임신: 젖먹이
62. 임신: 젖먹이
63. 임신: 젖먹이
64. 임신: 젖먹이
65. 임신: 젖먹이
66. 임신: 젖먹이
67. 임신: 젖먹이
68. 임신: 젖먹이
69. 임신: 젖먹이
70. 임신: 젖먹이
71. 임신: 젖먹이
72. 임신: 젖먹이
73. 임신: 젖먹이
74. 임신: 젖먹이
75. 임신: 젖먹이
76. 임신: 젖먹이
77. 임신: 젖먹이
78. 임신: 젖먹이
79. 임신: 젖먹이
80. 임신: 젖먹이
81. 임신: 젖먹이
82. 임신: 젖먹이
83. 임신: 젖먹이
84. 임신: 젖먹이
85. 임신: 젖먹이
86. 임신: 젖먹이
87. 임신: 젖먹이
88. 임신: 젖먹이
89. 임신: 젖먹이
90. 임신: 젖먹이
91. 임신: 젖먹이
92. 임신: 젖먹이
93. 임신: