

<조제용>

일반의약품 / 분류번호:234

R-03.0-APZ

게이트정

500정

(알마게이트)

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

- 유효성분 : 알마게이트(KP) 500mg
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소/우유)
- 기타 첨가제 : 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 콜로이드성아산화규소

[성상] 흰색의 타원형 정제

[효능·효과]

다음 질환의 제산작용 및 증상의 개선 : 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다, 속쓰림, 구역, 구토, 위통, 신트림

[용법·용량]

성인 및 12세 이상의 소아 : 알마게이트로서 1회 1g을 1일 3회, 식후 30분~1시간에 씹어서 경구 복용한다. 필요시 취침 전에 1회 더 복용할 수 있다.

[제조외의자] 오스틴제약(주)

경기도 안산시 단원구 성곡로 146번길 20

[제조사] 오스틴파마주식회사

충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 265

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성 성분에 대해서 과민반응이 있는 환자
- 2) 알츠하이머병 환자
- 3) 치질 환자
- 4) 체액 저류(부기) 환자
- 5) 임신 중독증 환자
- 6) 설사 환자
- 7) 진단되지 않은 소화 기관 출혈 환자
- 8) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp lactase deficiency 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

테트라사이클린계 항생물질(함께 복용시 흡수를 억제할 수 있음)

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 : 이 약의 흡착작용 또는 소화관 내 체액의 pH 상승에 의해 함께 복용하는 약물의 흡수배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 복용한다.

(1) 비스테로이드소염진통제(NSAID), 궤양 치료제, 디기탈리스 제제, 클로르프로마진, 란소프라졸, 프레드니솔론, 페니실린, 퀴놀론, 철(Fe)염 제제 : 흡수를 감소시킬 수 있으므로 2~3 시간 간격을 두고 복용한다.

(2) 살리실산염 : 신장의 배설을 증가시킨다.

2) 신장에 환자 : 마그네슘 또는 알루미늄이온이 오랜 기간 동안에 걸쳐 콩팥에 축적될 수 있다. 심한 신장에 환자에게는 권고되지 않는다.

3) 신체 허약자, 인 함량이 낮은 식이 요법 실시자, 소화 흡수 장애가 있는 사람 : 이 약의 알루미늄염이 인 흡수를 감소시키므로 장기간 복용할 경우, 혈중 인산염함량 감소 및 뼈의 무기질 침착장애를 야기할 수 있음.

4) 고령자(노인)

5) 혈액구토 또는 흑색 대변 등과 같은 소화기관 출혈 증상이 있는 환자

6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 소화기계 : 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사
- 2) 2주 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법용량을 잘 지킬 것.
- 2) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 복용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
- 3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

[저장방법] 밀폐용기, 실온보관(1~30°C) **[포장단위]** 500정/병

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 작성일(2026.08.07) 이후 변경된 내용은 홈페이지 <https://jeyak.co.kr>이나 소비자상담실(080-010-5510)로 문의 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

※ 부작용보고 및 피해구제신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

50x20

