

진해거담제 & 기침감기약

레드보르정

(레보드로프로피진)

Redbor Tab.

레드보르정은 기관지염이나 천식 등에 의한 기침을 효과적으로 억제하며, CNS부작용이나 소화기계 부작용율이 낮은 안전한 제제입니다.

【약리 작용】

말초신경 C-fiber의 활성화 억제를 통해 Neuropeptide의 유리를 억제 및 RARs의 활성을 억제하여 기침유발을 억제하며, 기관지염증 유발 및 기관지 경축, 점액과다분비, 모세혈관의 투과성증가를 억제함으로써 진해효과를 나타냅니다.

【특 장 점】

- 1) 빠른 약효 발현시간
- 2) 타제제와 안전한 병용투여
- 3) 낮은 중추 부작용

【원료약품의 분량】 1정 중

레보드로프로피진(EP)..... 60mg

첨가제(동물유래) : 유당수화물 <기원동물 : 소, 사용부위 : 우유>

【성 상】 흰색 원형 정제

【효능 · 효과】 다음 질환에서의 기침 : 급 · 만성기관지염

【용법 · 용량】

성인 : 레보드로프로피진으로서 1회 60mg을 1일 3회 적어도 6시간 간격을 두고 경구투여한다. 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자
 - 2) 기관지 점액 분비 증가 환자
 - 3) 점액섬모기능이상(카르타게너증후군, 섬모이상운동증) 환자
 - 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 - 5) 중증의 간장애 환자
 - 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactose deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucosegalactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 1) 중증 심부전 및 중증 신장부전 환자
 - 2) 고령자
 - 3) 만 2세 미만의 영아
3. 이상반응
 - 1) 소화기계 : 구역, 탄산증, 소화불량, 설사, 구토
 - 2) 중추신경계 : 피로, 기능쇠약, 반수, 혼수, 두통, 어지러움
 - 3) 순환기계 : 심계항진
 - 4) 피부 : 매우 드물게 알레르기 반응
4. 일반적 주의

드물게 반수상태가 초래되므로 운전이나 기계 조작 시 주의하며, 특히 알코올과 병용시 작용이 증대 될 수 있다.
5. 상호작용

예민한 환자에게 진정제와 병용투여 시 주의한다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여

임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부에는 투여하지 않는다.
7. 보관 및 취급상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나, 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 주의한다.

【포 장 단 위】 자사포장단위

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 본 제품에 대하여 자세한 정보를 원하시는 분은 소비자상담실(☎031-377-7909)로 문의하시기 바랍니다.

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.

HUTECS

한국유텍스제약(주)

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 99

제조외지자 : 한국유텍스제약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 99

제 조 자 : 위더스제약(주) 경기도 안성시 미양면 제2공단2길 103

우수의약품제조관리기준

KGMP 적격지정업체

설명서 작성일 121123