CHO-A PHARM.CO.,LTD.	DESIGN TEAM
제 품 명 :	[수정/약국] '콜콜-은교' 캡슐(경진제약 위탁생산)
포 장 형 태 :	자동카토너형 종이케이스
규 격 :	105(가로) × 68(세로) × 16(높이) mm - 위탁처 판형 적용(기존 동일)
재 질 :	CCP지 300g/m²
코 팅 :	유광라미네이팅
색상 및 인쇄 :	원색 4도 + 별색 1도(진갈색 : Pantone No.1817c), 칼라 옵셋인쇄
인쇄색상기준 :	■기 지정 표준안 □교정지 □현장감리 ■기타 : 색상 선명하게
전송처 : 경진제약사	전송일자 : 2025. 1. 작업자 : 이지민 차장

별색 : 갈색 1도
(Pantone No.1817c)

판형은 인쇄전 한번 더 확인 후 진행해 주시기 바랍니다.

기존 색상 참고하여 인쇄요망!

【성 상】 갈색의 분말이 충전된 상부 갈색, 하부 흰색의 경질캡슐제
【수신자부담고객상담실】 080-988-8888
【제조의뢰자】 조아제약(주) 경상남도 함안군 함안면 광정로 318
【제 조 자】 경진제약(주) 경기도 이천시 율면 일생로 406번길 6
※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국에서 교환해 드립니다. ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품안전나라(https://nedrug.mfds.go.kr)를 참조하십시오.
※ 의약품의 정상적인 사용에도 불구하고, 부작용이 발생하는 경우 부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)에 할 수 있습니다.
개정연월일 : 2025. 01. 22 (Rev.6)

일반의약품 정보

이 약을 사용하기 전 반드시 포장의 기재사항을 확인하세요

[유효성분] 1캡슐 중

금은화(KP)	710 mg	담죽엽(생규)	284 mg
연교(KP)	710 mg	형개(KP)	284 mg
박하(KP)	426 mg	두시(생규)	356 mg
길경(KP)	426 mg	우방자(KP)	356 mg
감초(KP)	426 mg	영양각(생규)	22 mg

-- 이상 건조엑스로서 500 mg --

[효능·효과] ■ 감기로 인한 목구멍 통증, 목마름, 기침, 두통

[용법·용량] ■ 보통 성인 1회 2캡슐, 7~14세 1캡슐을 1일 3회 식전 또는 식간에(식사때와 식사때 사이에) 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말것. 1) 5세 미만의 영·유아(영아·젖먹이) 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당·갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. **2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.** 1) 고혈압 환자 2) 심장애 또는 신장애(신장장애) 환자 3) 부정(부기) 환자 4) 몸이 허약한 환자(체력이 쇠약해진 환자, 몸이 약한 환자) 5) 위장이 허약한 환자 6) 지금까지 약에 의해 발진·발적(충혈되어 붉어짐) 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자 7) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자) 8) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 9) 고령자(노인(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것) **3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.** 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 (1) 위알도스테론증: 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감초로서 1 g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등이 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.) (2) 근병증(근육병증): 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지(팔다리)경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것. (3) 피부: 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등 (4) 소화기계: 식욕부진, 위부불쾌감, 구역 등 2) 수일간 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 **4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항** 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 복용시킬 것. 4) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메티아지드)와 병용(함께 복용)시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것. 5) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것. **5. 저장상의 주의사항** 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것). 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

일반의약품 정보 [계속됨]

[저장방법] ■ 기밀용기, 실온(1~30 ℃)에서 보관
■ 어린이의 손에 닿지 않게 보관

[사용기한] ■ 제품 옆면 표시일까지(연. 월. 일)

[첨가제] ■ 첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호, 황색203호 ■ 동물유래성분 : 유당수화물(소, 우유), 영양각(영양, 뿔) ■ 기타 첨가제 : 스테아르산마그네슘, 캡슐(상부 갈색, 하부 흰색), 콜로이드성이산화규소