

마그네슘 · 비타민D 함유 칼슘제

본본

연질
캡슐

Bone Born
Soft caps.



【원료약품 및 그 분량】1캡슐(1,820 mg) 중

인산수소칼슘수화물(KP)	620.00 mg
(칼슘으로서 144.40 mg, 인으로서 111.59 mg)	
글루콘산칼슘수화물(KP)	100.00 mg
(칼슘으로서 8.94 mg)	
산화마그네슘(KP)	10.00 mg
(마그네슘으로서 6.03 mg)	
농축클레칼시페롤(유상)(BP)	0.80 mg
(비타민D로서 800 IU)	

착색제(천연색소) : 카카오색소, 치자청색소

【성상】

유백색의 유상 내용물을 함유한 암갈색의 장방형 연질캡슐

【용법 · 용량】

만 12세 이상 및 성인 1회, 1회 1캡슐 복용

【효능 · 효과】

- 다음 경우의 비타민 D의 보급 : 임신 · 수유기, 발육기, 노년기

- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다 : 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유훈종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염종질환), 신장(콩팥)질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 4) 신장(콩팥)결석 환자
- 5) 심한 증상의 신부전 환자
- 6) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 7) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 만 1세 미만의 젖먹이
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
- 4) 임부 및 임신하고 있는 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다
- 5) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 6) 신장(콩팥)장애 환자
- 7) 저단백혈증 환자
- 8) 감심배당체를 투여 중인 환자
- 9) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자
- 10) 임부
- 11) 고지단백혈증, 당뇨병성고지혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 꼭각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 일골달아오름, 심장동맥결막, 피부발진, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하
- 2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다
- 3) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다
- 4) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것
- 5) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 열장 지질제를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정중용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【포장단위】 60, 120연질캡슐

【저장방법】 기밀용기, 실온($\sim 30^{\circ}\text{C}$)보관

【사용기간】 제조일로부터 24개월

【소비자 상담실(반품 및 교환처)】 02-568-0051

【판매원】 광동제약(주) 서울시 서초구 서초중앙로 85 가산빌딩

【제조원】 (주)알피코프 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 본 제품은 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 설명서 작성일자(2014년 01월) 이후 변경된 내용은 이지드렉(<http://ezdrug.mfds.go.kr/kda2>)에서 확인하실 수 있습니다.

작성일 : 2014년 01월