



전문의약품
분류번호:117
정신신경용제

부스원정 5mg
10mg

(부스피로염산염)

부스원정 5mg
10mg

(부스피로염산염)

전문의약품

분류번호:117

정신신경용제

[원료약품 및 그 분량]

-5mg
1정 중
주성분: 부스피로염산염(USP).....5mg
동물유래성분: 무수유당, Food grade Cow's milk
-10mg
1정 중
주성분: 부스피로염산염(USP).....10mg
동물유래성분: 무수유당, Food grade Cow's milk

[성상]

-5mg: 양면 불룩한 장방형의 흰색 정제
-10mg: 양면 불룩한 장방형의 흰색 정제

[효능·효과]

불안장애의 치료 또는 불안증상의 단기완화

[용법·용량]

성인: 초회량으로 부스피로염산염으로서 1회 5mg 1일 3회 경구투여한다.
필요에 따라 적정치료반응을 얻기 위해 2-3일 간격으로 1일 5mg씩 증량하여 1일 20-30mg을 분할투여하는 것이 바람직하다. 1일 총투여량은 60mg을 초과하지 않는다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 중증의 간·신장에 환자(이 약은 주로 간장에서 대사되고 신장에서 배설된다.)
- 3) 간질 환자
- 4) 급성 혈우각형 녹내장 환자
- 5) 중증의 근무력증 환자
- 6) MAO억제제를 투여중인 환자
- 7) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에는 투여하면 안 된다.

2. 부작용

- 1) 순환기계: 비특이성 흥분, 때때로 심신, 고혈압 및 저혈압, 드물게 뇌혈관 질환, 율혈성 심부전, 심근경색, 심근병증, 서맥 등이 나타날 수 있다.
- 2) 중추신경계: 수면장애, 졸음, 어지러움, 신경통, 흥분, 불면, 때때로 이인성, 불쾌감, 소용돌이감, 다행증, 장시간 정좌불능증, 공포감, 의욕 상실, 의식분열반응, 환각, 자살관념 작용, 편진증, 드물게 밀실공포증, 냉감불내성,

혼미, 언어장애, 정신병 등 나타날 수 있다.

- 3) 안: 이비인후과: 이명, 인후통, 비후혈, 때때로 안홍혈, 가려움, 이기(altered taste), 이후(altered smell), 결막염, 드물게 내이이상, 안통, 눈 부시, 안압상승 등이 나타날 수 있다.
- 4) 내분비계: 드물게 유즙분비, 갑상선 이상이 나타날 수 있다.
- 5) 소화기계: 때때로 복부팽만감, 식욕부진·증가, 타액분비, 과민성 장, 적장출혈, 구역, 드물게 혀의 작열감이 나타날 수 있다.
- 6) 비호르몬성기: 때때로 빈뇨, 배뇨감, 무뇨, 성욕증가·감소, 드물게 무월경, 신우염, 유노증, 야뇨증, 사정지연, 발기부전 등이 나타날 수 있다.
- 7) 근골격계: 때때로 근통, 근경축, 관절통 등이 나타날 수 있다.
- 8) 신경계: 때때로 불수의운동, 반사시간지연, 드물게 근무력증이 나타날 수 있다.
- 9) 호흡기계: 때때로 과호흡, 빈호흡, 흉부울퉁, 내출혈이 나타날 수 있다.
- 10) 피부: 때때로 부종, 가려움, 홍조, 체모소실, 피부건조, 안면부종, 수포, 드물게 좌창, 조갑비후, 쉽게 멍들이 나타날 수 있다.
- 11) 간장: 때때로 ALT, AST의 상승이 나타날 수 있다.
- 12) 혈액: 드물게 호산구증가, 백혈구감소, 혈소판감소가 나타날 수 있다.
- 13) 신경이원적증후군(Neuroleptic Malignant Syndrome): 운동마비, 심한 근육강직, 연하곤란, 빈맥, 혈압변화, 발한 등이 나타나고 이러한 증상과 함께 발열이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 체온강조와 수분보급 등의 전신적 치료와 함께 적절한 처치를 한다. 이 증상의 발현시에는 백혈구증가, 혈청 CPK 상승이 자주 나타나고 미오글로빈뇨를 수반한 신기능저하가 나타날 수 있다. 또한 고열이 지속되고 의식장애, 호흡곤란, 순환허탈과 탈수증상, 급성 신부전으로 발전해서 사망했다는 보고가 있다.
- 14) 기타: 때때로 체중감소·증가, 발열, 혼란감, 불쾌감, 두통, 피로, 드물게 알코올냄, 출혈성 장애, 음성상실, 말실격 등이 나타날 수 있다.

3. 일반적 주의

- 1) 이 약의 항정신병작용은 아직 정립되지 않았으므로 항정신병약으로는 사용하지 않는다.
- 2) 각 환자에 대한 이 약의 중추효과는 예견할 수 없으므로 이 약 투여가 환자에게 바람직하지 않은 작용을 미치지 않는다는 것이 확인될 때까지는 자동차단성 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
- 3) 진정·수면·항불안·외존성 환자에서의 금단증상: 이 약은 벤조디아제핀계 약물 및 다른 진정수면제와 교차내성을 나타내지 않으므로 이러한 약물의 투여중지에 따른 중증 관촬되는 금단증상은 억제하지 못한다. 그러므로 이 약 투여전에 특히 중추신경억제제를 오랫동안 사용해 온 환자들은 이전에 투여해 온 약물을 천천히 감량하는 것이 바람직하다. 반동 또는 금단증후군은 그 발현기간이 약물의 종류 및 그 제거반감기에 따라 다르다. 진정·수면·항불안·외존성 금단증후군은 초조, 불안, 주저, 불면, 진전, 복통, 근통, 구토, 발한, 무당감각이상 증상, 때로는 편진증과 같은 증상들이 복합적으로 나타날 수 있다.
- 4) 이 약의 도파민수용체와의 결합과 관련된 영향: 이 약은 중추도파민수용체와 결합할 수 있으므로 도파민중추신경기능의 금단성변화(이진증, 율파킨슨증, 장시간 정좌불능, 지발성 운동장애 등) 유발가능성에 대한 의문이 제기되어 왔다. 대조임상시험에서 현저한 유사신경이원화과는 관찰되지 않았으나 이 약 투여 환자에서 일부에서 투여개시 직후에 초조증상이 발현되었다는 보고가 있다. 이러한 증상은 이 약의 중추노르도르레날린 작용효과와 또는 도파민양호과(장시간 정좌불능 등) 등에 기인될 수 있으나 그 확실한 기전은 아직 불분명하다.

4. 상호작용

- 1) 이 약과 다른 항정신성 약물과의 병용투여효과는 아직 연구되어 있지 않으므로 이 약을 다른 중추신경작용약물과 병용투여하는 경우에는 주의한다.
- 2) 이 약과 알코올과의 상호작용 연구결과, 이 약은 알코올이 유발시킨 운동 및 정신기능장애를 증가시키지 않는다고 보고되어 있으나 이 약과 알코올은 병용투여하지 않는다.
- 3) 이 약과 트라조돈의 병용투여시 ALT가 3-6배 증가되었다는 보고가 있었으나 이 현상은 일시적이며 시도한 비슷한 실험에서는 간트랜스아미나제에 대한 상호작용은 인정되지 않았다.
- 4) 이 약은 페니토인, 프로프롤나롤, 오프라빈 등 혈청 단백질과 강하게 결합하는 약물은 치환시키지 모르나 디곡신과 같이 약하게 결합하는 약물은 치환시킬 수 있다. 그러나 이러한 특성의 임상적 중요성은 알려지지 않았다.

5) MAO저해제와 병용투여시 혈압이 상승될 수 있으므로 병용투여하지 않는다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 2) 동물실험(랫트)에서 이 약 및 그 대사물의 모유중으로의 이행이 보고되어 있으므로 투여중에는 수유를 피한다.

6. 소아에 대한 투여

18세 이하의 소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않다.

7. 과량투여시의 처치

- 1) 증상 : 건강한 남성자원자에게 1일 375mg을 투여한 경우에 구역, 구토, 어지러움, 졸음, 축농, 위장장애 등이 관찰되었으며 고의 또는 사고로 이 약을 과량투여한 경우의 사망에는 보고된 바 없다.
- 2) 처치 : 일반적인 대중 및 보조요법을 위생척과 함께 실시하며 호흡, 맥박, 혈압을 모니터한다. 이 약의 특별한 해독제는 알려져 있지 않으며 투석용이성도 결정되지 않았다.

8. 적응상의 주의

- 1) 이 약의 안전하고 효과적인 사용을 위해 다음 정보 및 지시사항을 환자에게 숙지시킨다.
 - ① 현재 투여중이거나 이 약 투여중에 사용하려고 계획하고 있는 약물 또는 알코올의 섭취여부에 관하여 의사에게 알린다.
 - ② 임신중 또는 임신을 계획하고 있거나 이 약 투여중에 임신하게 되면 의사에게 그 사실을 알린다.
 - ③ 수유하고 있으면 의사에게 그 사실을 알린다.
- 2) 이 약이 신체의존성이나 탐닉성을 유발한다는 직접적인 증거는 없으나 시판후 중추신경작용약물의 오·남용정도를 예측하기는 어려우므로 약물남용의 병력 환자에 대해서는 세심한 평가가 필요하며 이 약의 오·남용증상(내성, 용량증가, 탐닉 등)을 면밀히 관찰한다.

[저장방법]

차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위]

30정, 100정

※ 의약품용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약도서관

(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품을 구입하였을 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 소비자 상담전화 : 080-577-8004(수신자 요금부담서비스)

작성년월: 2014. 01.
개정년월월: 2014. 03. 14 (M02)



제조 · 판매원

하나제약주식회사

하일공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약단지로 13-39