



(01)08806252003415
(17)150611
(10)10113001

※ 어린이 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
※ 본제품은 흡수성이 우려되므로 방습 Alu-Alu 포장 상태로 조제하여 주십시오.
※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과하였거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.
※ 작성일자 이후 변경된 내용은 이지드렉(<http://ezdrug.mfds.go.kr>)→[정보마당]→[의약품정보] 또는 소비자 상담실 031-359-9500에서 확인할 수 있습니다.

작성일 : 2013. 12. 21 (Rev. 0)

제조번호 : 10113001

[제조외곽자] (주)화이트제약 / 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 89

사용기한 : 2015. 06. 11.

[제 조 자] 위더스제약(주) / 경기도 안성시 미양면 제2공단2길 103

전문의약품

분류번호 : 기타의 순환계용약 219

뇌기능 개선제

아로세틴 정

아세틸-L-카르니틴염산염 500mg

자세한 제품정보
www.whpharma.com

60정

제조외곽자
(주)화이트제약
www.whpharma.com
경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 89

[원료약품 및 분량] 1정 중

아세틸-L-카르니틴염산염(KPC) 590mg

(아세틸-L-카르니틴으로서 500mg)

[성 상]

흰색의 장방형의 제피정

[효능·효과]

일차적 퇴행성 질환 또는 뇌혈관 질환에 의한 이차적 퇴행성 질환

[용법·용량]

아세틸-L-카르니틴으로서 1회 500 mg을 1일 2~3회 경구투여한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음환자에는 투여하지 말 것 : 이 약에 대해 과민반응을 나타내는 환자

2. 이상반응 : 이 약의 복용 시 드물게 흥분작용이 나타나는 경우가 있으나 체내의 약물량이 감소함에 따라 이런 증상은 바로 소실된다.

3. 상호작용 : 다른 약물과의 상호작용은 없는 것으로 알려져 있다.

4. 임부 및 수유부 등에 대한 투여 : 동물실험에서의 태아독성은 보고된 적이 없지만 임신 초기 3개월 기간과 수유기의 여성은 꼭 필요한 경우에만 의사와 감독하에서 복용할 것.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

전문의약품

분류번호 : 기타의 순환계용약 219

Cerebral Activator

AROCETIN Tab.

Acetyl-L-Carnitine · HCl 500mg

자세한 제품정보
www.whpharma.com

60Tabs.

WHITE
www.whpharma.com