

속쓰림, 위산과다, 신트림

큐티딘 75mg

(라니티딘염산염)



큐티딘정은 H₂-수용체에만 선택적으로 작용하는 제제로서 단순히 위내 과량의 산 중화에 의해 일시적으로 증상을 완화시켜 빈번히 복용해야하는 제제와는 달리 위산분비억제 효과가 12시간 동안 지속되므로 속쓰림, 위산과다, 신트림에 1일 2회 편리한 복용으로 충분한 효과를 발휘합니다. 또한 이상반응 발현율과 약물상호작용이 적어 내약성이 뛰어난 위산분비 억제제입니다.

【약리작용 및 특징】**위산분비 억제작용**

위벽세포의 H₂-수용체에만 선택적으로 작용하는 위산분비억제제입니다. 그 효과는 기존 H₂-수용체차단제에 비해 4~9배나 강력하여 십이지장궤양 환자에게 150mg씩 1일 2회 투여시 24시간 평균산분비를 69% 야간산분비를 90% 억제시켜 줍니다.

우수한 지속작용

큐티딘정은 단순히 위내 과량의 산 중화에 의해 일시적으로 증상을 완화시켜 빈번히 복용해야하는 제제와는 달리 위산분비억제 효과가 12시간 동안 지속되므로 속쓰림, 위산과다, 신트림에 1일 2회 편리한 복용으로 충분한 효과를 발휘합니다.

뛰어난 치료효과

큐티딘정은 효과적인 위산분비 억제작용으로 속쓰림(heartburn), 특히 빈번하게 발생하는 식사에 의한 속쓰림에 효과적입니다. 248명의 속쓰림 환자들을 두 군으로 나누어 4~14일 동안 식전 30분에 대조약과 Ranitidine 75mg은 속쓰림을 효과적으로 개선했습니다.

뛰어난 내약성

큐티딘정은 세계적으로 널리 사용되고 있는 Ranitidine 제제로 이상반응 발현율과 약물상호작용이 적어 내약성이 뛰어나다는 것이 입증되었습니다.

【원료약품의 분량】 1정중

라니티딘염산염 (USP) 84mg
(라니티딘으로서 75mg)

【성 상】 분홍색 원형의 필름코팅정**【효능·효과】** 위산과다, 속쓰림, 신트림**【용법·용량】** 16세 이상 1회 1정(75mg), 1일 2정(150mg)까지 복용할 수 있다.**【사용상의 주의사항】**

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 이 약의 성분에 과민증의 병력이 있는 환자
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것.
 - 음식을 삼키기 어렵거나 삼킬 때 통증이 있는 경우 및 토혈이나 혈변이 있는 경우
 - 속쓰림 증상이 3개월 이상 지속되는 경우
 - 속쓰림 증상이 어지러움, 식은땀 또는 현기증(어지러움)과 함께 나타나는 경우
 - 짧은 호흡과 함께 가슴 또는 어깨 통증을 동반하는 경우
 - 가슴통증이 빈번히 나타나는 경우
 - 예상치 않은 체중감소, 오심, 구토, 위장관 통증 등의 증상이 나타나는 경우
 - 비스테로이드성 소염진통제를 복용하고 있는 경우
 - 약물들에 대한 과민증의 병력이 있는 환자
 - 신장에(신장장애) 환자(혈중 농도가 증가될 수 있다)
 - 간장애 환자
 - 고령자(노인)
 - 급성 포르피린증 병력이 있는 환자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 (이 약은 태반을 통과하고 임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다.)
 - 수유부 (이 약은 모유 중으로 이행한다.)
 - 다음의 약물을 복용하는 경우(상호작용) : 이 약은 다른 약물의 흡수, 대사 또는 신배설에 영향을 줄 수 있다. 이러한 약동학적 변화로 영향 받는 약물의 용량 조정 또는 투여중지가 필요할 수 있다.



제조발매원

영정제약주식회사

인천광역시 남동구 함박로 333

상호작용은 다음과 같은 몇몇 기전에 의해 발생된다. :

- ① 시토크롬 P450과 관련된 복합기능옥시게나아제계의 억제 : 일반적 치료 용량에서, 이 약은 이 효소계에 의해 비활성화되는 약물(예, 디아제팜, 리도카인, 페니토인, 프로프라놀롤, 테오필린)의 작용을 증강시키지 않는다. 쿠마린 항응고제(예, 와파린)와 병용투여 시 프로트롬빈 시간의 변화가 보고된 바 있다. 쿠마린 항응고제의 치료 지수가 좁기 때문에, 이 약과의 병용투여 기간에는 프로트롬빈 시간의 증가 또는 감소를 면밀하게 모니터링한다.
- ② 신세뇨관 분비 경쟁 : 이 약은 일부 양이온계로 제거되기 때문에, 동일 경로로 제거되는 다른 약물의 클리어런스에 영향을 줄 수 있다. 이 약 고용량(예, 졸링거-엘리스 중추군 치료 시)은 프로카인아미드 및 N-아세틸프로카인아미드의 배설을 감소시켜 이들 약물의 혈장 농도를 증가시킬 수 있다.
- ③ 위 pH의 변화 : 어떤 약물의 생체이용률에 영향을 줄 수 있으며, 이는 흡수 증가(예, 트리아졸람, 미다졸람, 글리피지드) 또는 흡수 감소(예, 케토코나졸, 아타자나비어, 델라비르딘, 게피티니브)를 유발할 수 있다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 증상이 지속되거나 악화되는 경우
- 2) 이 약은 14일 이상 복용하지 않는다.
- 3) 이 약의 복용으로 아래와 같은 이상반응이 보고되었으므로, 이러한 증상이 나타나는 경우 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의한다.
 - ① 속: 아나필락시스 속
 - ② 과민증: 두드러기, 혈관신경부종, 발진, 발열, 기관지경련, 저혈압, 홍통(가슴 통증)
 - ③ 혈액: 과립구감소증, 혈청크레아티닌치 상승, 백혈구감소증, 혈소판감소증, 골수형성저하증, 골수무형성증, 재생불량성 빈혈, 무과립구증, 범혈구감소증, 후천성 면역결핍성 빈혈, 호산구증가증
 - ④ 간장: 간기능장애(AST, ALT, γ -GTP, ALP치의 상승), 간염
 - ⑤ 순환기계: 서맥(느린 맥), 방실블록, 빈맥(빠른 맥), 혈관염
 - ⑥ 소화기계: 변비, 구역, 구토, 복부팽만감, 복통(배아픔), 식욕부진, 설사, 췌장염
 - ⑦ 정신신경계: 어지러움, 졸림, 경련, 두통, 두중, 불면, 흥분, 불안, 가역적 정신혼동, 우울증, 환각, 흐린 시력, 불수의 운동장애, 의식장애, 경련, 간대성 근경련(근육경련)
 - ⑧ 내분비계: 여성형유방, 젖분비과다, 가역적인 발기부전, 성욕감퇴
 - ⑨ 근골격계: 관절통, 근육통, 횡문근융해증(횡문근융해)(근육통, 무력감, CK 상승, 혈중 및 요중 미오글로빈의 상승이 특징임)
 - ⑩ 피부: 피부발진, 다형홍반, 탈모증
 - ⑪ 기타: 설염(허염), 피부가려움, 스티븐스-존슨 증후군(피부점막안증후군), 리엘 증후군(중독성표피괴사증), 재생불량성빈혈, 방실차단 등의 심차단, 급성 간질성 신염(신장염)

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 이 약의 투여로 위암에 의한 증상이 은폐될 수 있으므로 증상완화 목적으로 일시적으로만 사용한다.
- 2) 이 약이 아목시실린, 메트로니다졸과 상호작용을 일으킨다는 증거는 없다.
- 3) 고용량(2g)의 수크랄페이트와 이 약을 병용투여할 경우 이 약의 흡수가 감소될 수 있으므로 2시간 정도의 간격을 두고 따로 복용한다.
- 4) 이 약을 과량투여한 경우는 적절한 대증요법(증상별로 치료하는 방법) 및 보조요법이 필요하다. 이러한 경우에는 최토, 위세척을 하고 동시에 적절한 치료를 한다. 필요하다면 혈액투석에 의해 제거한다.
- 5) 알코올이 함유된 음료와 복용하지 말 것
- 6) 이 약을 투여 후 투약 전과 신체 기능에 변화가 있는 경우 의사 또는 약사와 상담한다.
- 7) 고령자(노인), 만성 폐질환, 당뇨병, 면역이 약화된 환자에서 유행성 폐렴의 발병 위험도가 증가할 수 있다. 대규모 역학 연구에서 H₂ 수용체 길항제(억제제, 대항제)를 복용하는 환자는 치료를 중단한 환자보다 유행성 폐렴 발병의 상대 위험도가 1.63이었다.(95% CI, 1.07~2.48)
- 8) 시험지법에 의한 요단백(소변에 포함된 단백질) 검사에서 위양성이 나타날 수 있다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것

【포장단위】 120정

【저장방법】 차광한 밀폐용기, 실온(1~30℃)의 건조장소보관

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 설명서작성연월 이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

* 유효기간 또는 사용기한이 지난 의약품을 사용하시면 안 되며, 설명서는 꼭 읽으시고 의약품과 함께 보관하십시오.

설명서작성연월 2014년 01월

제품문의 (032) 812-8356