

플루비툼 카타플라스마 (플루르비프로펜)

근육통 / 어깨통증 / 허리통증 / 어깨관절주위염

■ 원료약품 및 그 분량 : 1대 중(9×13cm², 11.7g) 중

플루르비프로펜(KP)	33mg
보존제 : 파라옥시벤조산메틸(KP)	11.7mg
보존제 : 파라옥시벤조산프로필(KP)	5.85mg
첨가제(가연물질) : 소, 사용부위 : 가죽) : 젤라틴	

■ **성상** : 연한 분홍색 또는 분홍색의 점착성의 고체를 부직포 위에 도포(바르다)하고 뒷면에 밀착포를 부착한 특유한 향기를 가진 카타플라스마제

■ **효능·효과** : 다음 질환 및 증상의 진통·소염(항염) : 퇴행성관절염(골(뼈)관절염), 어깨관절주위염, 건(힘줄)·건초염(힘줄윤활막염), 상완골(상완골)상과염 (테니스 엘보우 등), 근육통, 외상(상처)후의 통증(부기)·동통(통증)

■ **용법·용량** : 약면의 바리지를 떼어낸 후 1일 2회 환부(질환부위)에 부착합니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 약 및 기타의 플루르비프로펜 제제에 과민증의 병력이 있는 환자
- 2) 아스피린 천식(아스피린 민감성 소염(항염)진통제 등에 의한 천식발작의 유발) 또는 그 병력이 있는 환자(천식발작을 일으킬 수 있습니다)

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 기관지 천식 환자(천식발작을 일으킬 수 있습니다)
- 2) 이 약은 프로판렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.

3. 부작용

- 1) 때때로 발적(충혈되어 붉어짐), 발진, 약진(약물발진), 가려움 및 작열감(화끈거림), 접촉피부염이 나타날 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 사용을 중지합니다.
- 2) 천식발작을 유발할 수 있으므로 건성소포음(거품소리), 천명(숨을 쉴때 거름), 호흡곤란 등의 초기증상이 나타날 경우에는 사용을 중지합니다. 천식발작은 이 약의 부착 후 수시간 내에 나타납니다.

4. 일반적주의

- 1) 소염(항염)진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법(증상별로 치료하는 방법)임에 유의합니다.
- 2) 피부감염증을 불현성(겉으로 드러나지 않게) 시킬 수 있으므로 감염을 수반하는 염증에 사용하는 경우에는 적절한 항균제 또는 항진균제를 병용(함께 복용)하고 충분히 관찰하여 신중히 투여합니다.
- 3) 만성질환(퇴행성관절염(골(뼈)관절염) 등)에 이 약을 사용할 경우에는 약물요법 이외의 요법도 고려합니다. 또한 환자의 상태를 충분히 관찰하여 부작용 발현(나타남)에 유의합니다.

5. 임부에 대한 투여

임부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는

부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌, 웃돌다)한다고 판단될 경우에만 투여합니다.

6. 소아에 대한 투여

소아에는 안전성이 확립되어 있지 않습니다(사용경험이 적습니다).

7. 고령자에 대한 투여

고령자에는 이 약의 부착 부위의 피부상태에 주의하여 신중히 투여합니다.

8. 적용상의 주의

- 1) 손상된 피부와 점막에는 사용하지 않습니다.
- 2) 습진 또는 발진부위에는 사용하지 않습니다.
- 3) 적용부위의 땀을 닦아낸 후 사용합니다.

■ 저장방법

기밀용기, 실온보관(1~30℃)

■ 사용기한

외부 포장에 표시된 사용기한내에 사용하십시오.

■ 포장단위

5매

■ 제조의뢰자

판매원 : 코오롱제약(주) 대전시 대덕구 문평서로 18번길 45

■ 제조자

대화제약(주) 강원도 횡성군 횡성읍 한우로 496

[안전한 사용방법]

1. 건조하거나 약한 피부에 부착하신 경우에는 땀 때 미온수에 적당히 불려서 떼내시면 좋습니다.
 2. 햇빛에 노출되는 부위에 부착하신 경우에는(또는 직후에는) 봉대나 위복등으로 부착부위를 가려주시면 광과민성으로 인한 피부 이상반응을 예방할 수 있습니다.
 3. 피부 알레르기 방지를 위하여 동일부위에 연속적으로 사용하는 것은 피해주시고, 가려움증, 발진이나 충혈되어 붉어질 경우에는 사용을 중지하시기 바랍니다.
 4. 사후나, 온찜질 전후에는 피부 각질이 약해지고 내피가 손상되기 쉬우므로 본 제품 부착시 주의하시기 바랍니다.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 문안 작성일(2014년 2월 21일)이후 변경된 내용은 코오롱제약 홈페이지(<http://www.kolonpharm.co.kr>)나 소비자보호실(TEL:080-203-6000)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 온라인 의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색' 란을 참조하세요.

 **코오롱제약**