



8806963002806

일반의약품


엑티넘[®]

EXPLUS

이엑스플러스정

**눈의 피로·근육통·신경통·손발 저림 및
관절통(어깨결림·요통·오십견)의 완화를 위한
고함량 프리미엄 비타민**

- 다케다제약에서 세계 최초로 개발한 생체이용률을 높인^{1,2} 활성 비타민 B₁ (푸르설티아민)과 비타민 B₆, B₁₂, E를 배합하여 **눈의 피로, 어깨 결림, 요통, 오십견, 신경통, 손발 저림** 등의 증상에 효과를 나타냅니다.
- 육체피로, 병중 병후의 체력 저하 시, 임신·수유기**에 비타민 B₁, B₆, B₁₂ 를 보충합니다.
- 다케다제약에서 60년 노하우로 개발된 특허받은 비타민으로 복용하기 쉬운 노란색의 소형 당의정입니다.



원료약품 및 그 분량

	1정 중	3정 중
푸르설티아민염산염(JP, 비타민 B ₁) (푸르설티아민으로서)	36.39mg (33.33mg)	109.16mg (100mg)
피리독신염산염(JP, 비타민 B ₆)	33.33mg	100mg
시아노코발라민(JP, 비타민 B ₁₂)	500μg	1500μg
토코페롤숙시네이트칼슘(JP, 비타민 E) (dl-α-토코페롤숙시네이트로서)	33.33mg (33.33mg)	100mg (100mg)
판토텐산 칼슘 타입S(별규) (판토텐산칼슘으로서)	15.4mg (10mg)	46.2mg (30mg)
γ-오리자놀(별규)	3.33mg	10mg

효능효과

다음 증상(여러 증상)의 완화 :
눈의 피로, 근육통, 관절통(어깨결림, 요통, 오십견등), 신경통, 손발의 저림
다음의 경우 비타민 B₁, B₆, B₁₂의 보충 : 육체피로, 병중 병후의 체력저하시, 임신·수유기

용법·용량

15세 이상 1일 1회 2~3정을 식후 즉시 씹지 말고 복용하십시오

성상

노란색의 원형 당의정

포장단위

120정/병, 180정/병

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

사용기한

외부 포장 참조

사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 15세 미만의 어린이
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
 - 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 가려움, 오심/구역, 구토, 묽은 변, 구내염(입안염)
 - 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다
 - 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다
 - 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상 (neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다
 - 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다
 - 1개월 정도 복용해도 증상이 나아지지 않으면 복용을 중지 하십시오.
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 정해진 용법·용량을 잘 지켜 주십시오
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관하십시오
 - 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오
 - 사용기한을 넘긴 제품은 복용하지 마십시오.
 - 용기 안에 충전물은 개봉 후 버리십시오.(흡습의 원인이 될 수도 있습니다.)
 - 사용 후 용기의 마개를 잘 닫아서 보관해 주십시오



제조회사

Takeda Consumer Healthcare Company Limited
1-1 Doshomachi 4-chome, chuo-ku, Osaka-city, Osaka, 541-0045, Japan

제조사

Takeda Healthcare Products Company Limited
2-21, Osadano-cho, Fukuchiyama, Kyoto 620-0853, Japan

수입자

한국다케다제약주식회사
서울특별시 강남구 테헤란로98길 8, 12층(대치동)
제품문의 080-553-3300 (수신자 부담전화)

www.actinum.co.kr

- 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.
- 본 의약품이 유통과정의 잘못으로 인해 사용기한이 경과되었거나 제품이 변질, 변패, 오염 및 손상된 경우 구입한 약국을 통하여 교환 또는 환불 받으실 수 있습니다.
- 올바른 사용(복용) 법을 모르시거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하세요
- 본 설명서의 개정일 이후의 최신허가사항은 식품의약품안전처 온라인의약도서관(<http://drugmfdsg.go.kr>) 또는 한국다케다제약 홈페이지(<http://www.takeda.co.kr>)의 제품정보를 참조하시기 바랍니다.
- 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 알려거나 한국 다케다제약(02-3484-0800)으로 연락 바랍니다.

Reference

- Yoshinori Itokawa et al., Vitamin(Japan), 1992;66(1):35-42
- Greb A, et al., Int J Clin Pharmacol Ther, 1998;Apr;36(4):216-21