

항약·생약의 2중 복합작용

펜다나정

이부프로펜 + 작약, 감초

펜다나정은 작약감초탕 중 평활근이완 작용을 하는 작약과 각종 통증 및 경련을 완화시키는 감초가 함유되어 있는 양한방 복합진통제입니다.

작약 : 중추 신경 억제 작용이 있어 진정, 진통 작용을 나타내며, 위장 평활근의 이완작용과 위산분비 억제 작용이 있어 위경련 및 위궤양의 통증에 효과가 있습니다.

감초 : 장을 조절하여 대사를 원활하게 하고, 신경을 안정시키는 작용을 하여 신경성 통증을 포함한 각종 통증 및 경련을 완화시키는 효과가 있습니다.

[성분·함량] (1정 중)

이부프로펜(BP)	200mg
작약가루(생규)	100mg
감초가루(생규)	50mg

[성 상] 노란색 장방형의 필름코팅정

[효능·효과]

- 1) 두통, 치통, 발치(이를 뽑음) 후 두통(통증), 인후통, 귀의 통증, 관절통, 신경통, 요통, 근육통, 건통(어깨걸림), 타박상, 골절통, 염좌통(뻘 통증), 월경통(생리통), 외상통의 진통
- 2) 오한(춥고 떨리는 증상), 발열시의 해열

[용법·용량]

1일 3회 까지로 하고 공복(빈 속)을 피하여 복용하십시오. 복용간격은 4시간 이상으로 합니다.

- 성인(만15세 이상) : 1회 2정
- 만 8세 이상~만15세 미만 : 1회 1정

[사용상의 주의사항]

1. 경고

- 1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있습니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용시 천식을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 만 3개월 미만의 영아
- 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

다른 해열진통제, 감기약, 진정제

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 하십시오.

- 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아 및 만 15세 미만의 어린이(오심(구역)이나 토출(구토)을 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이중후군의 초기 증상일수 있으므로 의사와 상의하십시오.)
- 2) 만 3개월 이상 만 1세 미만의 영아는 의사의 진료를 받는 것을 우선으로 하며, 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 바람직합니다.
- 3) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 소양증(가려움증) 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 5) 간장질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 부종(부기) 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고령이 있는 사람
- 6) 고령자 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부

- 8) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 9) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
- 10) 토출(구토)과 하리(설사)로 많은 수분을 손실하거나 수분을 흡수하지 않는 사람 또는 이노제를 복용하는 사람
- 5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.**
- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 소양감(가려움), 오심(구역), 토출(구토), 식욕부진, 변비, 위통 소화관출혈, 위부불쾌감, 현기증(어지러움), 부종(부기)
- 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증 증상이 나타난 경우
- ① 속(아나필락시스) : 복용후 바로 دم마진(두드러기), 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있습니다.
- ② 피부점막안증후군(스티븐스-존슨증후군), 중독성표피괴사증후군(리얼증후군) : 고열을 동반하고, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같이 포진(물집)이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈점막에 나타날 수 있습니다.
- ③ 천식
- ④ 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등이 나타날 수 있습니다.(1일 최대 복용량이 감소로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부기, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관촬(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지하십시오.)
- ⑤ 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관촬을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지하십시오.
- 3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
- 2) 장기간 계속 복용하지 마십시오.
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시키십시오.
- 4) 복용시에는 음주하지 마십시오.
- 5) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이노제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이노제(트리클로로메타이디드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용하십시오.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관하십시오.
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법] 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)


[포장단위 및 사용기간] 자사포장단위(외부용기 표기), 제조일로부터 3년

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회고시 "소비자 분쟁해결기준"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.

[제품문의] (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

※ 이 제품은 안전용기 제품입니다. 아래의 그림과 같이 강하게 눌러 개봉하십시오.



코스닥상장
 **신일제약(주)**
 충청북도 충주시 양성면 복상골길 28



설명서 작성년월일 : 2014.07.28