

【성분·함량】 1정 중

- 유효성분 : 아스코르브산과립(아스코르브산으로서 100mg)(별규) 103.1mg
시아노코발라민1000배산(시아노코발라민으로서 100 µg)(KP) 100mg
토코페롤아세테이트 2배산(비타민 E로서 50 IU)(BP) 100mg
리보플라빈(BP) 2mg
피리독신염산염(KP) 2mg
푸르셀티아민(KP) 50mg
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이빨간색(200F650003), 카복시메틸셀룰로오스, 오스칼슘, 콜로이드성산화규소, 크로스포비든, 히프로멜로오스

【성상】 적색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

- 다음의 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, C, E의 보급
 - 육체피로
 - 임신·수유기
 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하
 - 노년기
 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 비타민 B₁(푸르셀티아민)
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등)
 - 각기
 - 눈의 피로

【용법·용량】 성인 1회 1정, 1일 1회 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 만 3개월 미만의 영아
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산이 배설되는 상태)
 - 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부 문서를 소지할 것.
 - 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(홍충되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 구내염(입안염)
 - 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
 - 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다.
 - 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
 - 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초 신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
 - 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
 - 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
 - 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

6. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
- 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법 및 사용기간】 차광기밀용기, 실온(1~30℃) 보관, 제조일로부터 36개월

【포장단위】 30정, 100정

- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 본 제품은 우수약품제조 및 품질관리기준(KGMP)을 필한 제품입니다. 만일 유통과정 중에 변질 또는 변패 또는 오염 및 손상되거나 사용기한이 경과된 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 구입하신 약국을 통하여 즉시 교환하여 드립니다.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)의 약품 정보 참조하세요.
- ※ 본 제품 첨부문서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.arlico.co.kr)의 제품정보 또는 제품 문의처 전화(080-585-0004)를 통해 확인할 수 있습니다.
- ※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)