

중추성 근이완제

페덱스정

에페리손염산염

전문의약품

[원료약품 및 분량] 1정 중

- 유효성분 : 에페리손염산염(염기) 50.0mg
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유),
젤라틴(소, 가축의 인육부위)
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 백당, 산화티탄, 스테아르산마그네슘,
아라비아고무, 옥수수전분, 침강탄산칼슘, 키토사우비나, 텔크,
포비돈, 히드록시프로필셀룰로오스

[성상] 흰색의 원형 당의정제

[효능·효과]

1. 근골격계질환에 수반하는 동통성 근육연축 : 경간증후군, 견관절주위염, 요통
2. 신경계 질환에 의한 경직성 마비 : 뇌혈관장애, 경직성 척수마비, 경부척추증, 수술 후 추유증(허·척추증상 포함), 외상추유증(척수손상, 두부외상), 근위축성 측색경화증, 뇌성마비, 척수소뇌변성증, 척수혈관장애, 이급성 척수신경병변, 기타의 뇌척수질질환

[용법·용량]

성인 : 에페리손염산염으로서 1회 50mg 1일 3회 식후에 경구투여하십시오.
연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 1) 이 약에 과민증 환자
 - 2) 중증의 근무력증 환자
 - 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 - 1) 약물과민증의 병력이 있는 환자
 - 2) 간장애 환자(간기능을 악화시킬 수 있습니다.)
3. 이상반응
 - 1) 속 : 드물게 속을 일일 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.
 - 2) 간장 : 드물게 ALT, AST, ALP의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 하십시오.
 - 3) 신장 : 드물게 단백뇨, BUN의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 하십시오.
 - 4) 혈액 : 드물게 빈혈 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 하십시오.
 - 5) 과민증 : 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있습니다.
 - 6) 정신신경계 : 때때로 불면, 졸음, 두통, 사지마비, 드물게 몸의 굳어짐, 사지떨림 등이 나타날 수 있습니다.
 - 7) 소화기계 : 때때로 구역, 구토, 식욕부진, 위부불쾌감, 구갈, 변비, 설사, 복통, 드물게 복부팽만감, 구내염 등이 나타날 수 있습니다.
 - 8) 비뇨기계 : 드물게 요배, 요실금, 잔뇨감이 나타날 수 있습니다.
 - 9) 전신증상 : 때때로 무력감, 비틀거림, 전신권태감, 드물게 어지러움, 근간지저하 등이 나타날 수 있습니다.

10) 기타 : 때때로 안면홍조, 드물게 발한, 부종이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 이 약 투여중에 무력감, 비틀거림, 졸음 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 또는 투여를 중지하십시오.
- 2) 졸음, 주의력·집중력·반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의하십시오.
5. 상호작용
이 약의 유사약물인 염산톨페리손과 메토카르바미를 병용시 시조절장애가 나타났다는 보고가 있습니다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단될 경우에만 투여하십시오.
 - 2) 수유부에는 투여를 피하는 것이 바람직하나 부득이하게 투여할 경우에는 수유를 중단하십시오.
7. 소아에 대한 투여
소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않습니다(사용경험이 적습니다).
8. 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의하십시오.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 30정생, 500정생

- 제조사 : 대한유람(주) / 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 66
- 제조회사 : 삼익제약주식회사

- * 처방전 증상, 처방전 환자 이외에는 사용하지 마십시오.
- * 첨부문서를 읽고, 첨부문서를 보관하십시오.
- * 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.
- * 이 첨부문서 작성일자(2016. 05. 30)이후 변경된 내용은 삼익제약 홈페이지(<http://www.samik.co.kr>) 또는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 정보를 참조하세요.
- * 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환해 드립니다. 본 제품은 공정거래위원회 고시 "소비자분쟁해결기준"에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 171010


삼익제약주식회사

인천광역시 부평구 청안로 13
학술/개발부 : (02)928-0661