



고함량 기능성 메가비타민

일반약품

분류번호:316

맥스케어프리미엄

〈無타르색소〉

비타민은 미량 영양소로서, 충분히 섭취되지 않거나 한 종류라도 부족하게 되면 체내에서 일어나는 여러가지 대사에 지장을 초래하여 질병이 유발될 수 있습니다. 특히 비타민 B군은 수용성이므로 많은 양을 섭취해도 체내에 저장되지 않아 매일 섭취하는 것이 좋습니다. 맥스케어프리미엄정은 체내 여러 대사 과정에 필수적으로 쓰이는 비타민 B군을 고함량으로 함유하고 있으며, 간기능 개선효과를 가지는 UDCA와 글루쿠로노락톤 성분을 함유하고 있습니다. 또한, 지방, 콜레스테롤의 대사에 작용하는 콜린 및 이노시톨과 자율신경설조증 및 갱년기 장애에 도움이 되는 γ -오리자놀을 함유하고 있습니다.

【특장점】

1. 고함량 비타민 복합제

맥스케어프리미엄정은 인체대사에 필수요소로 작용하는 7가지 비타민 B군이 고함량으로 함유되어 있어 흡연, 음주, 과도한 운동, 스트레스, 당뇨 등으로 체내 소모량이 증가된 분들의 비타민 결핍에 의해 나타나는 신경손상, 운동능력저하, 만성통증, 만성피로를 효과적으로 개선시킵니다.

2. 간기능 개선성분 UDCA, 글루쿠로노락톤 함유

맥스케어프리미엄정은 간 보호효과, 간기능 개선 효과가 있는 UDCA(우루소데옥시콜산, Ursodeoxycholic acid)와 글루쿠로노락톤이 함유되어 있으며, 간 대사에 필수적인 비타민 B군이 고단위로 처방되어 있어 상호협력작용으로 만성피로와 간의 피로를 신속히 효과적으로 개선시킵니다.

3. 신경비타민(B₁, B₆, B₁₂) 함유

맥스케어프리미엄정은 통증을 경감시키고 피로물질의 분해를 촉진하는 비타민 B₁, 만성통증을 유발하는 신경물질을 감소시키는 B₆, 신경세포를 복구하고 통증 경감 능력이 강력한 B₁₂를 고함량으로 함유하여 기존 종합비타민으로 효과가 약했던 신경성 피로로 인한 신경통, 근육통, 관절통 및 어깨결림, 요하리통, 눈의 피로 등의 증상완화 효과가 뛰어납니다.

4. 항호모시스테인작용(B₆, 폴산, B₁₂) 및 성인병 예방효과

호모시스테인은 메티오닌의 대사과정에서 체내에서 생성되는 아미노산의 일종으로 그 수치가 높아지면 뇌졸중과 심장질환의 위험성이 높아지는 것으로 알려져 있습니다.

맥스케어프리미엄정에는 B₆, 폴산, B₁₂가 함유되어 있어 호모시스테인을 낮추는 효과를 가집니다. 또한 지방과 콜레스테롤의 대사에 작용하는 콜린을 함유하여 성인병을 예방하는 효과도 있습니다.

5. 항산화작용 및 갱년기 증상장애를 개선하는 γ -오리자놀 함유

맥스케어프리미엄정에 함유된 γ -오리자놀은 항산화작용을 하고 콜레스테롤의 흡수를 저해하여 혈중 지질의 수치를 낮춰줍니다. 또한 자율신경설조증 및 갱년기 장애로 인한 신체증후 개선에 효과가 있습니다.

6. 가임여성(임신가능성 있는 여성)들의 필수 비타민 보급제

임신시 B₆의 결핍은 태아의 발육저하를 가져오고 B₆의 결핍은 임신 초기 입덧과 관련이 있습니다. 폴산은 임신시 태아의 신경과 결손을 방지하는 중요한 비타민으로 임신전후에 보충해 주는 것이 필요합니다.

【성분·함량】 (1정 중)

유효성분 : 티아민질산염(KP)	100mg
리보플라빈(KP)	100mg
니코틴아미드(KP)	100mg
판토텐산칼슘(KP)	100mg
피리독신염산염(KP)	100mg
폴산(KP)	500μg
시아노코발라민(KP)	500μg
글루쿠로노락톤(KP)	50mg
콜린타르타르산염(USP)	100mg
이노시톨(KP)	100mg
γ -오리자놀(KP)	10mg
우루소데옥시콜산(KP)	10mg
유비데카레논(KP)	5mg

첨가제 (동등물량성분) : 유당수화물(소-우유)

기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 아크릴이트렌색93018508, 오파브 로스콜리어(97W19196), 오파드라이 흰색(OY-C-7000A), 오파드라이AMB 노란색80W92755, 이산화규소, 전산화전분, 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 담황색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆의 보급

- 1) 육체피로
- 2) 임신·수유기
- 3) 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.

- 비타민 B₁ : 1) 다음 증상의 완화 - 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등)
2) 각기
- 3) 눈의 피로

비타민 B₂, 비타민 B₆ : 다음 증상의 완화

구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

【용법·용량】 만 8세이상 어린이 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 않습니다.

- (1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- (2) 만 3개월 미만의 영아
- (3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 않습니다.

- (1) 레보도파(파킨슨신 함유제제)

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- (1) 만 1세 미만의 영아
- (2) 의사의 치료를 받고 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- (1) 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
- (2) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 묽은 변
- (3) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- (4) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- (5) 고공량 투여에 의해 소화성 장애를 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisma, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 긴소성을 일으킬 수 있습니다.
- (6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.
- (2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오.
- (3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있습니다.

6. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관하십시오.
- (3) 오염(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법 및 사용기한】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 외부용기에 표기

【포장단위】 120정(60정x2), 60정

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변태 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회고시 '소비자 분쟁해결기준'에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.

■ 제품문의 (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

■ 부작용 보고 및 피해구제 신청 한국약물안전관리원(전화 : 1644-6223)

코스닥상장
신일제약(주)
충청북도 충주시 양성면 북성골길 28



설명서 작성년월일 : 2021.10.29