

근육이 뭉쳤을 땐 클로사펜 정

분류번호:114

일반의약품

K G M P

적격업체

본 약은 사용하기 전에 본 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 본 첨부문서를 본 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

아세트아미노펜(KP) -----	300.0mg
클로르록사존(KP) -----	250.0mg

【성상】 흰색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

신경통, 근육통, 관절통, 요(허리)통, 염좌(뺨)통, 건통(어깨결림), 근경련(근육경련), 근경직 등 근육의 이상 긴장을 수반하는 제질환(여러질환)

【용법·용량】

성인 : 1회 2정, 1일 4회까지 공복(빈 속)시를 피하여 복용한다.
 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간 손상이 유발될 수 있다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 클로르록사존에 과민증 환자
- 2) 아세트아미노펜에 과민증 환자

3. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것

이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 된다.

4. 다음 경우에는 신중히 투여할 것.

- 1) 심한 간, 신장장애(신장(콩팥)장애) 환자
- 2) 알레르기 환자 또는 약물 알레르기가 있었던 환자

5. 이상반응

- 1) 과민증 : 두드러기, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움증과 같은 과민증이 나타나면 투여를 중지한다. 드물게 알레르기성 피부발진, 점상출혈(출혈점), 반상출혈(피부에 검보랏빛 얼룩점이 생기는 내부출혈), 요변색(소변색이 변함) 등이 나타날 수 있다. 매우 드물게 혈관신경성 부종(부기) 또는 아나필락시스 증상이 나타날 수 있다.
- 2) 간장 : 클로르록사존에 의해 간 손상이 나타날 수 있으므로 간기능 이상이 나타나면 투여를 중지한다.
- 3) 소화기 : 때때로 위장장애가 나타날 수 있으며 드물게 위장출혈이 나타날 수 있다.
- 4) 정신신경계 : 때때로 졸음, 어지러움, 두통, 권태, 과도한 흥분이 나타날 수 있다.

6. 임부에 대한 투여

임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌다)한다고 판단되는 경우 투여한다.

7. 상호작용

알코올이나 중추신경억제제와 병용(함께 복용(사용))투여시 상가작용이 나타나므로 신중히 투여한다.

【저장방법 및 사용기간】 실온(1~30℃) 보관, 밀폐용기, 제조일로부터 36개월

【포장단위】 10 정

※ 어린이 안전용기를 사용한 제품입니다.

개봉시, 제품 파손이 우려되므로 뒷면의 은박부분을 손톱으로 눌러(가급적 제품의 중앙부분을 피하여) 개봉바랍니다.

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회고시 "품목별소비자분쟁해결기준"에 의거 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

DS-1501-01

첨부문서 최초 작성년월일 2014. 01. 27

첨부문서 최종 개정년월일 2015. 01. 08

이 첨부문서의 작성일 이후 변경된 내용은 동성제약 홈페이지(<http://www.dongsung-pharm.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 홈페이지 온라인 의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 해당 제품정보란에서 확인하실 수 있습니다.

제조의뢰원 :  **동성제약주식회사**

충남 아산시 둔포면 관대안길 45
www.dongsung-pharm.co.kr

소비자상담전화 : 080-001-0921

제 조 원 : **알리코제약(주)**

충북 진천군 광혜원면 용소2길 21