

고지혈증에 대한 First Choice

휴텍스아토르바스타틴 20mg

(아토르바스타틴칼슘)

Fitless Alprostadil Tablet 20mg (acupuncture treatment)

효소 활성도 측정 시 20mg은 HMC-C2A 함유 효소 제제로, 실험관계 물질에 30% 함유량을 감소시킨다. 경구투여 후 1~2시간 내에 최고 혈중농도에 도달하여 흡수가 빠르고 반감기(半減期)는 93%이상이다.

【의의적용 및 특징】

- [illegible]

【원로명망의 본향】 청풍

이전보고서와 비교하여
(이전보고서와 비교하여 23%)

성

- [illegible]

[Figure 1]

[illegible]

【사용상의 주의사항】

1. 在下列各题中，选择正确的答案，将序号填入括号内。

2. 다음 한자어는 틀려쓰지 않 것

- [illegible]

5. 실험적 주의

- [illegible]

이름

[illegible]

150

- [illegible]

【포경단위】 자사 포경연주

【서정법 및 사용기간】 겨울철에 실온(1~30℃)에서 저온으로부터 24개월

*본 제도에 대하여 자택을 방문하시는 분은 소식이상대할(03-377-7000)로 문의하시기 바랍니다.

먹은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.

하쿠호텔스제약(주) 오송사업장충청북도괴기군


한국유타크제철(주)

 경기도 화성시 향남읍 제막공단3길 99
 제조의뢰자: 한국유타크제철(주) 경기도 화성시 향남읍 제막공단3길 99

제 조 자: (주)유영제약 충청북도 진천군 광혜면 용소2길 33
설명서 작성일 131213