

급·만성 기관지염 진해제



바이투스정

(레보드로프로피진)

전문 의약품
분류번호 222

【원료약품의 분량】 (1정 중)

레보드로프로피진(EP)-----60mg

첨가제(동물유래) : 유당수화물(소-우유)

【성상】 흰색 원형 정제

【효능·효과】 다음 질환에서의 기침 : 급·만성기관지염

【용법·용량】

성인 : 레보드로프로피진으로서 1회 60mg을 1일 3회 적어도 6시간 간격을 두고 경구투여한다.

증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 기관지 점액 분비 증가 환자
- 3) 점액섬모기능이상(카르타게너증후군, 섬모이상운동증) 환자
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 5) 중증의 간장애 환자
- 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 중증 심부전 및 중증 신장부전 환자
- 2) 고령자
- 3) 만2세 미만의 영아

3. 이상반응

- 1) 소화기계 : 구역, 탄산증, 소화불량, 설사, 구토
- 2) 중추신경계 : 피로, 기능쇠약, 반수, 혼수, 두통, 어지러움
- 3) 순환기계 : 심계항진
- 4) 피부 : 매우 드물게 알레르기 반응

4. 일반적 주의

드물게 반수상태가 초래되므로 운전이나 기계 조작 시 주의하며, 특히 알코올과 병용 시 작용이 증대 될 수 있다.

5. 상호작용

예민한 환자에게 진정제와 병용투여 시 주의한다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부에는 투여하지 않는다.

7. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나, 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 주의한다.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로 부터 36개월

【제조자】 삼익제약(주) 인천광역시 부평구 청안로 13

【제조외의자 및 판매】 (주)바이넥스 부산광역시 사하구 다대로 368-3

* 본 의약품은 우수의약품관리기준(KGMP)에 의한 품질관리를 필한 제품입니다.

만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 내가 신고한 작은 부작용 국민건강 초석된다. (온라인의약품도서관 : 1577-1255, drug.mfds.go.kr)

* 이 약을 사용하시기 전에 반드시 본 설명서를 읽어주시기 바랍니다.

<http://www.bi-nex.com>

☎080-263-3151

개정년월일 : 2014년 07월 16일



|주|바이넥스
부산광역시 사하구 다대로 368-3