

근육통 관절통 어깨결림 요통

효과빠른 푸러펜 정

근이완·진통제

10정

성인 1회 2정

경남제약(주)



효과빠른 푸러펜 정

근이완·진통제

일반의약품 정보

이 약을 사용하기 전 반드시 아래의 기재사항을 확인하세요

[유효성분] 1정(640mg) 중

아세트아미노펜(KP) 300mg

클로르록시딘(KP) 250mg

[효능·효과] 신경통, 근육통, 관절통, 외(허리)통, 영좌통(변 통증), 건통(아깨통증), 근경련(근육경련), 근경직 등 근육의 이상 긴장을 완화하는 제 질환(여러 질환)

[용법·용량] 성인 : 1회 2정, 1일 4회까지 공복(빈 속)을 피하여 복용한다. 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것 이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안된다.

3. 다음 환자에는 투여하지 말 것 1) 클로르록시딘에 과민증 환자 2) 아세트아미노펜에 과민증 환자

4. 다음 환자에는 신중히 투여할 것 1) 심한 간·신장에(신장장애) 환자 2) 알레르기 환자 또는 약물 알레르기가 있었던 환자

5. 부작용 1) 과민증: 두드러기, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움증과 같은 과민증이 나타나면 투여를 중지한다. 드물게 알레르기성 피부발진, 점상출혈(출혈점), 반상 →

출혈(피부에 검보라빛 얼룩점이 생기는 내부출혈, 요변색·소변색이 변함) 등이 나타날 수 있다. 매우 드물게 혈관신경성 부종(부기) 또는 아나필락시스 증상이 나타날 수 있다. 2) 간장: 클로르록시딘에 의해 간 손상이 나타날 수 있으므로 간기능 이상이 나타나면 투여를 중지한다. 3) 소화기: 때때로 위장 장애가 나타날 수 있으며 드물게 위장출혈이 나타날 수 있다. 4) 신경정신계: 때때로 졸음, 어지러움, 두통, 권태, 과도한 흥분이 나타날 수 있다.

6. 임부에 대한 투여 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우 투여한다.

7. 상호작용 알코올이나 중추신경억제제와 병용(함께 복용)투여시 상가작용이 나타나므로 신중히 투여한다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)에 보관

[사용기간] 포장제 측면 표시일까지

[참가제] 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 탈크, 폴리메틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스

※가타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템 "http://nedrug.mfds.go.kr" → 「의약품 등 검색」을 참조하시기 바랍니다. ※올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사 및 자사 소비자 상담실로 문의하시기 바랍니다. ※만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공평거래위원회고시「소비자분쟁해결기준」에 의거 구입한 곳에서 교환 또는 환불 받을 수 있습니다. ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223)

[성상] 흰색의 타원형 필름코팅정

[제조자] 주식회사노비엠헬스케어 경성북도 경산시 하양읍 자성산4로 16-53

[제조외지자] 경남제약(주) 충청남도 아산시 신창면 서부남로790번길 49

[소비자상담전화] 080-232-8600, www.kyungnampharm.com

작성연월일: 2022.03.25