

제산제 & 흡착제 잘나겔정 (알마게이트)

Zalnagel Tab.

잘나겔정은 위산을 중화시키는 제산제로 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다, 역류성식도염의 증상을 개선시킵니다.

【약리작용 및 특징】

1. 위산을 중화시키고, 담즙산을 흡착하며, 펩신의 활성을 저하시킵니다.
2. **잘나겔정**의 제산작용은 단백질이나 펩신과 같은 단백질분해 효소에 의해 불활성화 되지 않습니다.
3. 적은 양의 나트륨을 함유하므로 나트륨 섭취를 제한 받는 환자에게 안전하게 사용할 수 있습니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

알마게이트(KP) 500mg

【성 상】 흰색의 원형정제

【효능·효과】

다음 질환에 사용할 수 있다.

다음 질환의 제산작용 및 증상의 개선 : 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다(속쓰림, 구역, 구토, 위통, 신트림), 역류성식도염

【용법·용량】

성인 : 알마게이트로서 1회 1g 1일 4회 식후 1~2시간 및 취침시에 씹어서 경구 투여한다.

소아(6~12세) : 성인용량의 1/2을 투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
다른 약물을 투여받고 있는 환자
2. 부작용
소화기계 : 이 약을 투여하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 수 있다.
3. 일반적 주의
1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여한다.
3) 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
4. 상호작용
1) 테트라사이클린계 항생물질의 흡수를 저해할 수 있으므로 병용투여하지 않는다.
2) 이 약의 흡착작용 또는 소화관내·체액의 pH 상승에 의해 병용약물의 흡수·배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 투여한다.
5. 저장상의 주의사항
1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【포장단위】 자사포장단위

【저장방법 및 사용기간】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 본 제품에 대하여 자세한 정보를 원하시는 분은 소비자상담실(☎031-377-7909)로 문의하시기 바랍니다.

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.



한국휴텍스제약(주)
경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 99

우수의약품제조관리기준
KGMP 적격지정업체