

Felbinac



일동 펠비낙

플라스타

관절염

퇴행성관절염

관절주위통증, 근육통

타박상으로 인한 통증

어깨, 관절 부분이 아프시다고요?



10매입

일반의약품 분류번호 264(진통·진압·수렴·소염제)

원료약품의 분량 (7 cm X 10 cm, 1.0 g 중) 펠비낙(BP) 35 mg

성상 무색투명의 점착성물질을 살색린트포에 도포하여 고체면에 박리지를 덮은 첩부제

효능·효과 다음 질환 및 증상의 진통·소염(항염): 퇴행성관절염(골관절염), 어깨관절주위염, 건·건초염(힘줄윤활염), 건주위염, 상완골상과염(테니스 엘보우 등), 근육통, 외상후의 종창(부기)·동통(통증)

용법·용량 약면의 박리지를 떼어낸 후 1회 1매를 1일 2회 환부(질환 부위)에 붙입니다.

사용상의 주의사항

사용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 사용하시기 바랍니다.

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오. 1) 이 약, 이 약 성분 및 기타의 펠비낙 제제에 과민증의 병력이 있는 환자 2) 아스피린 또는 기타의 비스테로이드성 소염진통제에 천식(비스테로이드성 소염진통제 등에 의한 천식 발작을 유발) 또는 그 병력이 있는 환자(천식 발작을 일으킬 수 있습니다) 3) 아스피린 또는 기타의 비스테로이드성 소염진통제에 대한 두드러기 또는 급성 비염의 병력이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오. 기관지 천식 환자(천식발작을 일으킬 수 있습니다)

3. 부작용 때때로 가려움, 홍반(붉은 반점), 발적(충혈되어 붉어짐), 피부염(발진, 습진), 접촉피부염, 드물게 자극감 또는 수포 등이 나타날 수 있습니다. 이러한 증상이 심하게 나타날 경우에는 사용을 중지합니다.

4. 일반적주의 1) 소염진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법임에 유의합니다. 2) 피부감염증을 불현성화(겉으로 드러나지 않게) 시킬 수 있으므로 감염을 수반하는 염증에 사용하는 경우에는 적절한 항균제 또는 항진균제를 병용하고 충분히 관찰하여 신중히 투여합니다. 3) 만성질환(퇴행성관절염(골관절염)등)에 사용하는 경우에는 약물요법 이외의 요법도 고려합니다. 또한 환자의 상태를 충분히 관찰하여 부작용 발현에 유의합니다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여 1) 동물의 생식실험 결과 임신 후반기에 이 약의 사용시 다른 비스테로이드성 소염제에서와 같은 난산 및 분만 지연 등이 관찰되었습니다. 2) 임부 및 수유부에 대한 안전성이 확인되어 있지 않으므로

임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부에는 투여하지 않습니다.

6. 소아에 대한 투여 소아에 대한 안전성이 확인되어 있지 않습니다(사용경험이 적습니다).

7. 적용상의 주의 1) 손상피부 및 점막에 사용하지 않습니다. 2) 습진 또는 발진 부위에 사용하지 않습니다.

저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

안전사용수칙

1. 건조하거나 약간 피부에 부착하신 경우에는 땀 때 미온수에 적당히 불려서 떼내시면 좋습니다.

2. 햇볕에 노출되는 부위에 부착하신 경우에는 봉대나 의복 등으로 부착 부위를 가려주시면 광과민성으로 인한 피부 이상반응을 예방할 수 있습니다.

3. 동일 부위에 연속적으로 사용하시는 것은 피하시는 것이 좋습니다.

4. 사우나, 온찜질 전후에는 피부 각질이 약해지고 내피가 손상되기 쉬우므로 본 제품을 부착하실 때 주의하십시오.

※이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

※이 문안은 2013년 5월 28일자로 작성되었으며 이 후로 변경된 내용은 홈페이지(www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.

제조사 대화제약(주) 강원도 횡성군 횡성읍 한우로 495

벨비낙-5130528

제조의뢰자

일동제약주식회사

본사: 서울특별시 서초구 바우포로27길 2

공장: 경기도 안성시 공단1로 25 www.ildong.com

소비자상담실: (전화)080-022-1010(수신자부담)



제조번호:
사용기한: