



일반의약품
분류번호 : 322

Hemo Queen Gold M cap.

복용하시기 전에 설명서를 주의깊게 읽어보시고, 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

빈혈은 남녀노소 고르게 발생되는 질환이며, 여성의 경우 임신과 출산시 태아와 태반형성, 분만 시 출혈등으로 인해 정상인보다 많은 철분이 필요하기 때문에 임신부에 있어 철분제의 공급은 필수적인 요건으로 대두되어 왔습니다. 특히 태아의 건강까지 고려해야 하는 임신부의 경우 철분제의 성분이 무엇보다도 중요하게 요구되고 있는데, **헤모퀸골드엠캡슐**의 주성분인 폴리사카리드철착염은 비이온화된 철상태로 흡수되어 흡수율이 우수하며 생체이용률이 높아 빈혈치료기간을 단축시킬 뿐만 아니라 치아착색이나 음식물과 복용시 위장관의 장애 및 흡수율이 저하되는 단점이 거의 없어 하루 중 언제라도 복용할 수 있는 장점이 있습니다.

또한 기형아 예방과 뇌발육에 필수적인 폴산 및 헤모글로빈 생성에 필수적인 조혈비타민인 시아노코발라민이 보강된 빈혈 예방 및 치료제입니다.

● **제품명** : 헤모퀸골드엠캡슐

● **원료약품 및 그 분량** : 1캡슐 중

폴리사카리드철착염(KP)(철(Fe)로서 35 mg)	76.1 mg
시아노코발라민1000배산(KP)(시아노코발라민으로서 12 µg)	12 mg
폴산(KP)	0.4 mg

● **성상**

회색의 분말이 충전된 상·하부 적갈색의 경질캡슐제

● **효능·효과**

철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

● **용법·용량**

성인 : 1일 1회, 1회 1캡슐을 복용한다.

● **사용상의 주의사항**

1. 경고

철 함유제제는 만 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 12개월 미만의 영아
- 3) 혈색소증(철대사 이상으로 철이 간장, 췌장(이차)에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증, 비철결핍성 빈혈

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제



경남제약|주
Kyung Nam Pharm, Co., Ltd.

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
- 3) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 4) 신장장애 환자
- 5) 저단백혈증 환자

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것 (상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것)

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
- 두드러기, 가려움, 광선과민반응, 복부(배부분)·위통증, 경련, 구토, 설사, 열, 혼수
- 2) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- 3) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 4) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것
- 5) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
- 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

● **저장방법** : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

● **포장단위** : 자사포장단위(외부포장에 표기)

● **제조사** : **경남제약(주)** 충남 아산시 신창면 서부남로 790번길 49

※ 기타주의

1. 허가된 효능·효과와 다른 용도로 사용시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
 2. 사용기한이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 사용(복용)을 금하시기 바랍니다.
 3. PTP포장을 개봉하여 복용 시 가끔 캡슐에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용시 캡슐에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용하시기 바랍니다.
- ※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사 및 자사 소비자상담실로 문의하시기 바랍니다.
소비자 상담전화 : 080-232-8600, www.kyungnampharm.co.kr
- ※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염된 제품이 발견될 경우, 공정거래위원회 고시 “소비자분쟁 해결기준”에 의거 구입한 곳에서 교환 또는 환불받을 수 있습니다.
- ※ 의약품의 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품서관“<http://drug.mfds.go.kr>”
→ “의약품 검색”을 참조하시기 바랍니다.

※ **개봉방법**



- ① 포장 뒷면의
절취선을 따라
1장씩 자르세요.



- ② 오서리의
표시된 부분을
확실히 방향으로
벗깁니다.



- ③ 포장 앞면을
돌려 약을
꺼냅니다.