

피로회복 · 영양보급 · 눈의피로 · 체력보강제

이파워비타 연질캡슐

EPOWERVITA Soft Cap.

【원료약품의 분량】 1연질캡슐중

니코틴산아미드(KP)	20mg
아스코르브산(KP)	75mg
티아민염산염(KP)	2mg
리보플라빈(KP)	3mg
레티놀팔미테이트(KP)(비타민A로서5,000IU)	2,94mg
농축콜레칼시페롤(분말형)(EP)(비타민D로서 200IU)	2mg
*첨가제(보존제): 파라옥시벤조산메틸(KP) --- 0.1mg	
*첨가제(보존제): 파라옥시벤조산프로필(KP) - 0.01mg	
*첨가제(동물유래): 젤라틴(기원동물: 소, 사용부위: 피부)	
*첨가제(타르색소): 황색5호, 적색40호, 청색1호	

【성 상】 황갈색의 내용물이 충전된 암갈색의 장방형 연질캡슐

【효능 · 효과】

- * 다음 경우의 비타민 A, D, B₁, B₂, C의 보급 :
 - 육체피로 -임신수유기
 - 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
 - 발육기
 - 노년기
- * 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.
 - 눈의 건조감의 완화 -야맹증(밤에 잘 못보는 증상) -빠, 이의 발육불량 -구루병의 예방

【용법 · 용량】 성인 1회 1캡슐, 1일 1회 복용

【사용상의주의사항】

1. 경고

임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 말 것.(비타민A 결핍증 환자는 제외)

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 3개월 미만의 젖먹이
- 4) 신장(콩팥)결석 환자
- 5) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 6) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)
- 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ① 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다
 - ② 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
- 4) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
- 5) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 설사, 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종(부기), 묽은 변
 - 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
 - 3) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성)손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
 - 4) 장기간 고용량의 비타민 A(베타카로틴으로부터 전환된 것을 제외한) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈영양성증) 위험을 높일 수 있다
 - 5) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 한다
 - 3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다
 - 4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다
 - 5) 고지단백혈증, 당뇨병성고지혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성유제를 신중히 투여해야 하는 환자는 신중히 투여한다
 - 6) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
 - 7) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분 에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【포장단위】 자사포장단위

【저장방법】 차광밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【제조원】 영풍제약(주) / 인천광역시 남동구 함박외로 333

【판매원】 중근당계열회사 경보제약 / 본사·공장 : 충청남도 아산시 실목로 174

서울사무소 : 서울특별시 서대문구 충정로 8

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 설명서작성연월 이후 변경된 내용은 온라인 의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조 하십시오.

* 이 약을 사용하기 전에 반드시 설명서를 주의 깊게 읽으시고, 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마시고, 설명서는 항상 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

제품문의 : (032) 812-8356

설명서작성연월 : 2014년 05월