

M36372®

일반의약품

無사카린

위역류, 속쓰림, 소화불량을 한번에 바로!

바로스콘더블액션® 현탁액

Baroscon DOUBLE ACTION

【원료약품의 분량】이 약 100mL 중

유효성분 : 알긴산나트륨(EP)(건조물로서 4.25g)	5.0g
탄산칼슘(EP)	3.25g
탄산수소나트륨(EP)	2.13g

첨가제(보존제) :

파라옥시벤조산메틸(KP)	0.28g
파라옥시벤조산프로필(KP)	0.04g

기타첨가제 : 수크랄로스, 수산화나트륨, 아세틸팔칼륨, 정제수, 카보머934P, 페퍼민트후레바 에이-971126

【성상】

알루미늄 호일 파우치에 든 페퍼민트향이 나는 미황색 내지 크림색의 현탁액

【효능·효과】

다음의 위식도 역류의 증상 개선 :

- 산 역류
- 속쓰림
- 위 내용물의 역류로 인한 소화불량(예를 들어 식사 후, 임신 중, 역류성 식도염과 동반하는 경우의)

【용법·용량】

· 성인 및 12세 이상 소아 : 1일 10~20mL를 1일 4회(식후 및 취침전) 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
이 약 또는 이 약 구성성분에 과민반응이 있는 사람
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의하십시오.
1) 울혈심부전, 신장에 등과 같이 나트륨을 매우 제한해야 하는 환자(이 약은 20mL당 254.5mg (11.06mmol)의 나트륨을 함유)
2) 고칼슘혈증, 신석회침착증(nephrocalcinosis)과 재발성 칼슘함유 신결석(recurrent calcium containing renal calculi) 환자(이 약은 20mL당 260 mg(6.5mmol)의 탄산칼슘을 함유)
3) 12세 미만의 어린이에 대한 복용은 의사의 지시가 아니면 일반적으로 추천되지 않습니다.
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지하십시오.
1) 이 약에 민감한 매우 극소수의(< 1/10,000)환자에게서 가려움이나 기관지 수축, 아나필락시스 반응과 같은 알레르기 반응이 나타나는 경우
2) 탄산칼슘을 대량 섭취할 경우, 알칼리증, 고칼슘혈증, 산반동, 유우알칼리증후군 또는 변비가 일어날 수 있습니다. 이는 보통 권장량 이상의 용량을 복용할 경우에 나타납니다.
3) 투약 7일 후에도 증상이 개선되지 않을 경우
4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
1) 과량 복용시 즉시 병원에서 신속한 의료적 처치를 받을 것. 일부 환자는 복부팽만을 호소할 수 있습니다.
2) 제산제인 탄산칼슘의 작용이 있으므로 다른 약물과 2시간의 간격을 두고 복용할 것(예, 테트라사이클린, 디곡신, 플루오로퀴놀론, 철염(iron salt), 케토코나졸, 신경이완제(neuroleptics), 티록신, 페니실라민, 베타차단제(아테놀올, 메토프로롤, 프로프라놀롤), 글루코코르티코이드, 클로로퀸, 에스트라무스틴 및 디포스포네이트(diphosphonates)).
3) 임신여성에 복용시 임부나 태아 혹은 신생아에서 어떠한 이상반응도 관찰되지 않았습니다.
5. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아서 보관하십시오.
3) 이 약은 개봉 후 6개월 이내에 사용하십시오.

【포장단위】 10mL/포, 10mL/포×4, 10mL/포×16, 10mL/포×24(수출용)

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관(냉장 보관하지 마십시오.)

【사용기간】 제조일로부터 24개월

개봉 전 흔들어 복용하는 것을 권장합니다.

®=등록상표

- ※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
- ※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입하신 약국, 병원, 의원 도매상을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 문서 작성일자(2019년 10월 14일) 이후 변경된 내용은 홈페이지나 소비자상담실에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 의약품 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 피해구제를 신청 할 수 있습니다.

소비자 상담실 : 080-990-8200

홈페이지 : www.yungjin.co.kr

문서최초일 : 2013년 4월 30일
문서작성일 : 2019년 10월 14일

제조사 : 영진약품(주)

공 장 : 경기도 화성시 남양읍 무하로 66