

※ 본 제품은 우수약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 의하여 엄격한 품질관리를 완료한 제품입니다. 사용기한이 지났거나 유통과정 중 변질, 변패 또는 오손된 제품이 있으면 사용하지 마시고, 구입한 약국이나 담당영업소에서 교환하시기 바랍니다.

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하시기 바랍니다.

※ 첨부문서에 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우, 의사나 약사 또는 한국약품안전관리원(drugsafe.or.kr→의약품유해사례보고)에 알리시기 바랍니다.

※ 제품 개봉 시 또는 취급 시에 포자재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

※ 이 약은 의사 또는 치과의사의 처방에 의하여 복용할 수 있는 전문의약품입니다. 이 약의 올바른 복용법을 모르시거나 이 약 및 질병에 대한 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.

“이 첨부문서 개정일(14년 9월)이후 변경된 내용은 www.kdpharma.co.kr나 02-576-6121,3에서 확인할 수 있으며, 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하시기 바랍니다.”

제조의뢰·판매원 : 경동제약(주)

공장 : 경기도 화성시 양감면 제약단지로 224-3

제조원 : (주)서흥

충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61

소비자상담실 전화번호 : (02)576-6121,3



제조번호 : KY000

사용기한 : YY. MM. DD

(01)08806481033726

■ 성분 · 함량

1캡슐 중
콜린알포세레이트(별규) 400mg

■ 성상

무색투명의 점조한 액을 넣은 담황색을 띤
타원형의 연질캡슐제

■ 효능 · 효과

- 뇌혈관 결손에 의한 2차 증상 및 변성 또는 퇴행성 뇌기질성 정신증후군 : 기억력저하와 착란, 의욕 및 자발성저하로 인한 방향 감각장애, 의욕 및 자발성 저하, 집중력감소
- 감정 및 행동변화 : 정서불안, 자극과민성, 주위무관심
- 노인성 가성우울증

■ 용법 · 용량

콜린알포세레이트로서 1회 400 mg을 1일 2~3회 경구투여합니다. 증상에 따라 적절히 증감합니다.

뇌혈관질환 치료제

알포틴[®] 연질캡슐

콜린알포세레이트 400mg

90캡슐



전문 의약품

RFID

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
 - 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
2. 이상반응
 - 1) 2차적인 도파민 작용에 기인한다고 추정되는 구역이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 투여합니다.
 - 2) 소화기계 : 위염, 위질환
 - 3) 정신신경계 : 졸음, 불면, 적개심, 신경질, 경련, 운동과다
3. 보관 및 취급상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
 - 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의합니다.

■ 저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위 90캡슐