

겔비스톤

현탁액

일반의약품

분류번호 Z32

올바른 의약품 사용을 위하여 복용전 본 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 본 첨부문서를 본 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

- 원료약품 및 그 분량 : 100mL 중
 - 알긴산나트륨(건조물로서 4.25그램)(NF).....5.0 그램
 - 탄산수소나트륨(KP).....2.13 그램
 - 침강탄산칼슘(KP).....3.25 그램
 - 첨가제(보존제) 파라옥시벤조산에틸(KP).....0.008 그램
 - 첨가제(보존제) 파라옥시벤조산프로필(KP).....0.002 그램

■ 성상 : 흰기가 있는 미향색의 현탁액

■ 효능·효과 : 위역류, 속쓰림, 소화불량, 위산과다 등의 증상개선

■ 용법·용량 : 성인 및 12세 이상 어린이 : 1일 4회(식후 및 취침 전에 각각 10 ~ 20mL(1~2도)를 복용

■ 사용상 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
이 약의 구성성분에 과민한 환자
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 울혈성심부전, 신부전 등과 같이 나트륨을 매우 제한해야 하는 환자(이 약은 20mL당 254.4mg (11.06mmol)의 나트륨을 함유)
 - 2) 고칼슘혈증, 신석회성작증(nephrocalcinosis)과 재발성 칼슘함유 신결석(recurrent calcium containing renal calculi) 환자(이 약은 20mL당 260mg(6.5mmol)의 칼슘을 함유)
 - 3) 12세 미만의 어린이에 대한 투여는 의사의 지시가 아니면 일반적으로 추천되지 않는다.
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담이 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 이 약에 민감한 매우 극소수의(1/10,000)환자에게서 소장증(가려움증)이나 기관지 수축, 아나필락시스 반응과 같은 알러지 반응이 일어날 수 있다.
 - 2) 탄산칼슘을 대량 섭취할 경우 알칼리증, 고칼슘혈증, 산반동(빈맥으로 인한) 위산과다분비, 우유알칼리증후군 또는 변비가 일어날 수 있다. 이는 보통 권장량 이상의 용량을 복용할 경우 에 나타난다.
 - 3) 투약 7일 후에도 증상이 개선되지 않으면 의사와 상의할 것.
4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 1) 과량 투여 시 즉시 병원에서 신속한 의료적 처치를 받을 것. 일부 환자는 복부팽만을 호소할 수 있다. 2) 재산제인 탄산칼슘의 작용이 있으므로 다른 약물과 2시간의 간격을 두고 복용할 것.
(예 : H₂ 항역스타민제, 테트라사이클린, 다국산, 플루오로퀴놀론, 철염(iron salt), 케토코나졸, 신경이완제(neuroleptics), 차콜산, 페니실라민, 베타차단제, 아테놀롤, 에도프롤롤, 프로파놀롤, 글루코코르티코이드, 글로로핀 및 디포스포네이트(diphosphonates)
 - 3) 임신여성에게 투여 시 임신부나 태아 혹은 신생아에서 어떠한 이상반응도 관찰되지 않았다.
 - 4) 동물실험에서 발암성이 있는 것으로 나타난 식카란을 함유하고 있어 건강에 해로울 수 있다. (감미제로서 사카린이 함유되어 있다.)
5. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 2) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아서 보관할 것.
 - 3) 이 약은 개봉 후 6개월 이내에 사용할 것.
- 포장단위 : 5mL, 20mL/포 자사포장단위
- 저장방법 : 차광한 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 (냉장 보관하지 말것)
- 사용기간 : 제조일로부터 24개월
- 제조원 : 셀티스(주) 충북 충주시 대소원면 청탄산길로 120
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과하였거나 유통과정 중 변질·변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다. 제품에 관한 문의는 전화 (043-645-6644)로 하시기 바랍니다.
- ※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭(<http://ezdrug.mfds.go.kr>)→「정보마당」→「의약품등 정보」를 참조하세요.
- ※ 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.
- ※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의깊게 읽어보시고, 첨부문서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관하여야 합니다.

작성연월일 : 2014. 04. 25

Celtis 셀티스팜

충북도 충주시 대소원면 청탄산길로 120
(043) 645-6644