

이력 항목에 관련된미 나타낸 1회 이상의 이식 방문을 보인 환자수	15 (29.4)	22 (40.74)	28 (58.33)
복합	0 (0)	0 (0)	1 (2.08)
상부 외관	0 (0)	5 (9.26)	4 (8.33)
복소	0 (0)	0 (0)	1 (2.08)
관절염	0 (0)	1 (1.96)	0 (0)
신장질환	2 (3.92)	2 (3.70)	6 (12.50)
불안	1 (1.96)	1 (1.95)	0 (0)
충수염	0 (0)	1 (1.95)	0 (0)
치식	0 (0)	0 (0)	1 (2.08)
가슴 불편감	0 (0)	0 (0)	1 (2.08)
카페인	0 (0)	0 (0)	1 (2.08)
변비	0 (0)	1 (1.95)	0 (0)
식욕감소	1 (1.96)	4 (7.41)	8 (15.50)
홍인감소	0 (0)	0 (0)	1 (2.08)
수면불안정	1 (1.96)	0 (0)	0 (0)
심사	0 (0)	0 (0)	2 (4.17)
신장질환	1 (1.96)	3 (5.56)	0 (0)
소변불량	0 (0)	1 (1.95)	0 (0)
말기염	0 (0)	0 (0)	1 (2.08)
진상장애	0 (0)	0 (0)	1 (2.08)
아토피	2 (3.92)	0 (0)	0 (0)
통풍	0 (0)	0 (0)	1 (2.08)
두근	0 (0)	1 (1.95)	0 (0)
두통	0 (0)	2 (3.70)	2 (4.17)
식욕증가	0 (0)	1 (1.95)	0 (0)
불안증	0 (0)	1 (1.95)	0 (0)
관절	2 (3.92)	2 (3.70)	4 (8.33)
관절염	0 (0)	0 (0)	1 (2.08)
부위부위	3 (5.88)	4 (7.41)	2 (4.17)
구내	2 (3.92)	3 (5.56)	2 (4.17)
악취	0 (0)	1 (1.95)	0 (0)
이물질	0 (0)	0 (0)	1 (2.08)
진상장애	0 (0)	0 (0)	0 (0)
악취	0 (0)	1 (1.95)	0 (0)
두드러기	1 (1.96)	0 (0)	0 (0)
진상장애	1 (1.96)	0 (0)	0 (0)
관절염	0 (0)	0 (0)	1 (2.08)
진상	1 (1.96)	0 (0)	0 (0)
부위부위	0 (0)	0 (0)	1 (2.08)
신장질환	4 (7.84)	0 (0)	1 (2.08)
관절	0 (0)	1 (1.95)	4 (8.33)
턱	1 (1.96)	0 (0)	1 (2.08)
진상	0 (0)	1 (1.95)	0 (0)
상부 외관	0 (0)	1 (1.95)	1 (2.08)
수면	1 (1.96)	0 (0)	1 (2.08)
구내	2 (3.92)	0 (0)	1 (2.08)
체중감소	1 (1.96)	1 (1.95)	0 (0)

9) 외국에서 시판 후 사용 경험. 다음의 시판 후 이상반응은 이 약의 치료와 일시적인 연관이 있는 것으로 보고되었고 이 약의 시판 전 임상과는 연관이 없다. 자발적 보고되는 한계를 고려한다면 이 이상반응들의 발생률이나 원인을 정확히 추정하기는 어렵다.

신경통과, 두통, 설신, 레비나 현상, 전이성 기생
신경과, 미주 신경과, 소아와 청소년에서의 감각이상, 이상감각, 맥
장성 이상, 우울증과 우울한 기분, 불안, 정신분열(환각 포함), 조증, 자살적 경향, 시간, 공력, 작업성, 감정
불안정

발작, 발작은 주로 주간과 야간을 보고된다. 시판 후 발작 시에는 의식 장애된 발작의 형태와 발작 후 위험기간을 가진 환자, 또 고령대이나 발작하지 않은 위험기간이 다른 환자 또한 포함된다. 주의력결핍과잉행동장애(ADHD)환자의 발작의 배경이 불확실하므로 이 약과 발작 사이의 정확한 관계를 평가하기는 힘들다.

파부, 파부초의 이상, 다관절 비노출성 관절염, 다낭 결반 통증, 소아의 청소년에서의 노지마, 소아의 청소년에서의 노지류, 지숙발진, 남성성발기 불능

[illegible][illegible]

생체리듬을 영장류 미치지 않았다. ④ 월경 난박성이나 경계치 불협하는 여성, 치료적 농도의 이 약과 기의 난박 불협치는 높은 약효를 나타내며 이 약의 사용 부위에는 대한 결핵에 영향을 미치지 않았다. 이 약을 1000mg, 1500mg 및 2000mg 이하의 사용 부위에는 대한 결핵에 영향을 미치지 않았다. ⑤ 이 약은 마약류 영향을 높은 수치는 산도작용에 Cytochrome P450 3A4 효소를 억제하지 않았다. ⑥ Cytochrome P450 3A4 효소를 Cytochrome P450 3A4 효소를 유전적으로 유전적 또는 유전적 효소로 일으키지 않았다. ⑦ 이 약은 소수인종에서 1000mg 이하의 약효에 대한 정량적하고 정량적으로 높은 약효는 없었다. 이 약은