

Leprozin Tab.

분류번호 : 02220

■원료약품의 분량 (1정 중)

레보드로프로피진(B.P.) 60.0mg

첨가제(동물유래) : 유당수화물(소-우유)

■성상 : 흰색의 원형 정제

■효능·효과

다음 질환에서의 기침 : 급·만성기관지염

■용법·용량

성인 : 레보드로프로피진으로서 1회 60mg을 1일 3회 적어도 6시간 간격을 두고 경구투여한다. 증상에 따라 적절히 증감한다.

■사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1)이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자

2)기관지 점액 분비 증가 환자

3)점액섬포기능이상(카르티게너중후군, 섬모이상운동증) 환자

4)임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부

5)중증의 간장애 환자

6)이 약은 유당수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactose deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1)중증 심부전 및 중증 신장부전 환자

2)고령자

3)만 2세 미만의 영아

3. 이상반응

1)소화기계 : 구역, 탄산증, 소화불량, 설사, 구토

2)중추신경계 : 피로, 기능쇠약, 반수, 혼수, 두통, 어지러움

3)순환기계 : 심계항진

4)피부 : 매우 드물게 알레르기 반응

4. 일반적 주의

드물게 반수상태가 초래되므로 운전이나 기계 조작 시 주의하며, 특히 알코올과 병용 시 작용이 증대 될 수 있다.

5. 상호작용

예민한 환자에게 진정제와 병용투여 시 주의한다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부에는 투여하지 않는다.

7. 보관 및 취급상의 주의사항

1)어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2)다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나, 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 주의한다.

■포장단위 : 30, 300정

■저장방법 및 사용기간 : 기밀용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 36개월

만약 구입시 사용기간이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드리겠습니다.

작성일자:2016년02월05일

* 이 첨부문서 작성일자(2016년 02월 05일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.scd.co.kr)의 '제품안전성정보'에서 확인하실 수 있습니다.



제조의력자

삼천당제약주식회사

경기도 화성시 향남읍 세약공단2길 71

대표전화: (02)2046-1100, <http://www.scd.co.kr>

제조자



알리코제약(주)
충북 산천고 관하리 1 동수2길 21